

تناول بيغ وين® إكس آر بالتزامن مع أي من الأدوية التالية: محصرات الكالسيوم، سيميتيدين، أميلوريه، ديجوكسين، إستروجين، فينوبروفين، فينيتوين، كينيدون، كينين، بروكاييناميد، كينين، فانكوميسين، الحمل الغروية، مورفين، فينيدرين، كينيدون، فينيتوين، بروكاييناميد، كينين، فانكوميسين، رانيتيدين، تراميتوبريم، الأستروبيدات مثل البريدنيزون، الهورمونات الخاصة بالغة الدرقية، ومدرات البول. يجب تالفا في تناول كميات مفردة من المشروبات الكحولية مع بيغ وين® إكس آر لأنها تعزز مفاعيل بيغ وين® إكس آر مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

ما هي التآثيرات الجانبية لبيغ وين® إكس آر؟
قد تتضمن التآثيرات الجانبية ما يلي

إسهال، إنزاج في المعدة، غازات، صراع، عسر هضم، غثيان، وقيء. من الآثار الجانبية النادرة جدا ولكن الخطيرة هي الحماض اللبني. إن الحماض اللبني هو أحد المضاعفات الناتجة عن الإختلال في النشاط الإستقلابي والذي يؤدي إلى تراكم حمض اللبن في الدم مسببا عدة أعراض كالدارار، والضعف، وإنخفاض حرارة الجسد، والشعور بصعوبة في التنفس أو التنفس بسرعة، والنعاس، وتباطؤ أو عدم انتظام في دقات القلب، وألم عضلي غير معتاد. إن المرضى الذين يعانون من مشكلة كبدية وأر كلووية، أو من فشل القلب الإحتقاني، أو من مشاكل طبية متعددة، أو الذين يتناولون عدة أدوية قد يكونون أكثر عرضة لهذه المضاعفات.

الإحتياطات الواجب إتخاذها عند تناول بيغ وين® إكس آر
سيقيم طبيبك حالة كليتيك قبل بدء العلاج ببيغ وين® إكس آر ومرة على الأقل كل عام بعد ذلك لدى المرضى العاديين وبشكل أكثر إنتظاما لدى المسمتين. في حال أصبت بمشاكل كلوية خلال فترة العلاج، قد تضطر إلى وقف العلاج. يجب الإتمتاع عن تناول بيغ وين® إكس آر في حال خلل اليومين الذين يسبقان ويلايان موعد خضوعك لأي إجراء يستخدم الأشعة السينية مع حقنة ملونة، كذلك قبل الخضوع لعملية جراحية، إلا في حال كانت هذه العملية بسيطة، ويستأنف العلاج بعد معاودة تناول الطعام والسوائل بشكل طبيعي. يجب تلافي تناول كميات مفردة من المشروبات الكحولية مع بيغ وين® إكس آر لأن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بالحماض اللبني كما أن أي خلل في وظيفة الكبد قد يكون سببا للإصابة بالحماض اللبني. لذلك من الضروري أن يتحقق طبيبك بطريقة منتظمة من سلامة وظيفة الكبد. في حال تعرضت لمشاكل في الكبد خلال فترة العلاج، قد تضطر إلى التوقف عن تناول الدواء. لا يسبب بيغ وين® إكس آر أي نقص في سكر الدم، لكن هذا النقص قد يحدث لدى المسنين الذين يعانون من سوء تغذية كما قد يصيب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كلوية، وكبدية، ومشاكل في الغدة الكظرية أو الغدة النخامية. يزداد خطر التعرض إلى نقص في سكر الدم عند تقويت وجبات الطعام، وإستهلاك المشروبات الكحولية، والإفراط في النشاط البدني. عليك إعلام طبيبك في حال فقدت كمية كبيرة من السوائل إثر التعرض للقيء أو الإسهال، أو لأي مشكلة أخرى، لأن أي إجتفاف يزيد من إمكانية الإصابة بالحماض اللبني.

في أي حالات عليك الإمتناع عن تناول بيغ وين® إكس آر؟
يجب الإمتناع عن تناول بيغ وين® إكس آر إذا كنت مصابا بخلل في الوظيفة الكلوية أو الكبدية، أو بالحماض الكيتوني، أو إذا كنت تعاني من تفاعلات تحسسية ضد الدواء أو ضد أي من مكوناته، أو في حال كنت تتناول أدوية لمعالجة فشل القلب الإحتقاني.

ماذا يجب أن تفعل إذا كنت حاملا أو مرضعا؟
يجب عدم تناول بيغ وين® إكس آر خلال فترة الحمل، لذلك عليك إعلام طبيبك في حال كنت حاملا أو تخططين للحمل خلال فترة العلاج ببيغ وين® إكس آر. إنه من غير المعروف إذا كان بيغ وين® إكس آر يفرز في حليب الأم لذلك عليك إستشارة طبيبك بشأن تعليق العلاج أو وقف الرضاعة خلال فترة العلاج ببيغ وين® إكس آر.

كيف يحفظ بيغ وين® إكس آر؟
يحفظ بيغ وين® إكس آر في مكان لا تتعدى الحرارة فيه ٢٥ درجة مئوية.
إتبع وصفة الطبيب بدقة، وإرشادات الإستعمال، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران في الأدوية، فوادها ومخاطرها.
لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
لا تكرر نفس الوصفة دون إستشارة طبيبك.
إحفظ الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال.

بنتا.ش.ج.ل. - ضبيه، لبنان



هذا دواء:
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، وإستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع وصفة الطبيب بدقة، وإرشادات الإستعمال، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران في الأدوية، فوادها ومخاطرها.
- لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر نفس الوصفة دون إستشارة طبيبك.
- إحفظ الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال.

مؤتمر وزراء الصحة العرب
 واتحاد الصيدالة العرب

ما هو بيغ وين® إكس آر؟
- تحتوي كل مضغوفة بيغ وين® إكس آر ٥٠٠ ملبسة بالفيلم ممتدة المفعول على ٥٠٠ ملغ من العامل الفعال ميتفورمين هيدروكلوريد.
- تحتوي كل مضغوفة بيغ وين® إكس آر ٧٥٠ ملبسة بالفيلم ممتدة المفعول على ٧٥٠ ملغ من العامل الفعال ميتفورمين هيدروكلوريد.
- تحتوي كل مضغوفة بيغ وين® إكس آر ١٠٠٠ ملبسة بالفيلم ممتدة المفعول على ١٠٠٠ ملغ من العامل الفعال ميتفورمين هيدروكلوريد.

المواد غير الفعالة: كربوكسي ميثيل سلولوز الصوديوم، بوفيدون، مغنيزيوم ستيرات، ثنائي أكسيد التيتانيوم، هيدروكسي بروبييل ميثيل السلولوز، غليكول بولي إيثيلين، تالك، ثاني أكسيد التيتانيوم.

لماذا يجب أن تتناول بيغ وين® إكس آر؟
إن بيغ وين® إكس آر يحد من مضاد للسكري يأخذ عن طريق الفم للتحكم بمرض السكري من النمط ٢ (أي السكري غير المعتمد على الإنسولين). يظهر السكري عندما يكون الجسم غير قادر على إستهلاك السكر المعتاد. الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في تركيز السكر في الدم. يخفض بيغ وين® إكس آر تركيز السكر في الدم وذلك عن طريق خفض إنتاج السكر في الكبد، والحد من إمتصاص السكر المتناول من الأمعاء وزيادة حساسية أنسجة الجسم للإنسولين. ليس لهذا الدواء أي تأثير على إنتاج الإنسولين ولا يعتبر بيغ وين® إكس آر بديلا عن الإنسولين. يمكن أن يوصف بيغ وين® إكس آر لوحده أو بالتزامن مع الإنسولين أو مع غيره من الأدوية المضادة للسكري.

ماذا يجب أن تعلم عن بيغ وين® إكس آر؟
إن بيغ وين® إكس آر هو دواء مساعد ولا يحل مكان الحماية الغذائية الجيدة أو التمرين. لا يمكن إستعمال بيغ وين® إكس آر كأحد أشكال الإنسولين التي يتم تناولها عن طريق الفم ولا يمكن إستعماله بدل الإنسولين.

ما هي جرعة بيغ وين® إكس آر المعتمدة؟
للبالغين

تبلغ جرعة بيغ وين® إكس آر في بداية العلاج مضغوفة واحدة من عيار ٥٠٠ ملغ مرة يوميا تؤخذ مع وجبة العشاء. يمكن زيادة الجرعة اليومية بمقدار ٥٠٠ ملغ بشكل أسبوعي للوصول إلى جرعة قصوى تبلغ ٢٠٠٠ ملغ من بيغ وين® إكس آر مرة يوميا تؤخذ مع وجبة العشاء. في حال تبين أن جرعة ٢٠٠٠ ملغ من بيغ وين® إكس آر مرة يوميا غير قادرة على السيطرة على تركيز السكر في الدم قد يقترح الطبيب أن تتناول مضغوفة واحدة من بيغ وين® إكس آر ١٠٠٠ ملغ مرتين يوميا.

وفي حال كنت بحاجة إلى جرعات أعلى قد يقرر الطبيب أن تتناول بيغ وين® إكس آر باستخدام بيغ وين® إكس آر ٧٥٠ وبيغ وين® إكس آر ١٠٠٠ للمرضى الذين يعالجون مع بيغ وين® إكس آر أو بيغ وين® إكس آر.
يجب أن تعادل جرعة بيغ وين® إكس آر ٧٥٠ أو بيغ وين® إكس آر ١٠٠٠ الجرعة اليومية من بيغ وين® إكس آر أو بيغ وين® إكس آر. الجرعة القصوى من بيغ وين® إكس آر ٧٥٠ وبيغ وين® إكس آر ١٠٠٠ هي على التوالي ١٥٠٠ ملغ و ٢٠٠٠ ملغ يوميا مع وجبة المساء.

للأولاد
لم يختبر بيغ وين® إكس آر على الأولاد ما دون السابعة عشر من عمرهم.

للمسنين
يوصى باستخدام جرعات أصغر عند المسنين والأشخاص الذين يعانون من سوء تغذية بسبب الضعف الكلوي المحتمل الذي قد يصيبهم، الأمر الذي قد يزعج إمكانية التعرض للتآثيرات الجانبية.

كيف يتم تناول بيغ وين® إكس آر؟
إلتمز بإرشادات الطبيب للترتاما بدقة عند تناول بيغ وين® إكس آر. يجب تناول بيغ وين® إكس آر مع الوجبات لتخفيف إمكانية وقوع غثيان وإسهال خاصي في أسابيع العلاج الأولى. يجب تناول مضغوفة بيغ وين® إكس آر كاملة دون مضغؤها أو تكسيرها. في بعض الأحيان قد تظهر المكونات غير الفعالة في الخروج على شكل كتلة رطبة ناعمة.

ما العمل عند تقويت موعد إحدى الجرعات؟
تناول الجرعة التي فوتها حالما تدرك أنك نسيتها. في حال تذكرت في وقت قريب من موعد الجرعة التالية، أعمل الجرعة التي فوتها وإستأنف برنامج العلاج المعتاد. لا تتناول جرعتين في الوقت نفسه.

ما العمل عند تناول جرعة مفردة؟
إن تناول جرعة مفردة من أي دواء قد يؤدي إلى عواقب خطيرة. في حال شككت بأنك تناولت جرعة مفردة، إستشر طبيبك فورا. قد يؤدي أي فرط لجرعة بيغ وين® إكس آر إلى الإصابة بالحماض اللبني (أي إزداد حمض اللبن في الدم، وهو من المضاعفات التي تصيب النشاط الإستقلابي أي النشاط الخاص بالتحويل الغذائي).

هل من تداخل بين بيغ وين® إكس آر وأي طعام أو دواء؟
يمكن تناول بيغ وين® إكس آر مع معظم الأدوية الأخرى؛ لكن يجب أن تستشير طبيبك قبل