

نشرة العبوة: معلومات لمستخدم الدواء

ليفيترا ١٠ ميلigram

أقراص قابلة للذوبان في الفم

فاردينافيل

إقرأ كل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك.

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة إضافية، أسأل طبيبك أو الصيدلي.
- هذا الدواء تم وصفه لك فقط. لا تعطيه للأخرين. إذ يمكن أن يسبب الضرر لهم. حتى لو كان لديهم نفس العلامات من المرض الذي لديك.
- إذا تم إصابتك بأي من الآثار الجانبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلي. هذا يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. انظر الجزء ٤.

ماذا تحتوي هذه النشرة:

١. ما هو ليفيترا و فيما يستخدم
٢. ماذا تحتاج معرفته قبل استخدام ليفيترا
٣. كيفية استخدام ليفيترا
٤. الآثار الجانبية المحتملة
٥. كيف يتم تخزين ليفيترا
٦. محتويات العبوة و معلومات إضافية

١ - ما هو ليفيترا و فيما يستخدم

يحتوي ليفيترا على فاردينافيل، الذي ينتمي لمجموعة الأدوية التي تسمى مثبطات النوع ٥ من (إنزيم) فسفودايسترانز. تستخدم لعلاج الاختلال الوظيفي الانتصابي في الرجال البالغين. هي حالة تتضمن صعوبات حدوث أو إبقاء وضع الانتصاب على الأقل واحد من كل عشرة رجال لديه مشكلة في حدوث أو إبقاء الانتصاب في بعض الأوقات. ربما يكون ذلك لأسباب جسدية أو نفسية، أو مزيجاً من الاثنين معاً. مهما يكن السبب، فإن بقاء الدم بكمية غير كافية في القضيب (العضو الذكري) لانتصابه و لإيقائه منتصباً ناجماً عن تغيرات في العضلة و الوعاء الدموي. سوف يعمل ليفيترا فقط عندما تحدث لك إثارة جنسية. إنه يقلل فاعلية المادة الكيميائية الطبيعية في جسمك التي تجعل الانتصاب يضعف و ينفضي. يسمح ليفيترا للانتصاب أن يدوم لمدة كافية للقيام بنشاط جنسي كامل على تَحْمِيلٍ مُرْضٍ.

٢ - ماذا تحتاج معرفته قبل استخدام ليفيترا لا تتناول ليفيترا

- إذا كان لديك حساسية للفاردينافيل أو لأي من المكونات الأخرى في الليفيترا (المذكورة في الجزء ٦). تشمل علامات تفاعل الحساسية على طفح جلدي، حكة جلدية، تورم الوجه أو الشفتين و قصور في التنفس.
 - إذا كنت تتناول أدوية تحتوي على نترات، مثل جليسيرول ثلاثي النترات لعلاج الذبحة، أو مانحات أكسيد النتريك مثل أميل النتريت. إن تناول هذه الأدوية مع ليفيترا يمكن أن يؤثر بصورة خطيرة على ضغط الدم.
 - إذا كنت تتناول الريتونافير أو الإندينافير، أدوية تستخدم لعلاج عدو فيروس نقص المناعة في الإنسان (HIV).
 - إذا كان السن أكثر من ٧٥ عاماً و تناول الكيتوكونازول أو الایتراكونازول. أدوية مضادة للفطريات.
 - إذا كنت تعاني من مشكلة شديدة في القلب أو الكبد.
 - إذا كان يجري لك غسيل كلوي
 - إذا كنت قد عانيت حديثاً من سكتة دماغية أو نوبة قلبية
 - إذا كنت تعاني أو عانيت من انخفاض في ضغط الدم
 - إذا كانت اسرك لدتها سوابق مرضية في أمراض العين الانحلالية-الانتكاسية (مثل التهاب الشبكية الاصطباغي - عش ليلى).
 - إذا كنت قد عانيت في أي وقت مضى من حالة تشتمل على فقدان البصر نتيجة تلف في العصب البصري ناجم عن نقص الإمداد الدموي المعروف باعتلال عصبي بصري إقفاري غير شرعي (NAION).
 - إذا كنت تأخذ ريوسيجوات. يستخدم هذا الدواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (أي ارتفاع ضغط الدم في الرئتين) وارتفاع ضغط الدم الرئوي المزمن للانسداد التجلطي (أي ارتفاع ضغط الدم في الرئتين الثانوية لتجلط الدم). وقد أظهرت مثبطات PDE5، مثل ليفيترا زيادة التأثير المخافض للضغط من هذا الدواء. إذا كنت تأخذ ريوسيجوات أو غير متتأكد أخبر طبيبك **التحذيرات والاحتياطات**
- أبلغ طبيبك أو الصيدلي قبل تناول ليفيترا.

اتخذ عناء خاصة مع ليفيترا

- إذا كنت تعاني من اضطرابات قلبية. مما يعرضك مارسة الجنس للخطورة.
 - إذا كنت تعاني من عدم انتظام ضربات القلب (اضطراب النظم القلبية) أو أي أمراض متوازنة للقلب تؤثر على الرسم الكهريائي للقلب.
 - إذا كان لديك حالة جسدية تؤثر على شكل القصيب (العضو الذكري). تشمل هذه حالات تسمى بالتزوي. مرض البايروني و التليف التجويفي
 - إذا كنت تعاني من مرض يمكن أن يسبب حالة انتصاب مستمر (القصاح) بقاء الإنعاش. يتضمن ذلك داء الكريات المنجلية و ورم نفسي المتعدد و أبيضاض الدم (الليوكيميا).
 - إذا كنت تعاني من قرحة في المعدة (تسمى أيضاً قرحة معدية أو قرحة هضمية).
 - إذا كنت تعاني من اضطراب نففي (مثل الهيموفيليا).
 - إذا كنت تتناول أي علاجات أخرى لصعوبة الانتصاب. يشمل ذلك أقراص ليفيترا ذات الكسوة الغشائية (أنظر الجزء: أدوية أخرى و ليفيترا).
 - إذا عانيت من نقص مفاجئ أو فقدان في حاسة البصر. توقف عن تناول ليفيترا و اتصل فوراً بالطبيب.
- الأطفال والراهقين**
- لا يعطى للأطفال أو الراهقين حتى سن الـ 18.
- أدوية أخرى و ليفيترا**
- الرجاء إبلاغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت حديثاً أو يمكن أن تتناول أية أدوية أخرى. تشمل الأدوية التي يتم الحصول عليها بدون وصفة طبية.
- يمكن أن تسبب بعض الأدوية مشاكل خاصة الآتية:
- النترات، أدوية علاج الدبة، أو مانحات أكسيد النترات، مثل أميل نتريت. تناول تلك الأدوية مع ليفيترا يمكن أن يؤثر بشكل خطير على ضغط الدم. تكلم مع الطبيب بدون أن تتناول ليفيترا.
 - أدوية لعلاج عدم انتظام نبض القلب، مثل الكوبيناميد، بروكابيناميد، أميدارون أو سوتالول.
 - ريتونافير أو إندينافير، أدوية لعلاج فيروس نقص المناعة في الإنسان (HIV). تكلم مع الطبيب بدون أن تتناول ليفيترا.
 - كيتوكونازول أو إيتراكونازول. أدوية مضادة للفطريات.
 - أريثروماسيين. أو كلاريثروماسيين. مضادات حيوية من مجموعة الماكروليد.
 - محضرات - الألفا. نوع من الأدوية تستخدم لعلاج ضغط الدم المرتفع و تضخم البروستات (فرط التنفس الحميد للبروستات).
 - ريوسيجوات
- لا تتناول أقراص ليفيترا القابلة للذوبان في الفم في نفس الوقت مع أي علاج آخر لصعوبة الانتصاب. يشمل ذلك تناول أقراص ليفيترا ذات الكسوة الغشائية.

ليفيترا مع الأطعمة، المشروبات والكحوليات

- يمكنك تناول أقراص ليفيترا القابلة للذوبان في الفم سواء مع أو بدون طعام. لكن لا تتناول هذا الدواء مع أي سوائل.
- لا تشرب عصير الجريب فروت عندما تتناول الليفيترا. من الممكن أن يتعارض ذلك مع التأثير المعاد للدواء.
- إن شرب المشروبات الكحولية يجعل صعوبات الانتصاب أسوأ.

الحمل والرضاعة:

ليفيترا لا يستخدم في النساء.

القيادة واستخدام الآلات:

قد يشعر بعض الأفراد بالدوار أو تتأثر قدرتهم على الرؤية مع استخدام ليفيترا. إذا شعرت بدوار، أو إذا تأثرت الرؤية لديك بعد تناول ليفيترا لا تقوم بالقيادة أو تشغيل المعدات أو الآلات.


تحتوي أقراص ليفيترا 10 مجم القابلة للذوبان في الفم على أسبارتام و سوربيتول

- الأسبارتام مصدر للفينيل لأنين. ويمكن أن يسبب ضرر لأشخاص لديهم اضطراب يسمى بيلة الفينيل كيتون.
- سوربيتول: إذا كان طبيبك قد أبلغك بأن لديك عدم تحمل لبعض السكريات. اتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

٣ - كيفية استخدام أقراص ليفيترا القابلة للذوبان في الفم:

تناول دائمًا هذا الدواء بدقة كما يوصي به طبيبك. راجع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكدًا. الجرعة الموصى بها هي 10 ميلigram. تناول قرص ليفيترا قبل مزاولة النشاط الجنسي بفترة من ٢٥ إلى ٦٠ دقيقة تقريبًا. مع الإثارة الجنسية يمكنك تحقيق انتصاب في أي فترة ما بين ٢٥ دقيقة حتى أربع أو خمس ساعات بعد تناول ليفيترا.

- لا تتنزع القرص القابل للذوبان في الفم من الشريط إلى أن تبدأ في تناوله. بأيدي جافة. اسحب حافة الشريط من حامل الشريط و اضغط برفق على الجزء الأعلى لإخراج القرص من الشريط على يدك. لا تهرس القرص.
- ضع القرص القابل للذوبان في الفم بالكامل داخل الفم. على اللسان. سوف يذوب في ثواني في الفم. ثم ابلع مع اللعاب. يجب تناول القرص القابل للذوبان في الفم بدون أي سوائل.



لا تتناول أقراص ليفيترا القابلة للذوبان في الفم مع أي أشكال أخرى من ليفيترا.
لا تتناول ليفيترا أكثر من مرة واحدة يومياً.

قم بإبلاغ طبيبك إذا كنت تعتقد بأن فاعلية ليفيترا قوية جداً أو ضعيفة جداً. فربما يقترح الطبيب التحول لتركيبة بديلة بجرعة مختلفة، تعتمد على كيفية تأثير الليفيترا عليك.

إذا تناولت جرعة أكبر من الموصى بها

الرجال الذين يتناولون كميات زائدة عن اللازم من ليفيترا قد يعانون أكثر من الآثار الجانبية أو يصابون بآلام شديدة أسفل الظهر. إذا تناولت جرعة ليفيترا أكبر من الموصى بها، عليك إبلاغ طبيبك.

إذا كان لديك أي أسئلة إضافية عن كيفية تناول هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

٤ - الآثار الجانبية المحتملة

مثل كل الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية. على الرغم أنه لا يصاب بها كل شخص، معظم هذه الآثار تكون معتدلة أو مت Middleton.

تم معاناة المرضى من نقصان أو فقدان حاسة البصر لإحدى العينين أو لكلايهما جزئياً، مفاجئاً، وقتياً أو دائماً.
توقف عن تناول ليفيترا و أبلغ طبيبك فوراً.

تم التبليغ عن حدوث تناقض مفاجئ أو فقدان في السمع
المجموعات الآتية تبين فرص حدوث الآثار الجانبية:

شائعة جداً: (يمكن أن تصيب أكثر من 1 من 10 مستخدمين)

◆ صداع

شائعة: (يمكن أن تصيب عدد يصل إلى 1 من 10 مستخدمين)

◆ دوار

توهج (تدفق الدم في الوجه).

انسداد الأنف أو رشح الأنف

◆ عسر الهضم

غير شائعة: (يمكن أن تصيب عدد يصل إلى 1 من 100 مستخدم)

تورم الجلد و الأنسجة المخاطية تشمل تورم الوجه، الشفتين أو الحلق.

◆ اضطراب النوم

اخدرار و اختلال إدراك اللمس

◆ نعاس.

تأثيرات على الرؤية، احمرار العين، التأثير على رؤية الألوان، ألم و انزعاج في العين، حساسية من الضوء.

رنين في الأذن: دوار

نبض سريع للقلب أو ضربات قلب عنيفة متتالية

صعوبة التنفس.

◆ انسداد الأنف

جريان رجوعي (جزء حمضي)، التهاب المعدة، ألم في البطن، اسهال، قيء؛ الشعور بالغثيان (غثيان)، جفاف الفم

ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد في الدم

طفح، احمرار الجلد.

ألم في الظهر أو العضلات، زيادة لإنzym العضلات في الدم (كرياتين فسفوكابناز)، تيبس العضلات

انتصاب مطوي

◆ توعك

نادرة: (يمكن أن تصيب عدد يصل إلى 1 من 1000 مستخدم)

التهاب العيون (التهاب الملتحمة)

تفاعل حساسية الجسم (تفاعل أرجي)

◆ قلق

◆ إغماء

فقد الذاكرة

◆ نوبة صرع

زيادة الضغط في العين (الزرق)، زيادة الدمعان (الدموع)

تأثيرات على القلب (مثل نوبة قلبية، تغير نبض القلب أو ذبحة)

ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم

◆ نزف الأنف

تأثير على نتائج اختبارات الدم لفحص وظائف الكبد

حساسية الجلد لضوء الشمس

◆ انتصاب مؤلم

ألم في الصدر

- نادرة جداً أو غير غير معروفة:** (يمكن أن تصيب عدد أقل من 1 من 1000 مستخدم أو لا يمكن تقدير التكرار من البيانات المتوفرة)
- الدم في البول (البيلة الدموية)
 - نزف القصيب
 - وجود دم في السائل المنوي
- إبلاغ عن الآثار الجانبية**

إذا تم إصابتك بأي آثار جانبية، حدث إلى طبيبك أو الصيدلي. هذا يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. يمكن أن يساعد التبليغ عن الآثار الجانبية على توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

٥ - كيف يتم تخزين ليفيترا

احفظ هذا الدواء بعيداً عن نظر وتناول الأطفال.

لا تتناول هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على الكرتونه بعد "EXP".

تاريخ انتهاء الصلاحية يشير لآخر يوم في ذلك الشهر.

يحفظ في العبوة الأصلية لحمايته من الرطوبة والضوء.

يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٢٥ درجة مئوية.

لا يجب التخلص من أي أدوية عن طريق الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي كيف التخلص من الأدوية التي لم تعد في حاجة إليها. هذه الإجراءات سوف تساعد على حماية البيئة.

٦ - محتويات العبوة و معلومات إضافية

ماذا تحتوي أقراص ليفيترا القابلة للذوبان في الفم.

المادة الفعالة هي فاردينافيل. يحتوي كل قرص قابل للذوبان في الفم على ١٠ ميلigram فاردينافيل (كهيوروكلوريد).

المكونات الأخرى للأقراص هي:

ستيارات الماغنيسيوم، الأسبارتام (E951)، نكهة النعناع، مانيتول (E420)، كروسوفيدون و سيليكا لا مائية غروانية.

ما هي أقراص ليفيترا ١٠ مجم القابلة للذوبان في الفم وما هي محتويات العبوة

أقراص ليفيترا ١٠ مجم القابلة للذوبان في الفم شكلها مستديرة ولونها أبيض. الأقراص متوفرة في عبوات ١، ٤، أو ٨ أقراص (تحتوي على شرائط ألومنيوم / ألومنيوم / ألومنيوم داخل حامل للشرائط).

ليست كل أحجام العبوات يمكن تسويقها.

المصنع

باير فارما ايه جي
٥١٣٦٨
ليفركوزن، ألمانيا.

حامل ترخيص التسويق

باير فارما ايه جي
١٣٣٤٢
برلين، ألمانيا

تاريخ آخر مراجعة لهذه النشرة هو يناير ٢٠١٦

إن هذا الدواء

- مستحضر طبي يؤثر على صحتك و استعماله خلاف التعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة استشارة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرف لك الدواء.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع العلاج قبل المدة المحددة لك من تلقاء نفسك.

لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

احفظ الدواء بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.