

التوزيع: يبلغ حجم التوزيع ما بين ٧ و ١٢ لترًا.

عندما يعطى سيفترديكسون داخل الوريد فإنه ينتشر بسرعة في السائل الخلالي، حيث تبقى التراكيزات المبيدة للبكتيريا فعالة ضد الجرثام المسببة لما يزيد عن ٢٤ ساعة. يرتبط سيفترديكسون بالألبومين ارتباطًا يزول فيما بعد، ويتصالح ارتباطه مع ارتفاع التركيز. وهكذا، يخفض ارتباطه من ٢٩.٥٪ عندما يكون تركيزه في البلازما أقل من ١٠٠ ملغم/لتر إلى ٨.٥٪ عندما يبلغ تركيزه ٣٠٠ ملغم/لتر. ونظرًا لقلّة محتوى الألبومين في السائل الخلالي، فإن نسبة سيفترديكسون الحر تبقى أعلى مما هي في البلازما. يفتقر سيفترديكسون السحايا للمثبته لدى حديثي الولادة والرضع والأطفال. يمثل معدل تركيز المستحضر في السائل الخلاعي ٢١٪ من تركيزه في البلازما في حالة التهاب السحايا الجرثومي، و ٢٤٪ في حالة التهاب السحايا غير الجرثومي. وقد عثر في السائل الخلاعي على تراكيزات تتفق ١,٤ ملغم/لتر من سيفترديكسون بعد ٢٤ ساعة من حقن جرعات من ليهيساف داخل الوريد تتراوح ما بين ١٠٠٠٠٠٠ ملغم/كغم من وزن الجسم.

عندما يعطى ٥٠ ملغم/كغم من وزن الجسم للمرضى البالغين المصابين بالتهاب السحايا فإن ذلك يؤدي في طرف ٢-٢٤ ساعة إلى تراكيزات في السائل الخلاعي تتفق مرات كثيرة التراكيزات الضرورية الأدنى المطبقة لفعل الجرثام المسببة لالتهاب السحايا الأكثر شيوعًا.

عمليّة الإيض: لا تتم عمليّة أيض سيفترديكسون بجهاز الجسم فعلاً، وإنما يفرز مع الصفراء (معدّة) الأمعاء فيتحول إلى مواد غير فعالة بفعل البكتيريا الجرثومية المعويّة. الطرح: تبلغ نصفية البلازما ١٠-٢٢ مل/دقيقة، وتبلغ النصفية الكلوية ٥-١٢ مل/دقيقة. يطرح ٥٠-٦٠٪ من سيفترديكسون على شكل غير متحول عن طريق الكلى، ويطرح ٤٠-٥٠٪ على شكل غير متحول مع الصفراء. يبلغ العمر النصفى في البلازما لدى البالغين نحو ٨ ساعات.

المخاركة الموائية في حالات سريرية خاصة: يطرح نحو ٧٠٪ من الجرعة لدى حديثي الولادة عن طريق الكلى. يبلغ معدل العمر النصفى في البلازما لدى الرضع من أعمار تقل عن ٨ أيام والمسنين من أعمار تزيد على ٧٥ سنة ٣-٢ مرات ما يبلغه لدى البالغ الشباب السليم الصحة. إن المرضى الذين يعانون من قصور خفيف إلى معتدل في وظيفة الكلى أو من اضطراب في وظيفة الكبد لا يحدث لهم إلا تغير طفيف في حركية سيفترديكسون الدوائية ولا يزيد العمر النصفى في البلازما للدواء لديهم إلا قليلاً. إذا كانت وظيفة الكلى وحدها ضعيفة، فإن نسبة طرح سيفترديكسون عن طريق الصفراء ترتفع، بينما إذا كانت وظيفة الكبد وحدها ضعيفة، فإن الطرح الكلوي يرتفع.

محتوى العبوة

ليهيساف ٠,٥ غرام للحقن في العضل:

أوبلات كت: عبوة تحتوي على مسحوق سيفترديكسون صوديوم معقم ما يعادل ٠,٥ غرام من سيفترديكسون، أمبولة مذيبة تحتوي على ٢ مل من محلول البندوكاين (هايدروكلورايد البندوكاين ١٪)، محقنة معقمة، إبرتين، مسحة طبية معقمة، ضمادة لاصقة.

ليهيساف ٠,٥ غرام للحقن في الوريد:

أوبلات كت: عبوة تحتوي على مسحوق سيفترديكسون صوديوم معقم ما يعادل ٠,٥ غرام من سيفترديكسون، أمبولة مذيبة تحتوي على ٥ مل ماء للحقن، محقنة معقمة، إبرتين، مسحة طبية معقمة، ضمادة لاصقة.

ليهيساف ٠,٥ غرام للحقن في العضل/الوريد:

عبوة تتضمن ١٠ عبوات يحتوي كل منها على مسحوق سيفترديكسون صوديوم معقم ما يعادل ٠,٥ غرام من سيفترديكسون.

ليهيساف ١ غرام للحقن في العضل:

أوبلات كت: عبوة تحتوي على مسحوق سيفترديكسون صوديوم معقم ما يعادل ١ غرام من سيفترديكسون، أمبولة مذيبة تحتوي على ٣,٥ مل من محلول البندوكاين (هايدروكلورايد البندوكاين ١٪)، محقنة معقمة، إبرتين، مسحة طبية معقمة، ضمادة لاصقة.

ليهيساف ١ غرام للحقن في الوريد:

أوبلات كت: عبوة تحتوي على مسحوق سيفترديكسون صوديوم معقم ما يعادل ١ غرام من سيفترديكسون، أمبولة مذيبة تحتوي على ١٠ مل ماء للحقن، محقنة معقمة، إبرتين، مسحة طبية معقمة، ضمادة لاصقة.

ليهيساف ١ غرام للحقن في العضل/الوريد:

عبوة تتضمن ١٠ عبوات يحتوي كل منها على مسحوق سيفترديكسون صوديوم معقم ما يعادل ١ غرام من سيفترديكسون.

ليهيساف ٢ غرام للري الوريدي:

عبوة تتضمن عبوة واحدة أو ١٠ عبوات يحتوي كل منها على مسحوق سيفترديكسون صوديوم معقم ما يعادل ٢ غرام من سيفترديكسون.

ظروف التخزين وتاريخ انتهاء الصلاحية

راجع تاريخ انتهاء الصلاحية المكون على العبوة الخارجية. يشير هذا التاريخ إلى منتج محفوظ بشكل صحيح في غلاف غير مفتوح.

لا تستعمل ليهيساف بعد انقضاء هذا التاريخ.

احفظه في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠°م، بعيداً عن الضوء والحرارة.

احفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

إنتاج: ميتم ش.م.م

بريشا، إيطاليا

لصالح: أروان للصناعات الدوائية لبنان ش.م.ل.

جدرا، لبنان

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخياران البتاء وتبغعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب، اتحاد الصيدلة العرب