

ريليفاست®

مونتيلوكاست ١٠ ملغم

أعراض مغلفة بطبقة رقيقة

الرجاء قراءة هذه النشرة كاملة قبل أن تتناول هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قرائتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أسلة أخرى إسال الطبيب أو الصيدلي.
- لقد وصف هذا الدواء للك شخصياً. لا تعطه أحداً إلى شخص آخر حتى إذا كانت عوارضه مماثلة لعوارضك لأنه قد يوثقه.
- في حال تفاقم أحد التأثيرات الجانبية أو في حال لاحظت تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة أعلم الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

- ما هو ريليفاست ١٠ ملغم، أعراض مغلفة بطبقة رقيقة وما هي دواعي استعماله
- قبل أن تتناول ريليفاست ١٠ ملغم، أعراض مغلفة بطبقة رقيقة
- كيفية تناول ريليفاست ١٠ ملغم، أعراض مغلفة بطبقة رقيقة
- التأثيرات الجانبية المحتملة
- كيفية حفظ ريليفاست ١٠ ملغم، أعراض مغلفة بطبقة رقيقة
- معلومات إضافية

١ - ما هو ريليفاست ١٠ ملغم، أعراض مغلفة بطبقة رقيقة وما هي دواعي استعماله

ريليفاست هو مضاد لمستقبلة اللوكوتريين، يعمل على حصر مواداً تسمى لوكتريين. تسبب اللوكوتريين تضيق مجرى الهواء في الرئتين وتورّمها كما تسبب في ظهور عوارض الحساسية. يحصره هذه المادة، يحسن ريليفاست عوارض الربو ويساعد على التحكم بالربو ويخفّف عوارض الحساسية الموسمية (المعروف أيضاً بحمى القفن أو بالتهاب الأنف الأرجي الموسمي).

لقد وصف طبيبك ريليفاست لعلاج الربو الذي تعاني منه مما يمنع ظهور عوارض الربو أثناء النهار والليل.

- يُستعمل ريليفاست لعلاج المرضى الذين لا يستفيدون كما ينبغي من أدويتهم في السيطرة على الربو وبالتالي يحتاجون إلى علاج إضافي.

- يساعد ريليفاست كذلك على منع تضيق مجرى الهواء الناتج عن الجهد.

- لدى مرضى الربو الذين وصف لهم ريليفاست لعلاج الربو، يخفّف ريليفاست عوارض الحساسية الموسمية (المعروف أيضاً بحمى القفن أو بالتهاب الأنف الأرجي الموسمي).

سوف يقرر طبيبك كيفية استعمال ريليفاست حسب عوارض وحدة الربو لديك.

ما هو الربو؟

الربو هو مرض مزمن.

يتضمن الربو:

- صعوبة في التنفس بسبب تضيق مجرى الهواء، يزداد هذا التضيق سوءاً أو يتحسن حسب ظروف مختلفة.
- مجرى الهواء حساسة تتفاعل مع أشياء كثيرة مثل دخان السجائر وغيار الططلع والهواء البارد والجهد.
- تورّم (التهاب) بطانة مجرى الهواء.

لتضيق عوارض الربو: السعال والأزفير وضيق الصدر.

ما هي الحساسية الموسمية؟

الحساسية الموسمية (المعروف أيضاً بحمى القفن أو بالتهاب الأنف الأرجي الموسمي) هي رد فعل أرجيّة غالباً ما يسببها غبار الططلع الذي يحمله الهواء من الأشجار والعشب. يمكن أن تتضمن عوارض الحساسية الموسمية بصورة عامة ما يلي: إنسداد الأنف أو سيلانه أو الشعور بحكمة في العين؛ العينان دامعتان ومتورّتان وحراروان وفيهما حكة.

٢ - قبل أن تتناول ريليفاست ١٠ ملغم، أعراض مغلفة بطبقة رقيقة

اعلم طبيبك بأي مشاكل طبية أو حساسية تعاني منها حالياً أو عانيت منها في السابق.

لا تستعمل ريليفاست في حال كنت

- مصاباً بفرط حساسية تجاه المونتيلوكاست أو تجاه أي مكون آخر من ريليفاست (راجع القسم ٦ معلومات إضافية).

إعتمد عليك خاصة مع ريليفاست

- في حال ازداد الربو أو الت نفس لديك سوءاً، أعلم طبيبك على الفور.

- لا تستعمل ريليفاست الذي يؤخذ غير الفم لعلاج نوبات الربو الحادة. في حال حدوث نوبة ربو، اتبع التعليمات التي

زوّدك بها طبيبك. إحمل دائماً معك بخاخة الاستنشاق لنوبات الربو.

من المهم أن تأخذ كل أدوية الربو التي وصفها طبيبك. لا ينبغي استعمال ريليفاست بدل أدوية أخرى للربو وصفها

الطبيب لك.

- يجب إعلام كل مريض يعالج بدوية مضادة للربو أن عليه استشارة طبيبه في حال تعرضه للإصابة بالتنفس أو أكثر مما

من العوارض التالية: داء يشبه الإنفلونزا، تقلّص أو خدر في الذراعين والساقين، تفاقم العوارض الرئوية وأو طفح جدي.

- لا ينبغي بك تناول حمض الأسيتيك ساليسيليك (الأسيرين) أو مضادات الإلتهاب (المعروف أيضاً بمضادات الإلتهاب غير الستروريدي) إذا كانت تزيد الربو لديك سوءاً.

الاستعمال لدى الأطفال

للأطفال ما بين عمر السنين و٥ سنوات، أعراض ريليفاست ٤ ملغم قبله للمرضى.

للأطفال ما بين عمر ٦ سنوات و٤ سنة، أعراض ريليفاست ٥ ملغم قبله للمرضى.

تناول أدوية أخرى

يمكن أن تؤثر بعض الأدوية على مفعول ريليفاست كما يمكن أن يؤثر ريليفاست على مفعول أخرى.

الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلي في حال كنت تأخذ حالياً أو في حال أخذت مؤخراً أدوية أخرى بما فيها الأدوية

التي حصلت عليها بدون وصفة طبية.

اعلم طبيبك إذا كنت تأخذ الأدوية التالية قبل بدء العلاج بـ ريليفاست:

- الفينباربیتال (المستعمل لعلاج الصداع)،

- الفينتاكين (المستعمل لعلاج الصداع)،

- الريفارامبيسين (المستعمل لعلاج السلس وبعض حالات العدوى الأخرى).

ال الطعام والشراب

يمكن أخذ ريليفاست ١٠ ملغم، أعراض مغلفة بطبقة رقيقة مع الطعام أو بدون الطعام.

الحمل والإرضاع

استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

الاستعمال في خلال فترة الحمل: يجب على النساء الحوامل أو الواتي ينوبن الحمل استشارة طبيبيهن قبل تناول

ريليفاست. فطبيبك هو من سيقرر إذا كان يمكنك تناول ريليفاست في خلال هذه الفترة.

الاستعمال في خلال فترة الإرضاع: من غير المعروف إذا كان ريليفاست يظهر في حليب الثدي. يجب عليك استشارة

طبيبك قبل تناول ريليفاست إذا كنت ترضعين أو تتوين الإرضاع.

قيادة السيارات واستعمال الآلات

لا يتوقع أن يؤثر ريليفاست على قدرتك على قيادة سيارة أو استعمال آلة. ولكن رذات الفعل الفردية تجاه الدواء قد تتغير

من شخص إلى آخر. قد تؤثر بعض التأثيرات الجانبية (مثل الدوار والنعاس) التي أفاد عنها في حالات نادرة جداً

موتنيلوكاست على قدرة بعض المرضى على قيادة سيارة أو استعمال آلة.

معلومات مهمة حول بعض مكونات ريليفاست ١٠ ملغم

يحتوي ريليفاست ١٠ ملغم، أعراض مغلفة بطبقة رقيقة على اللاكتوز (سكر الحليب). إذا قال لك طبيبك إنك تعاني من

عدم تحمل بعض أنواع السكر، اتصل به قبل تناول هذا الدواء.

٣ - كيفية تناول ريليفاست ١٠ ملغم، أعراض مغلفة بطبقة رقيقة

- يجب عليك تناول قرص واحد من ريليفاست مرة واحدة في اليوم حسب وصفة طبيبك.

- يجب تناول هذا القرص حتى في غياب أي عوارض لديك أو في حال نوبة ربو حادة.

- تناول دائماً ريليفاست وفقاً لإرشادات الطبيب. في حال الثلث، استشر طبيبك أو الصيدلي.

- يؤخذ عبر الفم.

للبالغين ابتداء من سن الـ ١٥

قرص واحد من ١٠ ملغم يؤخذ يومياً عند المساء. يمكن أخذ ريليفاست ١٠ ملغم قبل أو أثناء أو بعد الطعام.

إذا كنت تأخذ ريليفاست، تأكد من أنك لا تأخذ أي دواء آخر تحتوي على المادة الفعالة، مونتيلوكاست.

إذا تناولت عدد أعراض ريليفاست أكثر من التي عليك تناولها

استشيري طبيبك على الفور.

لم تتم الإلقاء عن أي عوارض جانبية في أكثرية حالات فرط الجرعة التي أفاد عنها. تضمنت العوارض الأكثر شيوعاً

التي أفاد عنها بسبب فرط الجرعة لدى البالغين والأطفال أمّا في البطن ونعاساً وظماناً وصداعاً وتقىداً وفرط نشاط.

إذا نسيت تناول ريليفاست ابتداً من سن الـ ١٥

حاول تناول ريليفاست حسب وصفة الطبيب. ولكن إذا فوت جرعة، عاود برنامج العلاج المعتمد، أي قرص واحد مرة

واحدة في اليوم.

لا تأخذ جرعة مضاعفة للتعرّض عن الجرعة التي نسيتها.

إذا توقفت عن تناول ريليفاست

لا يمكن أن يعالج ريليفاست الربو الذي تعاني منه إلا إذا واصلت تناوله بانتظام.

من المهم مواصلة تناول ريليفاست طيلة المدة التي يوصي بها طبيبك. سوف يساعد ذلك على التحكم بالربو الذي تعاني منه.

إذا كان لديك أي أسلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، إسأل الطبيب أو الصيدلي.

٤ - التأثيرات الجانبية المحتملة

مثل باقي الأدوية، يمكن أن يستحب ريليفاست ١٠ ملغم، أعراض مغلفة بطبقة رقيقة تأثيرات جانبية لا تصيب المرضى كلهم.

في الدراسات السريرية مع مونتيلوكاست ١٠ ملغم، أعراض مغلفة بطبقة رقيقة، كان التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعاً

الذان أفاد عنها (لدى مريض من أصل ١٠٠ مريض على الأقل ولدى أقل من مريض من أصل ١٠ مريض معالجين) ويعتقد أنها ناتجة عن المونتيلوكاست:

• ألم البطن

• الصداع

كان هذان التأثيران معتدلي الحدة وأكثر شيوعاً لدى المرضى المعالجين بأعراض مونتيلوكاست مقارنة بالمرضى الذين

تلقو علاجاً وهما (حبة لا تحتوي على أي مادة فعالة).

بالإضافة إلى ذلك، أفاد عن التأثيرات الجانبية التالية:

• ميل متزايد إلى النزف،

• ارتکاسات تحسسية تتضمن طفح جلدي، تورّم الوجه وأو الشفتيين وأو اللسان وأو الحلق مما قد يستحب صعوبة في

التنفس أو البلع،

• تغيرات في التصرف والمزاج: أحلام غير طبيعية تتضمن كوابيس، هلوسات، سرعة الإستثاره، شعور بالقلق، تعلم،

• هياج يتضمن تصرفاً عادياً، رعاش، اكتئاب، أرق، أفكار وأفعال إنتحارية (في حالات نادرة جداً)،

• ذوار، نعسان، تقلّل بdry، نوبة،

• خفقات،

• نزف من الأنف،

• إسهال، جفاف في الفم، عسر هضم، غثيان، نفوت،

• التهاب الكبد،

• كدمات، حكة، شرى، ظهور كتل حمراء وحساسة تحت الجلد تكون غالباً على مستوى حافة القصبة لديك (الحمامي العقني)،

• ألم في المفاصل أو العضلات، تقلّصات عضلية،

لدى مريض الربو المعالجين بـ مونتيلوكاست، أفاد عن حالات نادرة جداً من عوارض تتضمن داء يشبه الإنفلونزا وتنبل

أو خدر الذراعين أو الساقين وتفاقم العوارض الرئوية وأو طفح جلدياً (متلازمة تشيرج ستراوس). يجب عليك إعلام

طبيبك على الفور في حال أصبت بأحد هذه العوارض أو بعثة عوارض منها.

اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلي حول التأثيرات الجانبية.

في حال تفاقم أحد التأثيرات الجانبية أو في حال لاحظت تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة أعلم الطبيب أو

الصيدلي.

٥- كيفية حفظ ريليفاست ١٠ ملغم، أقراص مغلفة بطبقة رقيقة

- احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال ونظرهم.
- لا تستعمل ريليفاست بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المذكور على الظرف وعلى الغلاف الخارجي.
- احفظ الدواء في درجة حرارة لا تتعذر ٢٥°C في غلاف الأصلي بعيداً عن الضوء والرطوبة.
- لا ينبغي رمي الأدوية في المياه المبتلة أو مع النفايات المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها، فمن شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

٦- معلومات إضافية

ماذا يحتوي ريليفاست ١٠ ملغم، أقراص مغلفة بطبقة رقيقة

المادة الفعالة: مونتيلوكاست (على هيئة مونتيلوكاست الصوديوم).

يحتوي كل قرص مغلف بطبقة رقيقة على مونتيلوكاست الصوديوم ما يعادل ١٠ ملغم من المونتيلوكاست.

السوانغ: قلب القرص: لاكتوز مونوهيدرات (٦٠ ملغم)، سليولوز دقيق البثورية، كروسكارميلوز الصوديوم، هايدروكسي بروبيل سليولوز (أي ٤٦٣)، ستارات المغنتزيوم.

غلاف القرص: هايدروكسي بروبيل سليولوز (أي ٤٦٣)، هايروميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم (أي ١٧١)، أكسيد الحديد الأصفر (أي ١٧٢)، أكسيد الحديد الأحمر (أي ١٧٢)، أكسيد الحديد الأسود (أي ١٧٢).

كيف هو شكل ريليفاست ١٠ ملغم، أقراص مغلفة بطبقة رقيقة ومحتويات العلبة

اقراص ريليفاست ١٠ ملغم المغلفة بطبقة رقيقة هي أقراص مستديرة بيجية اللون ثنائية التحدب ومحفور على جهة واحدة من القرص "10".

يأتي ريليفاست ١٠ ملغم، أقراص مغلفة بطبقة رقيقة في علب من ٢٨ قرصاً.

انتاج: پابیانیکی زکلدي فارماسویزنسی پولفا ش.م.

پابیانیک، بولندا

لصالح: أروان للصناعات الدوائية لبنان ش.م.ل.

جدا، لبنان

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على مصحتك واستهلاكه خلافاً للتوجيهات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخبران بالدواء وبقيمه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاه نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا ترك الأدوية في متناول الأطفال.