

ريليفاست®

مونتيلوكاست ٥ ملغم

أعراض قابلة للمضاعف

الرجاء قراءة هذه النشرة كاملة قبل أن تتناول أنت أو طفلك هذا الدواء.
- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قرائتها مجدداً.

- إذا كانت لديك أسلة أخرى إسأل الطبيب أو الصيدلي.

- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً أو لطفلك. لا تعطه أبداً إلى شخص آخر حتى إذا كانت عوارضه مماثلة.

- لعوارضك أو لعوارض طفلك لأنه قد يودي.

- في حال تفاقم أحد التأثيرات الجانبية أو في حال لاحظت تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة أعلم طبيبك أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

١- ما هو ريليفاست ٥ ملغم، أعراض قابلة للمضاعف وما هي دواعي استعماله

٢- قبل تناول ريليفاست ٥ ملغم، أعراض قابلة للمضاعف وما هي دواعي استعماله

٣- كيفية تناول ريليفاست ٥ ملغم، أعراض قابلة للمضاعف

٤- التأثيرات الجانبية المحتملة

٥- كيفية حفظ ريليفاست ٥ ملغم، أعراض قابلة للمضاعف

٦- معلومات إضافية

١- ما هو ريليفاست ٥ ملغم، أعراض قابلة للمضاعف وما هي دواعي استعماله

ريليفاست هو مضاد لمستقبلة اللوكوتريبين، يعمل على حصر مواداً تسمى لوكتريبين. تسبب اللوكوتريبين تضيق مجازي الهواء في الرئتين وتورّهما. بحصره هذه المادة، يحسن ريليفاست عوارض الربو ويساعد على التحكم بالربو. لقد وصف طبيبك ريليفاست لعلاج الربو الذي تعانين منه أنت أو طفلك مما يمنع ظهور عوارض الربو أثناء النهار والليل.

- يستعمل ريليفاست لعلاج المرضى الذين لا يستفيدين كما ينبغي من أدويتهم في السيطرة على الربو وبالتالي يحتاجون إلى علاج إضافي.

- يمكن استعمال ريليفاست كذلك كعلاج بديل للكورتيكosteroid الذي يتم تناولها لدى المرضى الذين يتراوح سنهما ما بين ٦ و ١٤ عاماً والذين لم ياخذوا مؤخراً الكورتيكosteroid عبر الفم لعلاج الربو وأظهروا عدم قدرتهم على استعمال الكورتيكosteroid الذي يتم تناولها.

- يساعد ريليفاست كذلك على منع تضيق مجازي الهواء الناتج عن الجهد.

سوف يقرر طبيبك كيفية استعمال ريليفاست حسب عوارض وحدة الربو لديك أو لدى طفلك.

ما هو الربو؟

الربو هو مرض مزمن.

يتضمن الربو:

- صعوبة في التنفس بسبب تضيق مجازي الهواء. يزداد هذا التضيق سوءاً أو يتحسن حسب ظروف مختلفة.

- مجازي الهواء حساسة تتفاعل مع أشياء كثيرة مثل دخان السجائر وغيار الطลائع والهواء البارد والجهد.

- تورّم (الالتهاب) بطانة مجازي الهواء.

يتضمن عوارض الربو: السعال والأزفير وضيق الصدر.

٢- قبل تناول ريليفاست ٥ ملغم، أعراض قابلة للمضاعف

اعلم طبيبك بأي مشاكل طبية أو حساسية تعانين منها أنت أو طفلك حالياً أو عانيتها منها في السابق.

لا تستعمل ريليفاست في حال كنت أنت أو كان طفلك

- مصاباً بفرط حساسية تجاه المونتيلوكاست أو تجاه أي مكون آخر من ريليفاست (راجع القسم ٦- معلومات إضافية).
اعتمد عناية خاصة مع ريليفاست

- في حال ازداد الربو أو التنفس لديك أو لدى طفلك سوءاً، اعلم طبيبك على الفور.

- لا يستعمل ريليفاست الذي يؤخذ عبر الفم لعلاج نوبات الربو الحادة. في حال حدوث نوبة ربو، اتبع التعليمات التي زوّدك بها طبيبك. إحمل دائماً معك بخلقة الإستنشاق لنوبات الربو.

- من المهم أن تأخذ أنت أو طفلك كل أدوية الربو التي وصفها طبيبك. لا ينبغي استعمال ريليفاست بدل أدوية أخرى للربو وصفها الطبيب لك أو لطفلك.

- يجب إعلام كل مريض يعالج بأدوية مضادة للربو أن عليه استشارة طبيبه في حال تعرضه للإصابة بآثرين أو أكثر معاً من العوارض التالية: داء يشبه الإنفلونزا، تقلص أو خدر في الذراعين والساقين، تفاقم العوارض الرئوية وألم طفح جلدي.

- لا ينبغي لك أنت أو طفلك تناول حمض الأسيتيل ساليسيليك (الأسبرين) أو مضادات الالتهاب (المعروف أيضاً بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية) إذا كانت تزيد الربو لديك أو لدى طفلك سوءاً.

الاستعمال لدى الأطفال

للأطفال ما بين عمر السنين ٥ و سنوات، أعراض ريليفاست ٤ ملغم قابلة للمضاعف متوفّرة.

للأطفال ما بين عمر ٦ سنوات و ١٤ سنة، أعراض ريليفاست ٥ ملغم قابلة للمضاعف متوفّرة.

تناول أدوية أخرى يمكن أن تؤثر بعض الأدوية على مفعول ريليفاست كما يمكن أن يؤثر ريليفاست على مفعول أدوية أخرى.

الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلي في حال كنت أنت أو طفلك تأخذان حالياً أو في حال اخذتما مؤخراً أدوية أخرى بما فيها الأدوية التي حصلت عليها بدون وصفة طبية.

إذا كنت أنت أو طفلك تأخذان الأدوية التالية أعلمي طبيبك قبل بدء العلاج بـ ريليفاست:

- الفينوباربital (المستعمل لعلاج الصرع)،

- الفينيتون (المستعمل لعلاج الصرع)،

- الريغامبيسين (المستعمل لعلاج السل وبعض حالات العدوى الأخرى).

الطعام والشراب

لا ينبغي تناول ريليفاست ٥ ملغم، أعراض قابلة للمضاعف خلال الطعام بل يجب تناوله قبل الطعام بساعة واحدة أو بعد الطعام ب ساعتين على الأقل.

الحمل والإرضاع

استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

الاستعمال في خلال فترة الحمل: يجب على النساء العوامل أو اللواتي ينون الحمل استشارة طبيبهن قبل تناول ريليفاست. فطبيبك هو من سيقرر إذا كان يمكنك تناول ريليفاست في خلال هذه الفترة.

الاستعمال في خلال فترة الإرضاع: من غير المعروف إذا كان ريليفاست يظهر في حليب الثدي. يجب عليك استشارة طبيبك قبل تناول ريليفاست إذا كنت ترضعين أو توينين الإرضاع.

قيادة السيارات واستعمال الألات

لا يتوقع أن يؤثر ريليفاست على قدرتك على قيادة سيارة أو استعمال سيارة، ولكن رذات الفعل الفردية تجاه الدواء قد تتغير من شخص إلى آخر. قد تؤثر بعض التأثيرات الجانبية (مثل التهاب والسعال) التي أفاد عنها في حالات نادرة جداً مع مونتيلوكاست على قدرة بعض المرضى على قيادة سيارة أو استعمال سيارة.

معلومات مهمة حول بعض مكونات ريليفاست ٥ ملغم، أعراض قابلة للمضاعف

يحتوي ريليفاست ٥ ملغم، أعراض قابلة للمضاعف على الأسرات وهي مصدر للقينيل الالين. فإذا كان طفلك مصاباً بـ بيلة الفينيل كيتون (خلل ايضي وراثي نادر)، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار أن كل قرص قابل للمضاعف من ٥ ملغم يحتوي على الفينيل الالين (ما يعادل ٨٤٢٠ ملغم من الفينيل الالين في كل قرص قابل للمضاعف من ٥ ملغم).

٣- كيفية تناول ريليفاست ٥ ملغم، أعراض قابلة للمضاعف

- يجب عليك أنت أو طفلك تناول قرص واحد من ريليفاست مرة واحدة في اليوم حسب وصفة طبيبك.

- يجب تناول هذا القرص حتى في غياب أي عوارض لديك أو لدى طفلك أو في خلال نوبة ربو حادة.

- يجب تناول ريليفاست دائمًا وفقاً لإرشادات الطبيب. في حال الشك، استشر طبيبك أو الصيدلي.

- يؤخذ عبر الفم.

للاطفال ما بين ٦ و ١٤ سنة

قرص واحد قابل للمضاعف من ٥ ملغم يؤخذ يومياً عند المساء. لا ينبغي تناول ريليفاست ٥ ملغم، أعراض قابلة للمضاعف أثناء الطعام بل يجب تناوله قبل الطعام بساعة واحدة أو بعد الطعام ب ساعتين على الأقل.

إذا كنت أنت أو طفلك ريليفاست، تأكدي من انكما لا تأخذان أي دوائية أخرى تحتوي على المادة الفعالة، مونتيلوكاست.

إذا تناولت أنت أو طفلك عدد أقراص ريليفاست ٥ ملغم قابلة للمضاعف أكثر من التي عليكما تناولها

استشر طبيبك على الفور.

لم تتم الإقادة عن أي عوارض جانبية في أكثرية حالات فرط الجرعة التي أفاد عنها. تضمنت العوارض الأكثر شيوعاً التي أفاد عنها بسبب فرط الجرعة لدى البالغين والأطفال ألمًا في البطن ونعاساً وظلاماً وتنفساً وفرط نشاط.

إذا تسببت تناول ريليفاست أو تسببت إعطاء ريليفاست في حال الشك، استشر طبيبك.

حاول تناول إعطاء ريليفاست حسب وصفة الطبيب. ولكن إذا فوتت أنت أو طفلك جرعة، عاود برنامج العلاج المعتمد، أي قرص واحد في اليوم.

لا تتناولين تطعيلاً مضاعفة للتعریض عن الجرعة التي تسببتها.

إذا توقفت أنت أو طفلك عن تناول ريليفاست ٥ ملغم، أعراض قابلة للمضاعف

لا يمكن أن يعالج ريليفاست طبلة المدة التي يوصي بها طبيبك. سوف يساعد ذلك على التحكم بالربو الذي تعاني منه أنت أو طفلك.

إذا كان لديك أي أسلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، إسأل الطبيب أو الصيدلي.

٤- التأثيرات الجانبية المحتملة

مثل باقي الأدوية، يمكن أن يستحب ريليفاست ٥ ملغم، أعراض قابلة للمضاعف تأثيرات جانبية لا تصيب المرضى كله.

في الدراسات السريرية مع مونتيلوكاست ٥ ملغم، أعراض قابلة للمضاعف، كان التأثير الجانبي الأكثر شيوعاً الذي أفاد عنه (لدى مريض من أصل ١٠٠ مريض على الأقل ولدى أقل من مريض من أصل ١٠٠ أطفال مرضى معالجين) والذي يعتقد أنه ناتج عن المونتيلوكاست:

• الصداع

كما أفاد عن التأثير الجانبي التالي في الدراسات السريرية مع مونتيلوكاست ١٠ ملغم، أعراض مغلقة بطيئة رقيقة:

• ألم في البطن

كان هذا التأثير معتدل الحدة وأكثر شيوعاً لدى المرضى المعالجين بأقراص مونتيلوكاست مقارنة بالمرضى الذين تلقوا علاجاً وهمياً (حيث لا تحتوي على أي مادة فعالة).

بالإضافة إلى ذلك، أفاد عن التأثيرات الجانبية التالية:

• ميل متزايد إلى التزف،

• ارتكاسات تحسسية تتضمن طفح جلدي وتورّم الوجه وألم الشفتين وألم اللسان وألم الحلق مما قد يستحب صعوبة في

• تغيرات في التصرف والمزاج: أحلام غير طبيعية تتضمن كوابيس، هلوسات، سرعة إستثاره، شعور بالقلق، تململ، هياج يتضمن تصرفاً عدانياً، رُعاش، إكتئاب، أرق، أفكار وأفعال إنت Harring (في حالات نادرة جداً)،

• دوار، نعاس، تقليل/حدى، نوبة، خفقات،

• نزف من الأنف،

• إسهال، جفاف في الفم، عسر هضم، غثيان، نقيمة،

• التهاب الكبد،

• كدمات، حكة، شرى، ظهور كتل حمراء وحشاشة تحت الجلد تكون غالباً على مستوى حافة القصبة لديك (الحمامي العقدية)،

• ألم في المفاصل أو العضلات، تقلصات عضلية،

• تعب، توغل، تورّم، حمى.

لدى مرضى الربو المعالجين بمونتيلوكاست، أفيد عن حالات نادرة جداً من عوارض تتضمن داء يشبه الإنفلونزا وتنقل أو خدر الفرايين أو الساقين ونفاق العوارض الرئوية وأو طفحًا جلديًا (متلازمة تشيرج-ستراوس) يجب عليك إعلام طبيبك على الفور في حال أصبت أنت أو طفلك بأحد هذه العوارض أو بعدة عوارض منها.
اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلي حول التأثيرات الجانبية.
في حال تفاقم أحد التأثيرات الجانبية أو في حال لاحظت تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة أعلم الطبيب أو الصيدلي.

٥- كيفية حفظ ريليفاست ٥ ملغم، أقراص قابلة للمضاع

- إحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال ونظرهم.
- لا تستعمل ريليفاست بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المذكور على الظرف وعلى الغلاف الخارجي.
- إحفظ الدواء في في درجة حرارة لا تتعذر ٢٥°C في غلاف الأصلي بعيداً عن الضوء والرطوبة.
- لا ينبغي رمي الأدوية في المياه المبتلة أو مع النفايات المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها، فمن شأن هذه الإجراءات حماية البيئة.

٦- معلومات إضافية

ماذا يحتوي ريليفاست ٥ ملغم، أقراص قابلة للمضاع
المادة الفعالة: مونتيلوكاست (على هيئة مونتيلوكاست الصوديوم).
يحتوي كل قرص قابل للمضاع على مونتيلوكاست الصوديوم ما يعادل ٥ ملغم من المونتيلوكاست.
السوانغ: سليولوز ذيق البُلُورِيَّة، مانيتول، كروسكارميلوز الصوديوم، أكسيد الحديد الأحمر (إي ١٧٢)، هايدروكسي بروبيل سليولوز، نكهة الكرز، أسيترات (إي ٩٥١)، ستيرات المغنيزيوم.
كيف هو شكل ريليفاست ٥ ملغم، أقراص قابلة للمضاع ومحظيات العلبة
أقراص ريليفاست ٥ ملغم القابلة للمضاع هي أقراص مستديرة زهرية اللون ثنائية التحدب ومحفور على جهة واحدة من القرص "٥".
يأتي ريليفاست ٥ ملغم، أقراص قابلة للمضاع في علب من ٢٨ قرصاً.

إنتاج: بابياتيكي زكلي فارماسوتيزني بولفا ش.م.

بابياتيس، بولندا

لصلاح: أروان للصناعات الدوائية لبنان ش.م.ل.

جدرا، لبنان

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يوثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخبرران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.