

<p>أموكسيسيل ٤٤</p> <p>أموكسيسيلين</p>	
التركيب الكيافي والكيمي	
أموكسيل شراب خال من السكر/خال من الصيغة ١٢٥ ملجم يحتوي على ١٢٥ ملجم أموكسيسيلين في كل جرعة ٥ مل. أموكسيل شراب فورتيه خال من السكر/خال من الصيغة ٢٥٠ ملجم يحتوي على ٢٥٠ ملجم أموكسيسيلين في كل جرعة ٥ مل. الأموكسيسيلين يتواجد بشكل تراهيدرات.	
الشكل الصيدلاني	
أموكسيل شراب، وشراب فورتيه، شراب بنكهة الليمون خال من السكر/خال من الصيغة في قاعدة من السوربيتول. يُقدم بشكل مسحوق في زجاجات لتخضير ١٠٠ مل. لا تتوفر جميع الأصناف في كل سوق.	
دواعي الاستعمال	
علاج العدوى: أموكسيل مضاد حيوي له فعالية واسعة النطاق. يُستعمل لعلاج عدوى البكتريا الشائعة، مثل عدوى القناة التنفسية العليا، كعدوى الأذن والأنف والحنق، عدوى الأذن الوسطى والقناة التنفسية السفلى، كالالتهاب الشعبي الحاد والمزمن، والإنتان الشعبي المزمن، والتهاب الكلى الشعبي، و عدوى القناة التنفسية المعوية ، كحمى التيفوئيد وحمى نظيرة التيفوئيد، و عدوى الجداري التناسلية البولية ، كالتهاب المثانة، والتهاب المهبل، والتهاب الكلى وحوضتها، و وجود البكتريا في البول أثناء الحمل ، وال اجهاض التسممي ، و عدوى الجلد والأنسجة اللينة ، و الإنتان البطني الداخلي ، و السليلان ، و التشم الدودي ، و التهاب بطانة القلب ، و التهاب الليفوتيون ، و خراج الأسنان (كدواء مضاد لخراجة الأسنان)، و التهاب العظم والنخاع لدى الأطفال المصابين ب عدوى الجداري البولية ، يجب النظر في ضرورة التحري الوافية من التهاب بطانة القلب. أموكسيل يمكن استعماله للوقاية من البكتريا البولية المصاحبة للعمليات الجراحية كإنتلاخ الأسنان لدى مرضى معرضين لنشوء التهاب بطانة القلب المتسبب من البكتريا.	
المجموعة الجرمية <p>المجموعة الجرمية من الكائنات الحساسة لمفعول أموكسيل المبيد للبكتريا تشمل على:</p> <p>المجموعة الجرمية <i>Streptococcus faecalis</i>, <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Streptococcus pyogenes</i>, <i>Streptococcus viridans</i>, <i>Streptococcus pneumoniae</i> (penicillin-sensitive) <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Corynebacterium species</i>, <i>Bacillus anthracis</i>, <i>Listeria monocytogenes</i>, <i>Clostridium species</i> <i>Serratia marcescens</i>, <i>Haemophilus influenzae</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Proteus mirabilis</i>, <i>Salmonella species</i>, <i>Shigella species</i>, <i>Bordetella pertussis</i>, <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Brucella species</i>, <i>Neisseria gonorrhoeae</i>, <i>Neisseria meningitidis</i>, <i>Vibrio cholerae</i>, <i>Pasteurella septica</i></p> <p>المجموعة وطريقة الأخطاء</p> <p>علاج العدوى:</p> <p>الجرعة لتكبير (بما في ذلك العرضي المستثنى)</p> <p>عن طريق الفم:</p> <p>الجرعات القياسية للتكبير: ٢٥٠ ملجم ثلاث مرات يومياً، تزداد إلى ٥٠٠ ملجم ثلاث مرات يومياً للعدوى الأشد وبطءً.</p> <p>العلاج بجرعات كبرى (الجرعة القصوى الموصى بها عن طريق الفم ٦ جم يومياً في جرعات متجزة): يوصى بجرعة ٣ جم مرتين يومياً في حالات مناسبة لعلاج عدوى القناة التنفسية الفوقية الشديدة أو المتكررة.</p> <p>العلاج بحدوث حسمية عدوى الجداري البولية الحادة والبسيطة: جرعتان ٣ جم بين فترات طولها ١٠-١٢ ساعة. خراج الأسنان: جرعتان ٣ جم بعد مرور ٨ ساعات على كل جرعة السيلان جرعة واحدة ٣ جم.</p> <p>للحلق: ٥٠٠ ملجم داخل الفم كل ٨ ساعات (أو أحياناً أكثر اذا دعت الضرورة) في حالات العدوى المعتدلة (هذه الجرعة يجوز إعطائها بالحقن البطني في الوريد اذا كان ذلك أكثر ملاءمة) ١ جم داخل الوريد كل ٦ ساعات في حالات العدوى الشديدة.</p> <p>الجرعة للأطفال (سن افضاه ١٠ سنوات):</p> <p>عن طريق الفم:</p> <p>الجرعة القياسية للأطفال: ١٢٥ ملجم ثلاث مرات يومياً، تزداد إلى ٢٥٠ ملجم ثلاث مرات يومياً في حالات العدوى الأشد وبطءً، يوصى بأموكسيل معلق للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر، في عدوى الأذن الوسطى الحادة الشديدة أو المتكررة، على الأخص اذا كان الالتزام بالجرعة صعباً، يجوز استعمال ٧٥٠ ملجم مرتين يومياً لمدة يومين كترقية بديلة للعلاج لدى أطفال تتراوح أعمارهم من ٣ إلى ١٠ سنوات.</p> <p>للحلق: ٥٠٠-١٠٠٠ ملجم/كجم وزن جسم في اليوم، في جرعات متجزة.</p> <p>مرضى ضعف وظيفة الكلى: في حالات الضعف الكلوي، يتأخر إفراز المضاد الحيوي، واعتماداً على درجة الضعف، يجوز أن تدعو الضرورة الى تخفيض الجرعة اليومية الكلية حسب الترتيب التالي:</p> <p>الكبير والأطفال الذين يزيد وزنتهم عن ٤٠ كجم:</p> <p>ضعف بسيط (حيث تزيد إزاحة الكرياتينين عن ٢٠ مل/دقيقة): لا تغيير في الجرعة</p> <p>ضعف معتدل (إزاحة الكرياتينين ١٠-٢٠ مل/دقيقة): ٥٠٠ ملجم مرتين في اليوم كحد أقصى</p> <p>ضعف شديد (إزاحة الكرياتينين تقل عن ١٠ مل/دقيقة): ٥٠٠ ملجم/يوم كحد أقصى</p> <p>الأطفال الذين يقل وزنتهم عن ٤٠ كجم:</p> <p>ضعف بسيط (إزاحة الكرياتينين تزيد عن ٣٠ مل/دقيقة): لا تغيير في الجرعة</p> <p>ضعف معتدل (إزاحة الكرياتينين ١٠-٣٠ مل/دقيقة): ١٥ ملجم/كجم مرتين يومياً</p> <p>ضعف شديد (إزاحة الكرياتينين تقل عن ١٠ مل/دقيقة) ١٥ ملجم/كجم مرة واحدة في اليوم</p> <p>المرضى الذين يتلقون دليزة الليفريتون: الجرعة كما هي للمرضى المصابين بضعف كلوي شديد (حيث تقل إزاحة الكرياتينين عن ١٠ مل/دقيقة) الأموكسيسيلين لا تتم إزاحتها بالمليزة الليفريتهية.</p> <p>المرضى الذين يتلقون دليزة الدم: الجرعة كما هي للمرضى المصابين بضعف كلوي شديد (إزاحة الكرياتينين أقل من ١٠ مل/دقيقة) الأموكسيسيلون تتم إزachtه من الدورة الدموية بدليزة الدم، لذلك، يجوز إعطاء جرعة إضافية واحدة (٥٠٠ ملجم الكليبار أو ١٥ ملجم/كجم للأطفال الذين يقل وزنتهم عن ٤٠ كجم) أثناء الدليزة وعند نهاية كل دليزة في حالات الضعف الكلوي، يتأخر إفراز المضاد الحيوي، واعتماداً على درجة الضعف، يجوز أن تدعو الضرورة الى تخفيض الجرعة اليومية الكلية العلاج بالحقن أو التسريب يُستحسن اذا كان الاعطاء عن طريق الفم يُعتبر غير مناسب عملياً أو غير ملائم، وعلى الأخص للعلاج الملائع للعدوى الشديدة.</p> <p>1000000 0052613</p>	

الحالة	الجرعة للكبار (بما فيها الممتثنى)	الجرعة للأطفال	ملاحظات		
الاجزادات المتعلقة بالأسنان: <p>المرضى الذين لا يجري تخديرهم بمخدر عام</p>	٣ جم «أموكسيل» عن طريق الفم، قبل ساعة واحدة من الجراحة. <p>جوز إعطاء جرعة ثانية بعد ٦ ساعات اذا دعت الضرورة.</p>	أقل من ١٠ سنوات: نصف جرعة الكبار. <p>أقل من ٥ سنوات: ربع جرعة الكبار.</p>	ملاحظة (١) اذا أعطي «أموكسيل» لأغراض الوقاية من الجراحة، يجوز إعطاء جرعة ثانية بعد ٦ ساعات اذا دعت الضرورة.		
المرضى الذين يجري تخديرهم بمخدر عام، اذا كانت المضادات الحيوية عن طريق الفم تعتبر مناسبة.	في البداية: ٣ جم «أموكسيل» عن طريق الفم قبل أربع ساعات من التخدير، بعقبه ٣ جم عن طريق الفم (أو ١ جم في الوريد) أو في الحقل. <p>اذا لم يمكن تحمّل الجرعة عن طريق الفم في أقرب وقت ممكن بعد العملية.</p>	أقل من ١٠ سنوات: نصف جرعة الكبار. <p>أقل من ٥ سنوات: ربع جرعة الكبار.</p>	ملاحظة (٢) عند إعطاء مضادات حيوية بديلة اذا لزم إعطاء علاج وقائي مراراً أكثر، أو اذا تلقى المريض دورة علاج بالمسيلين أثناء الشهر السابق. <p>ملاحظة (٣) لتقليل الألم عند الحقن، يجوز إعطاء «أموكسيل» في حقنتين كل منهما ٥٠٠ ملجم، يُذاب كل منهما في محلول ٢١ ل. ليجنوكين معقم.</p> <p>(انظر الأخطاء).</p>		
الاجزادات المتعلقة بالأسنان: <p>المرضى الذين يُمنَح بالتحكيم الي المستطفي:</p> <p>(أ) يُعطى تخدير عام للمرضى الذين تم إعطائهم بنسليين في الشهر السابق.</p> <p>(ب) يعطى تخدير عام للمرضى الذين لديهم صمامات بديلة للقلب.</p> <p>(ج) المرضى الذين أصيبوا بوحدة واحدة أو أكثر من التهاب بطانة القلب.</p>	في البداية: ١ جم «أموكسيل» في الوريد أو في الحقل مع التخدير فوراً. <p>أقل من ٥ سنوات: ٣ ملجم/كجم.</p> <p>ملاحظة (٤) يرجى الاطلاع على نشرة الشركة المنتجة للحصول على كامل معلومات الوصف للجينتاميسين.</p>	أقل من ١٠ سنوات: نصف جرعة الكبار. <p>أقل من ٥ سنوات: ربع جرعة الكبار.</p>	انظر الملاحظة (٢) <p>ملاحظة (٣) لا يجوز مزج «أموكسيل» مع «أموكسيل» نصف جرعة الكبار، ويجب أن تكون الجرعة من جينتاميسين في المحفلة.</p> <p>ملاحظة (٤) يرجى الاطلاع على نشرة الشركة المنتجة للحصول على كامل معلومات الوصف للجينتاميسين.</p>		
جراحة المسالك التناسلية ^(١) البولية أو عند استعمال الآلات الطبية: <p>الوقاية لدى المرضى غير المصابين بعدوى المسالك البولية والذين ستجرى عليهم عمليات جراحية أو عند استعمال الآلات في المسالك التناسلية البولية بعد التخدير العام</p> <p>عمليات التوليد والأمراض التناسلية وجراحة المعدة والأعضاء – لا يوصى بالوقاية الروتينية الا للمرضى الذين لديهم صمامات بديلة للقلب</p>	في البداية: ١ جم «أموكسيل» في الوريد أو في الحقل مع التخدير فوراً. <p>أقل من ٥ سنوات: ٣ ملجم/كجم.</p> <p>ملاحظة (٥) يرجى الاطلاع على نشرة الشركة المنتجة للحصول على كامل معلومات الوصف للجينتاميسين.</p>	أقل من ١٠ سنوات: نصف جرعة الكبار. <p>أقل من ٥ سنوات: ربع جرعة الكبار.</p>	انظر الملاحظة (٢) أعلاه. <p>ملاحظة (٥) يجوز إعطاء الجرعة الثانية من «أموكسيل» عن طريق الفم على هيئة شراب «أموكسيل» الخالي من السكر/ومن الصيغة</p>		
المرضى الذين لديهم صمامات بديلة للقلب.	في البداية: ١ جم «أموكسيل» في الوريد أو في الحقل مع التخدير فوراً. <p>أقل من ٥ سنوات: ٣ ملجم/كجم.</p> <p>ملاحظة (٦) يرجى الاطلاع على نشرة الشركة المنتجة للحصول على كامل معلومات الوصف للجينتاميسين.</p>	أقل من ١٠ سنوات: نصف جرعة الكبار. <p>أقل من ٥ سنوات: ربع جرعة الكبار.</p>	انظر الملاحظات ٣ و ٤ و ٥ أعلاه.		
المرضى الذين لديهم صمامات بديلة للقلب.	في البداية: ١ جم «أموكسيل» في الوريد أو في الحقل مع التخدير فوراً. <p>أقل من ٥ سنوات: ٣ ملجم/كجم.</p> <p>ملاحظة (٦) يرجى الاطلاع على نشرة الشركة المنتجة للحصول على كامل معلومات الوصف للجينتاميسين.</p>	أقل من ١٠ سنوات: نصف جرعة الكبار. <p>أقل من ٥ سنوات: ربع جرعة الكبار.</p>	انظر الملاحظات ٣ و ٤ و ٥ أعلاه.		

الوقاية من التهاب بطانة القلب.

الأخطاء عن طريق الفم

دواعي الاستعمال

أموكسيسيلين هو عبارة عن بنسيلين ولا يجوز إعطاؤه لمرضى لديهم حساسية مفرطة لمضادات البنيدالكتام الحيوية (كـمستحضرات البنسيلين والـكيفاوسبورين) للأموكسيسيلين هو عبارة عن بنسيلين ولا يجوز إعطاؤه لمرضى لديهم حساسية مفرطة لمضادات البنيدالكتام الحيوية (كـمستحضرات البنسيلين والـكيفاوسبورين).

تحذيرات خاصة واحتياطات خاصة للاستعمال

قبل مباشرة العلاج بأموكسيل، يجب الاستفسار بدقة عن أي ردود فعل سابقة، ناشئة عن شدة الحساسية لمستحضرات البنسيلين أو الكيفاوسبورين. يجب اجتناب الأموكسيلين عند الشك في وجود كثرة وحدات البنية المعدنية، نظراً لأن هذه الحالة يصاحبها طغح حمصي الشكل بعد استعمال الأموكسيسيلين. الاستعمال على مدى فترة طويلة من الزمن قد يؤدي الى نمو كائنات غير حساسة نمواً مفرطاً.

يجب تعديل الجرعة لدى المرضى المصابين بضعف وظيفة الكلى. لا يحتمل أن يسبب مشكلة يوصى بإعطاء مضادات حيوية بديلة اذا لزم إعطاء علاج وقائي مراراً أكثر.

أما إذا تلقى المريض دورة علاج بالمسيلين أثناء

البروبيوتسيد يقلل الافراز الكلوي الانبويي للأموكسيسيلين. واستعماله في نفس الوقت مع أموكسيل قد يؤدي الى زيادة مستويات الأموكسيسيلين في الدم على مدى فترات طويلة كئنانً المضادات الحيوية الأخرى، يجوز أن يؤثر أموكسيل على التثبيت المعوي، مما يؤدي الى تخفيض إعادة امتصاص الاستروجين وتقليل فعالية العقاقير المحتطلة للمناعة للحمل.

ملاحظة (٢) لتقليل الألم عند الحقن، يجوز إعطاء «أموكسيل» في حقنتين كل

٥٠٠ ملجم، يُذاب كل منهما في محلول ٢١ ل. ليجنوكين معقم.

(انظر الأخطاء).

يرد ذكر المادة الدالة لدى مرضى يتلقون الأموكسيسيلين. يجب مراقبة تأثير العلاج بشكل مناسب عند وصف الأدوية المضادة للتخثر في نفس الوقت.

الحمل والأرضاع

يجوز استعمال أموكسيل أثناء الحمل اذا كانت الفوائد المتأخرة تفوق المخاطر المحتملة التي تصحب العلاج.

أموكسيل يجوز إعطاؤه أثناء فترة الارضاع، باستثناء مخاطر نشوء الحساسية التي تصحب افراز كريات خضوية من الأموكسيسيلين في حليب الثدي، لا توجد أي تأثيرات ضارة معروفة بالنسبة للرضع.

التأثيرات غير المستجيبة

اضطرابات الدم والجهاز اللمفاوي:

نقص قابل للاعكاس في الصفائح الدموية وفقر دموي انحلالي، وإطالة مدة الانماء والعدة التي يستغرقها اليروثرومين.

اضطرابات الجهاز الهضمي:

كئنانً المضادات الحيوية الأخرى، ردود فعل أرجينية شديدة، من جملتها إيدما وعائية عمسية، وآقي، ومرض الحمل، والتهاب الأوعية المصاحبة لنشء الحساسية. اذا تم الإبلاغ برر فعل لنشء الحساسية، يجب وقف العلاج.

اضطرابات الجهاز العصبي:

فرب النشاط الحركي، ودوخة، وتشنجات.

تشنجات يجوز أن تطرأ لدى مرضى مصابين بضعف وظيفة الكلى أو الذين يتلقون جرعات عالية.

حالات العدوى والتهلاذ:

داء المبيطات البطني المصاحبي.

الاضطرابات العصبية العمودية:

اسهال، غثيان، تقوُّم التهاب القولون المصاحب للمضاد الحيوي (بما في ذلك التهاب القولون الغشائي الكاذب والتهاب القولون التشنجي والاسنان العنبر الأسود، ورد ذكر اسفاراض سطحي في الأسنان لدى الأطفال.

النتفاضة الغموية الجيدة يجوز أن تساعد على تقليل الاسفرار ويمكن إزالة هذا الاسفرار عادة بتقليل الأسنان بالفريضة.

اضطرابات الكبد والكلى:

التهاب الكبد واليرقان الكريستاتي.

زيادة معتدلة في AST و/أو ALT لم تتضح أعمية هذه الزيادة في AST و/أو ALT.

الاضطرابات الجلدية واضطرابات الأنسجة:

تحت الجلد: طفح جلدي، حرق، حكاك، ردود فعل جلدية كالحامى المتعددة الشكل، متلازمة ستيفنز-جانسون، موت خلايا البثرة السمي، التهاب الجداري القاعبي والدمعش وطفح برقي حاد، قاعمر ويتامل (AGEP).

اضطرابات العجباري:

التكويمة والبوليمية.

التهاب الكلى الخلالي، والبليلة البولية.

تجاوز الجرعة

يجوز أن تظهر تأثيرات معدية معوية كالغثيان والتقيؤ والاسهال. أعراض اختلال توازن الماء/الكترولايث يجب علاجها عرضياً.

شوهدت بيلة بلورية متسبية من الأموكسيسيلين وفي بعض الحالات أدت الى فشل كلوي.

الأموكسيسيلين يمكن إزالته من الدورة الدموية بدليزة الدم.

قائمة المتلفطات

المسحوق يحتوي على ايديتات الياصوديوم، بنزوات الصوديوم (E21١)، صوديوم السكرين، سوليكا (E6S١)، صمغ أرشاثان (E4١5)، نكهات الخوخ والفراولة والليمون الجافة والسوربيتول (E420).

مدة الصلاحية

تاريخ الانتهاء مبين على العبوة الخارجية.

احتياطات خاصة بالتخزين

لا يجوز حفظه بدرجة حرارة تزيد عن ٢٥°م، يجب حفظ المسحوق في مكان جاف، بمجرد تخضيره، أموكسيل شراب الخالي من السكر/الخالي من الصيغة يجب استعماله في حدود ١٤ يوماً، اذا لزم تخفيف هذا المستحضر المعاد تركيبه، يجب استعمال الماء.

<p>انتاج: سيكتلاين بيتشام م ج * ورنيج، المملكة المتحدة</p> <p>* شركة ننتمي الى مجموعة شركات جلاكسو سيكتلاين</p> <p>أموكسيل علامة تجارية تمتلكها مجموعة شركات جلاكسو سيكتلاين</p> <p>© مجموعة شركات جلاكسو سيكتلاين، ٢٠٠٧. جميع الحقوق محفوظة</p> <p>نص رقم GDS2٠/IP03</p> <p>تاريخ الاصدار ٢٤ ابريل ٢٠٠٦</p>	<p>ان هذا الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً لتعليمات عرضك للخطر</p> <p>– اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.</p> <p>– فالتبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.</p> <p>– لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.</p> <p>– لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.</p> <p>لا تشتره الاولية في مشاوش ايممي الأطفال</p> <p>مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدالة العرب</p>
--	--