

التعريف:

الاسم التجاري: جستا®

اسم تركيب البنية الكيميائية:

بروجسترون

العبوة: كل قرصجة (خميلة) تحتوي على ٢٠٠ ملغم بروجسترون، ٤٠٠ ملغم

بروجسترون

السواغ: سابوسير BS2.

المجموعة العلاجية الكيميائية:

بروجسترون هو بروجسترون ستيرويدي

دواعي الاستعمال:

١) لعلاج متلازمات (أعراض وعلامات) ما قبل الحيض "الطمث" تشمل التوتر النفسي لما قبل الحيض والاكتئاب.

٢) لعلاج الاكتئاب النفاسي (اكتئاب ما بعد الولادة).

٣) يستخدم كعلاج بديل في حالات الإفراز غير الكافي لهرمون البروجسترون لدى النساء المشاركات في برامج الإخصاب.

المكونات النشطة وغير النشطة وحجمها:

كل قرصجة (خميلة) تحتوي على ٢٠٠ ملغم، ٤٠٠ ملغم بروجسترون كمكون

نشط، دسم نباتي كمكون غير نشط.

قائمة معلومات

موانع الاستعمال:

نزيف مهبلي غير مشخص

الاحتياطات:

يستعمل العلاج عن طريق المهبل إذا كان المريض يعاني من التهاب في الفولون أو التبرز اللاإرادي (عند فقدان المقدرة على التحكم في التبرز).

يتم أيضاً (استهلاب) البروجسترون في الكبد، لذلك يجب مراعاة الحذر عند استعماله لدى المرضى الذين يعانون من القصور في وظائف الكبد.

يحتوي جستا على هرمون البروجسترون الذي يوجد بتركيز معتد لدى النساء أثناء النصف الثاني من دورة الحيض الشهرية وأثناء فترة الحمل.

ويجب وضع هذا في الاعتبار عند معالجة المرضى الذين يعانون حساسية من الهرمونات.

التأثيرات التداخلية للدواء مع الغذاء

غير معروفة

تحذيرات خاصة

لدى الأطفال

يجب عدم استعماله

لدى النساء الحوامل

من غير المتوقع استخدامه مع النساء الحوامل إلا إذا نصح الطبيب المعالج بذلك.

وبما أن البروجسترون هرمون طبيعي، فإنه لا يتوقع أن تكون له آثار عكسية، وعلى الرغم من ذلك لا توجد دلائل على وجود هذه الآثار.

لدى النساء المرضعات

وبما أن البروجسترون هرمون طبيعي، فإنه لا يتوقع أن تكون له آثار عكسية، وعلى الرغم من ذلك لا توجد دلائل على وجود هذه الآثار.

لدى كبار السن

يجب عدم استعماله

لدى ذوي الحالات المرضية الخاصة

يتم أيضاً (استهلاب) البروجسترون في الكبد، لذلك يجب مراعاة الحذر عند استعماله لدى المرضى الذين يعانون من القصور في وظائف الكبد.

التأثيرات المحتملة للمقدرة في قيادة السيارات واستعمال الآلات

غير معروفة

تفاصيل السواغ (مواد لا تأثير لها تترجم مع الدواء لتسهيل امتصاصه) لا توجد

تعليمات الاستعمال الصحيح

الجرعات العلاجية

البالغون: ٢٠٠ ملغم يومياً إلى ٤٠٠ ملغم مرتين في اليوم، عن طريق المهبل.

لتلازمات ما قبل الحيض "الطمث" يبدأ العلاج في اليوم الرابع عشر (١٤) لدورة الحيض الشهرية، ويستمر حتى بداية دورة الحيض الشهرية التالية

وفي حالة وجود الأعراض في فترة التبويض (الاباضة)، يبدأ العلاج في اليوم الثاني عشر (١٢).

للمساعدة في عمليات الإخصاب: الجرعة المقترحة ٢٠٠ ملغم يومياً عن طريق المهبل ويمكن زيادة الجرعة إلى ٤٠٠ ملغم مرتان يومياً.

طرق الاستعمالات العلاجية

عن طريق المهبل

فترة العلاج

يتم تحديد العلاج لكل حالة على حدها راجع الجرعات العلاجية اعلاه.

الإفراط في الجرعات العلاجية

هنالك مجال واسع لإمان فرازج (خميلات) جستا® إلا أن الإفراط في الجرعات قد يسبب حالات شفق (اطمنان حلمي وهمي الصحة) أو عسر الطمث (آلم واحتقان شديد في منطقة الحوض المحيطة بالرحم أثناء

الحيض).

ما يجب إتباعه عند عدم أخذ جرعة أو جرعات علاجية

على المريض الاستمرار في العلاج كما جاء وصفه من قبل.

تأثيرات- وخطورة سحب العلاج

لا توجد

التأثيرات غير المرغوبة

حدوث الطمث قبل ميعاده، أو حدوثه نادراً، وقد يتأخر موعد الطمث.

وكغيره من المستحضرات العلاجية عند الاستعمالات المهبلية قد يحدث تسرب تدريجي في الفرازج.

شروط التخزين

يجب حفظ الدواء في درجة حرارة تقل عن ٢٥°م وفي مكان جاف

تحذير من آثار التلف المرئية في الفرازج (خميلات):

لا نستعمل الدواء

الأشكال الصيدلانية:

التحاميل

جستا® ٢٠٠ ملغم / ١٥ خميلة.

جستا® ٢٠٠ ملغم / ٣٠ خميلة.

جستا® ٤٠٠ ملغم / ١٥ خميلة.

جستا® ٤٠٠ ملغم / ٣٠ خميلة.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغيه وبضوره.

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

- احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيادلة العرب