

Colchicine 1mg

OPOCALCIUM
colchicine

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

■ IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

DÉNOMINATION :

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 mg, comprimé

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Colchicine cristallisée 1 mg

Excipients : saccharose, stéarate de magnésium, polyvidone, érythrosine (laque aluminique) (E127), lactose.

Pour un comprimé de 75 mg

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé, Boîte de 20 comprimés

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

ANTI-GOUTTEUX

Anti-inflammatoire

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ / EXPLOITANT :

Laboratoires Galéniques Vernin - 20, rue Louis-Charles Vernin - 77190 DAMMARIE-LES-LYS - FRANCE

FABRICANT :

Sanofi Winthrop Industrie - 56, route de Choisy au Bac - 60200 COMPIÈGNE - France

■ DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans :

- le traitement et la prévention des crises de goutte,
- la maladie périodique,
- la maladie de Behçet,
- autres accès aigus microcristallins.

■ ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- maladie rénale grave,
- maladie grave du foie.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).
- En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).
- La prise concomitante de colchicine avec certains antibiotiques (voir interactions médicamenteuses) est déconseillée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas de traitement au long cours, surveiller la formule sanguine régulièrement.

En cas de maladie du foie et du rein, CONSULTER VOTRE MÉDECIN.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Ce médicament est déconseillé avec certains antibiotiques (pristinamycine, telithromycine, azithromycine, clarithromycine, dirithromycine, erythromycine, josamycine, midecamycine, roxithromycine, troleandomycine sauf la spiramycine).

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT, CONSULTER VOTRE MÉDECIN.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Lactose, saccharose.

■ COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE

• Accès aigu de goutte :

le 1^{er} jour : 3 comprimés (1 le matin, 1 le midi et 1 le soir)

le 2^{ème} et le 3^{ème} jour : 2 comprimés (1 le matin et 1 le soir)

le 4^{ème} jour et les jours suivants : 1 comprimé le soir.

• Prophylaxie des accès aigus de goutte : 1 comprimé le soir.

• Autres accès aigus microcristallins, maladie périodique, maladie de Behçet :

1 comprimé le soir.

Dans tous les cas, respecter strictement l'ordonnance de votre médecin.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

FRÉQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Ce médicament doit être administré de préférence au moment des repas.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de surdosage, CONSULTER IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN, UN CENTRE ANTI-POISON OU UN CENTRE DE SOINS D'URGENCE, même si l'état apparent du malade ne semble pas modifié.

CONDUITE À TENIR AU CAS OÙ L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ÉTÉ OMISE

En cas d'oubli, négliger la prise omise et continuer le traitement comme prévu. Ne pas doubler la dose.

■ EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- Troubles digestifs (diarrhées, nausées, vomissements), urticaire, éruptions cutanées.
- Exceptionnellement : troubles sanguins (cf. précautions d'emploi).
- Azoospermie (absence de spermatozoïdes dans le sperme) et troubles neuromusculaires réversibles à l'arrêt du traitement.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

■ CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas +25°C et à l'abri de la lumière

■ DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Avril 2008.

