

EPO



TM

ريني

التركيب :

كل قرص للمضيق يحتوي على :

كربونات الكالسيوم .....	٦٨ ملغم
كربونات المغنيسيوم .....	٨٠ ملغم

دوعي الاستعمال :

حرقة المعدة الناتج عن إزدياد الحموضة، الإضطراب والألم المعدى، سوء الهضم والشعور بالإنتفاخ والتتخمة والغثيان.

الجرعة :

يمضن أو يمضن قرص أو قرصان عند الحاجة، يكرر الإستعمال عند الحاجة بحد أقصى ١٦ قرصاً في اليوم إذا استمرت الأعراض بعد ذلك فإنه ينبغي استشارة الطبيب.

موانع الاستعمال :

يجب عدم استعمال الدواء في حالات القصور الكلوي أو زيادة مستوى الكالسيوم في الدم.  
يُخزن ريني في درجة حرارة الغرفة (١٥° - ٢٥° م) ويحفظ بعيداً عن الرطوبة. يُرجى الإحتفاظ بالدوا، بعيداً عن متناول الأطفال.

صنعت بموجب ترخيص صادر من باير كونسيومر كير، أ.ج بازل، سويسرا بواسطة ديلفام جيلار، فرنسا  
ريني": علامة تجارية مسجلة

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إنبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني التي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلاني هما الخبران بالدوا، وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاً، نفسك.
- لا تكرر صرف الدوا، بدون وصفة طيبة.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب  
وأتحاد الصيادلة العرب

Bayer باير

