

داناللي[®] كليندامايسين

الوصف:

داناللي[®] هو محلول كحولي موضعي يحتوي على كليندامايسين فوسفات مضاد حيوي شبه مصنوع، ملح عضوي ذاتي في الماء، بالرغم من أن كليندامايسين فوسفات مضاد حيوي شبه مصنوع، لكنه يحتل بشكل بسيط في المخثن، لأنه يحتوي على مركب نشط كمضاد حيوي.

الخصائص:

كليندامايسين هو مضاد حيوي من مجموعة النيوكروزاميد الذي يوقف نمو وتكاثر البكتيريا الهوائية موجبة غرام والبكتيريا اللاهوائية. تم ملاحظة تأثير متباين بين كليندامايسين وبين كليندامايسين. تم ملاحظة خصائص في المفعول بين كليندامايسين وإيريشومايسين.

يصل كليندامايسين إلى تركيز منخفض جداً في الدم (٠ - ٣ نانوغرام /مل) بعد إستعماله المتكرر على الجلد وتحصل على أقل من ٢٪ من الجرعة في البول على شكل كليندامايسين حر.

تم إثبات فاعلية كليندامايسين على العد⁺ الفطري في المرضى الذين يعانون من العد الشائع (حب الشباب). في تجارب الزجاج، يُبطّل كليندامايسين كل البكتيريا من نوع بروبيونيك باكتيريو أكس المزعروعة والخاضعة للتجارب، ينخفض تراكيز الأحماض الدهنية الحرة الموجودة في الجلد من ١٤٪ إلى ٢٪ وذلك بعد تطبيق كليندامايسين.

دعاوى الاستعمال:

بوصف محلول داناللي[®] الموضعي لعلاج العد الشائع (حب الشباب).

الجرعات وطريقة الاستعمال:

تدهن طبقة رقيقة من محلول داناللي[®] الموضعي على المناطق المصابة مرتين يومياً.

ملاحظات للمريض:

- تغسل المناطق المصابة قبل التطبيق بماء فاتر وصابون، ثم تشطف وتتجف.

- يحتوي محلول داناللي[®] الموضعي على قاعدة كحولية والتي قد تسبب حرقاً وتهيج للعين. تغسل المنطقة المصابة بكميات وافرة من ماء الصنبور البارد وذلك عند حدوث تلامس بطيء لفطنة مع الأسطح المتسخة (العنون، الجلد المكشوط، الأغشية المخاطية).

- يجب تجنب الاحتكاك بالجلد وذلك عند التطبيق المستحضر حول القدم، إذ أن له طماحاً غير مستساغ.

- بعد الإغتسال أو الحلاقة، يفضل الانتظار ٣٠ دقيقة قبل التطبيق. يمكن ان يُطهّر الكحول المناطق المغسولة أو الملوونة حديثاً.

- يجب إبعاد التعليمات التالية عند إستعمال محلول داناللي[®] الموضعي ٣٠ مل:

* يرفع الطاء ويطهر جانبياً تثبيت القطة المرفرفة الخاصة بتطبيقات محلول (أداة التطبيق) على العبرة ويحكم إغلاقها.

* تستعمل أداة التطبيق بحركة رسمية بطيئة بدلاً من حركة الدحرجة، بالإضافة زيادة تدفق الدواء من آداة التطبيق بالضغط قليلاً على الجلد.

- يجب إبعاد التعليمات التالية عند إستعمال محلول داناللي[®] الموضعي ٥٠ مل: توضع عدة قطرات من محلول على قطعة صغيرة من القطن وذلك بالضغط على الجبيرة وتدهن على المناطق المصابة.

دعاوى الاستعمال:

يمكن استخدام محلول كليندامايسين الموضعي في المرضى الذين سبق وأن تحسسوا من هذا المضاد الحيوي. على الرغم من أنه لم يثبت حدوث حساسية متباينة بين كليندامايسين وبين كليندامايسين، إلا أنه يوصى بعد إستعمال محلول كليندامايسين الموضعي في المرضى الذين يعانون من حساسية ضد كليندامايسين.

يمكن إستعمال محلول كليندامايسين الموضعي في المرضى للإصابة بالتهاب الأمعاء الموضعي أو التهاب القولون التقرحي، أو تاربخ مرضي للاصابة بالتهاب القولون المصاحب لاستعمال المضادات الحيوية.

محاذير الاستعمال:

* يجب عدم إستعمال محلول كليندامايسين الموضعي على المرضى الذين يعانون من تحسسوا من هذا المضاد الحيوي. على الرغم من أنه لم يثبت حدوث حساسية متباينة بين كليندامايسين وبين كليندامايسين.

إلى إمكانية حدوث إسهال، إنتفاخ القولون، والتهاب غشاء القولون، والتهاب الأمعاء الموضعي أو التهاب القولون التقرحي، أو تاربخ مرضي للاصابة بالتهاب القولون المصاحب لاستعمال المضادات الحيوية.

محاذير الاستعمال:

* يجب عدم إستعمال محلول كليندامايسين الذي يorrhئ عن طريق الماء أو البراز، وكما هو الحال مع معظم المضادات الحيوية الأخرى يحدوث التهاب غشاء القولون الكاذب بصورة شديدة.

شديدة. على حال، فإن الدراسات ما بعد التسويق أثبتت حدوث التهاب القولون بعد إستعمال محلول كليندامايسين الموضعي ولكن بنسبة قليلة. يجب على الطبيب انتباه إلى إمكانية حدوث إسهال، إنتفاخ القولون، والتهاب غشاء القولون، والتهاب الأمعاء الموضعي وذلك عند حدوث إسهال بشكل كبير أو المتقطع.

تم ملاحظة حدوث إسهال، إنتفاخ القولون، والتهاب غشاء القولون الكاذب خلال الأسابيع الأولى من التوقف عن إستعمال كليندامايسين الذي يorrhئ عن طريق الماء أو البراز.

أثبتت الدراسات بأن السمية التي تنتجه كلوكستيروديوم ديفيسين هي السبب الرئيسي لحدوث التهاب القولون المرتبط بإستعمال المضادات الحيوية. عادة ما تختفي التهاب القولون بحدوث إسهال شديد ومستمر وتشنجات في البطن. يمكن أن يظهر المنظار الداخلي حدوث التهاب غشاء القولون الكاذب.

كلوستيريدوم ديفيسيل /أو البحث عن السموم التي تنتجه كلوستيريدوم ديفيسيل في التشخيص.

إن فانكومايسين فعال في علاج التهاب القولون الناتج عن كلوستيريدوم ديفيسيل والمرتبط بإستعمال المضادات الحيوية. تبلغ الجرعة الإعتيادية ١٢٥ - ٥٠٠ ملغم تعطى عن طريق الفم كل ٦ ساعات ولمدة ٧ - ١٠ أيام. قد يكون من الضروري توفير رعاية طبية مساندة إضافية.

قد تستجيب حالات التهاب القولون المتوسطة للتوقف عن إستعمال كلينداميسين لوحده. ظهر في تجارب الزجاج بأن كوليستيرامين وكوليستيمول ترتبط مع السموم التي تنتجه كلوستيريدوم ديفيسيل، ويأن كوليستيرامين توفر رعاية طبية مساندة إضافية. تبلغ الجرعة الإعتيادية ١٢٥ - ٥٠٠ ملغم تعطى عن طريق الفم كل ٦ ساعات ولمدة ٧ - ١٠ أيام. قد يكون من الضروري توفير رعاية طبية مساندة إضافية.

يجب أن يوصى بفانكومايسين: إذا فعند إستعمال كوليستيرامين وفانكومايسين بشكل متزامن، يجب أن يفضل الإعطاء لمدة ساعتين على الأقل.

يجب أن يوصى بفاندندامايسين الموضعي بذرة في المرضي الذين يعانون من فرط تحسس.

يُفضل إستعمال مواد تحفيظ مائية على أن لا تستعمل بشكل كثيف أو بكثرة.

لم يثبت بعد مدى إستعمال كلينداميسين أو فاعليته في الأطفال دون سن الثانية عشرة.

تجنب إستعمال المستحضر قرب مصدر حرارة، النار أو أثناء التدخين حيث أنه سريع الإشتعال.

الاستعمال خلال فترة الحمل والإرضاع:

فترة الحمل

الحمل: لم يثبت مدى أمان إستعماله في فترة الحمل. لم تظهر الدراسات التكاثرية التي أجريت على الفئران والجرذان حدوث ضعف في الخصوبة أو آذى على الجنين بسبب كلينداميسين وذلك بعد إعطاء جرائم تحفظ الجلد أو عن طريق الفم تتجاوز من ١٠٠ إلى ٦٠٠ ملغم/كم يوم من كلينداميسين.

على أيام حال فإنه لا تتوفر دراسات وافية ومؤكدة عن تأثير الدواء على الجنين ليس بالضرورة أن تتسبب ببرد فعل الإنسان، وبالتالي يجب إستعمال هذا الدواء في فترة الحمل عند ضرورة الملة فقط.

والاضغاع: من غير المعروف ما إذا كان كلينداميسين يُفرز في حليب الأم بعد الإستعمال الموضعي. على أيام حال، فقد تم تسجيل ظهور كلينداميسين الذي يؤخذ عن طريق الفم أو الزرق في حليب الأم. كقاعدة عامة، فإنه يجب عدم الإرضاع والمريضة تحت تأثير الدواء لأن كثيراً من الأدوية تُفرز في حليب الأم.

التدخلات الدوائية:

ظهور بآثار كلينداميسين يمتلك خصائص عضلية عصبية مانعة وبالتالي قد تعرّز من مفعول أدوية عضلية عصبية مانعة أخرى. لذا، يجب إستعماله بذرة في المرضي الذين يأخذون هذه الأدوية.

الأعراض الجانبية:

إن الأعراض الجانبية المسجلة في الدراسات السريرية كانت بسيطة وحدثت بنسبة مشابهة للدواء الكاذب.

كلينداميسين الموضعي:

أعراض الملين: وفرز في البطن، انتفاخات، إنتفاخات، إلتهاب الجريبات سالي الغرام.

أعراض هضمية: ألم في البطن، انتفاخات هضمية.

الجلد وأعراض ما تحت الجلد: تهيج الجلد، إلتهاب الجلد التماسي، زيادة دهنية الجلد، حكة.

فرط الحرارة:

يمكن أن يتم امتصاص كلينداميسين عند إستعماله موضعياً بكثبة لحدوث أثاراً جهازية.

ظروف الحفظ:

يحفظ بين ٣٠ - ٤٥°C. تحفظ العبوة مكمة الإغلاق.

كيفية التزويد:

دانالي ٥ م محلول موضعي: كل ١ ملتر يحتوي على كلينداميسين فوسفات ما يعادل كلينداميسين ١٠ ملغم في عبوات سعة ٣٠ و ٥٠ ملتر.

السواغات:

أيزو بروبيل كحول، بروبيلين جليكول، ماء نقي.

إن هذا دواء

ـ الدواء مستحضر ي يؤثر على صحتك واستهلاكه خلال التطليمات يعرضك للخطر.

ـ إن بذلة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

ـ إن الطبيب والصيدلاني هما الفيزياء بالدواء ويتناوله وشربه.

ـ لا لقطع مدة العلاج المحددة لك من ثلاثة نفسك.

ـ لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

ـ إنفصال الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.