

# DANALLI® T

## Clindamycine

### Description:

DANALLI® T est une solution d'actualité Alcoolisée de Phosphate de Clindamycine. Le phosphate de Clindamycine est une eau ester soluble de l'antibiotique à demi synthétique. Bien que le phosphate de Clindamycine est inactif in vitro, le rapide dans l'hydrolyse de vivo convertit ce composé au Clindamycine antibactériement actif.

### Propriétés:

Clindamycine est un antibiotique de lincosamide avec une principalement action de bacteriostatic contre aerobes Gramme-Positif et une grande variété de bactéries anaérobiques. La résistance fâchée a été démontrée entre Clindamycine et Lincomycin. L'antagonisme a été démontré entre Clindamycine et l'Erythromycine.

Les applications d'actualité, multiples et suivantes un bas niveau mêmes de Clindamycine sont présents dans le sérum (0 – 3 ng/ mL) et moins que 0,2% de la dose est repris dans l'urine comme Clindamycine.

L'activité de Clindamycine a été démontrée dans comedones des malades d'acné. Clindamycine in vitro gêne toutes cultures de *Propionibacterium acnes* essayées. Libérer des acides gras sur la surface de peau ont été diminués d'approximativement 14% à 2% application suivante de Clindamycine.

### Indications:

DANALLI® T la solution d'actualité est indiquée pour le traitement de vulgaris d'acné.

### Dosage et Administration:

Appliquer un film mince de DANALLI® T la solution d'actualité deux fois quotidiennement au secteur affecté.

### Le malade note:

- Laver des secteurs affectés, avant l'application, avec l'eau et le savon chaude ; le rinçage et caresse sèche.
- DANALLI® T la solution d'actualité contient une base d'Alcool qui causera brûler et l'irritation de l'oeil. En cas du contact accidentel avec les surfaces sensibles (l'oeil, la peau abrasé, les muqueuses), se baigner avec les quantités abondantes d'eau de robinet fraîche.
- La solution a un goût et la prudence désagréables devraient être exercées en appliquant des médicaments autour de la bouche.
- Après laver ou raser, c'est meilleur attendre 30 minutes avant appliquer. L'Alcool peut irriter la peau fraîchement lavée ou rasée.
- **Pour DANALLI® T la solution d'actualité 30 ml, suivre ces instruction:**
- \* Enlever le bouchon et rejeter, l'applicateur de presse dans la bouteille et le cachet fermement en resserrant le bouchon.
- \* Utiliser l'applicateur avec un tamponne le mouvement au lieu d'un mouvement roulant. Vous pouvez faire le flux de médecine plus rapide de la pointe d'applicateur par augmentant légèrement la pression contre la peau.
- **Pour DANALLI® T la solution d'actualité 50 ml, suivre ces instruction:** Serrer peu de baisses de la solution sur un petit morceau de coton et appliquer au secteur affecté.

### Contre-indications:

Clindamycine la solution d'actualité est contre-indique dans les malades a trouvé auparavant pour être hypersensible à cet antibiotique. Bien que fâché-sensitization à Lincomycin n'a pas été démontré, il est recommandé que Clindamycine la solution d'actualité ne pas utilise dans les malades qui ont démontré la sensibilité de Lincomycin.

Clindamycine la solution d'actualité est contre-indiquée dans les individus avec une histoire d'entérite régional ou de colite d'ulcéraire, ou une histoire de colite d'antibiotique-associé.

### Précautions:

- Les Produits contenant du peroxyde de Benzoyle ne devrait pas être simultanément utilisé avec Clindamycine la Solution D'actualité.
- Oral et parenteral Clindamycine, de même que la plupart des autres antibiotiques, a été associé avec la colite de pseudomembranous sévère. Les études de poste-commercialisation, cependant, a indiqué une incidence très basse de colite avec la solution de milandres-enseignement assisté par ordinateur de Clindamycine. Le médicament doit, est vigilant au développement d'antibiotique diarrhée ou la colite associée. Si la diarrhée significative ou prolongée arrive, le produit devrait être immédiatement interrompu.
- La diarrhée, la colite, et la colite de pseudomembranous a été observé pour commencer jusqu'à plusieurs semaines suivant la cessation d'oral et thérapie de parenteral avec Clindamycine.
- Les études indiquent une toxine (les toxines) produit par *Clostridium difficile* est la cause majeure d'antibiotique colite associée.

La colite est d'ordinaire caractérisée par la diarrhée persistante et sévère et les crampes abdominales. L'examen endoscopique peut révéler la colite de pseudomembranous. La culture de tabouret pour l'essai de et/ou de *C. difficile* pour la toxine de *C. difficile* peut être serviable au diagnostic.

Vancomycin est efficace dans le traitement de colite d'antibiotique-associé produite par *C. difficile*. La dose normale est 125 - 500 mg oralement chaque 6 heures pour 7 - 10 jours. Le soin médical, de soutien et supplémentaire peut être nécessaire.

Les cas doux de colite peuvent répondre au désistement de Clindamycine seul. Les résines de Colestyramine et Colestipol ont été montrées pour lier la toxine de *C. difficile* in vitro, et Colestyramine a été efficace dans le traitement de quelques cas doux de colite antibiotique-associé. Les résines de Colestyramine ont été montrées pour lier Vancomycin; donc, quand Colestyramine et Vancomycin sont simultanément utilisés, leur administration devrait être séparée par au moins deux heures.

• Clindamycine D'actualité devrait être prescrit avec la prudence aux individus d'atopie.

• L'Usage seulement arrose-ignoble cosmétique et ne s'applique pas aussi lourdement ou aussi souvent.

• La Sécurité et l'efficacité dans les enfants sous l'âge de 12 ans n'ont pas été établies.

- Éviter utilisant près la chaleur, ouvrir la flamme ou pendant que fumer parce que c'est inflammable.

#### **Grossesse et Allaitement:**

Catégorie B de la grossesse

**Grossesse:** La sécurité pour l'usage dans la grossesse n'a pas été établie. Les études de reproduction ont été exécutées dans les rats et les souris utilisant des doses sous-cutanées et orales d'entendre de Clindamycine de 100 à 600 mg/le kg/le jour et n'a pas révélé de preuve de fertilité ou le mal réduite au foetus en raison de Clindamycine.

Il y a, cependant, les études non suffisantes et bien-contrôlés dans les femmes enceintes. Parce que les études animales de reproduction ne sont pas toujours prophétiques de réponse humaine, ce drogue devrait être utilisé pendant la grossesse seulement si clairement nécessaire.

**Allaitement:** On ne sait pas si Clindamycine est excrété dans le lait humain suivant l'usage de solution d'actualité. Cependant, oralement et parenterally a administré Clindamycine a été rapporté pour apparaître dans le lait de sein. En règle général, soigner ne devrait pas être entrepris pendant qu'un malade est sur un drogue puisque beaucoup de drogues sont excrétés dans le lait humain.

#### **Interactions médicamenteuses:**

Clindamycine a été montré pour avoir les propriétés de blocage neuromusculaires qui peuvent améliorer l'action d'autres agents de blocages neuromusculaires. Donc, il devrait être utilisé avec la prudence dans les malades recevant tels agents.

#### **Effets indésirables:**

Les effets secondaires rapportés dans les procès cliniques ont été mineurs et d'une incidence similaire au placebo.

La sécheresse de peau est l'effet secondaire le plus commun vue avec la solution d'actualité. Par ailleurs, les effets secondaires suivants ont été rapportés avec l'usage de Clindamycine d'actualité:

*L'oeil trouble:* Piquer de l'oeil.

*Désordres gastro-intestinaux:* La douleur abdominale, dérangements gastro-intestinaux.

*Infections:* Folliculitis gramma-négatif.

*La peau et la peau sous-cutanée troublent:* L'irritation de peau, la dermatite de contact, écorcher l'onctuosité, urticaria.

#### **Surdosage:**

Clindamycine d'actualité appliqué peut être absorbé dans suffisant revient aux produits effets du système.

#### **Conditions de conservation:**

Conservé entre 15 - 30°C. Garder le récipient bien fermé.

#### **Présentation:**

DANALLI® T la Solution D'actualité: Chaque ml contient de la Clindamycine Phosphate équivalente à Clindamycine 10 mg dans des bouteilles de 30 et 50 ml.

#### **Excipients:**

Alcool isopropylique, propylène glycol et eau purifiée.

#### **Ceci est un médicament**

- Le médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Suivre strictement la prescription de votre médecin, le mode d'emploi et les instructions du pharmacien qui vous a vendu le médicament.
- Le médecin et le pharmacien sont des experts en médicament, ses avantages et ses risques.
- Ne pas interrompre la période du traitement prescrite de votre initiative sans consulter votre médecin.
- Ne pas répéter la même prescription sans consulter votre médecin.
- Garder le médicament hors de la portée des enfants.

LE CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTÉ  
L'UNION DES PHARMACIENS ARABES

The United Pharmaceutical Manufacturing Co. Ltd.  
P.O. Box 69 Amman 11591, Jordanie