

داناللي® جل كليندامايسين

الوصف:

داناللي® جل يحتوي على كليندامايسين فوسفات، يتميز بتركيبته المائية المرطبة للجلد والخالية من الكحول إذ يلفف البشرة ولا يؤدي إلى جفاف الجلد.

يعمل داناللي® جل كمضاد للبكتيريا ومضاد للعد، ويتميز بقلّة امتصاصه من الجلد وقلّة تأثيره على الجسم.

الخواص:

كليندامايسين مضاد حيوي من زمرة اللينكوزامايد يوقف نمو وتكاثر البكتيريا الهوائية موجبة الغرام والبكتيريا اللاهوائية. يعتقد بأنّه يعمل على تخفيض تركيز الأحماض الدهنية الطليقة في الجلد ويوقف نمو البكتيريا الموجودة في الغدد الدهنية والحوصلات.

يصل كليندامايسين إلى تركيز منخفض جداً في الدم بعد الاستعمال المتكرر على الجلد نظراً لقلّة إمتصاصه ويبلغ توافره الحيوي حوالي ٢٪.

دواعي الإستعمال:

يستعمل داناللي® جل في علاج العُد الشائع (حب الشباب) وهو فعال ضد مظاهر الإلتهابات العدية كالحطاطات والبثور.

الجرعات وطريقة الإستعمال:

تغسل المناطق المصابة قبل الاستعمال بماء فاتر وصابون، ثم تشطف وتجفف.

تدهن طبقة رقيقة من داناللي® جل على المناطق المصابة مرتين يومياً.

مواعى الإستعمال:

لا يعطى كليندامايسين للمرضى الذين سبق وأن تحسسوا منه أو من اللينكومايسين او للمرضى الذين أصيبوا سابقاً بإلتهاب الغشاء

القولوني الكاذب المصاحب لاستعمال المضادات الحيوية أو الإلتهاب القولوني التقرحي أو التهاب الأمعاء.

محاذير الاستعمال:

• يجب التوقف عن استعمال الدواء عند الإصابة بالإسهال المتكرر.

• يجب مراجعة الطبيب عند حدوث إسهال أو التهاب الغشاء القولوني الكاذب أو الإلتهاب القولوني التقرحي بعد التوقف عن المعالجة.

• يجب أخذ الحيطة والحذر عند إعطائه للمرضى الذين سبق وأن أصيبوا بتفاعلات تحسسية.

• يفضل استخدام مواد التجميل مائيّة القاعدة على أن لا تستعمل بكثرة.

• لم تثبت سلامة كليندامايسين أو فعاليته لدى الأطفال دون سن الثانية عشرة.

• يجب تجنب ملامسته للعيون أو أغشية الأنف والغم المخاطية. عند حدوث التلامس بطريق الخطأ للعيون أو الأغشية المخاطية تغسل المنطقة المصابة بكميات وافرة من الماء البارد.

الاستعمال خلال فترتي الحمل والإرضاع:

• لا تتوفر دراسات وافية ومؤكدة عن تأثير الدواء على النساء الحوامل، كما لم تثبت الدراسات على الحيوانات أي آثار جانبية للدواء على الجنين عند استعماله في فترة الحمل.

• من غير المعروف ما إذا كان فوسفات الكليندامايسين يصل إلى حليب الأم. وحيث أن نسبة امتصاصه قليلة فمن المحتمل أن تكون الكمية التي تصل إلى حليب الأم ضئيلة.

التداخلات الدوائية:

غير معروفة.

الأعراض الجانبية:

يعتبر كليندامايسين بشكل عام جيد الاحتمال. قد يحدث التهاب الجلد التماسي، حساسية، اضطرابات هضمية مثل آلام البطن وإسهال

خفيف. وسجل أيضاً التهاب الجريبات سالب الغرام، وفي حالات نادرة قد يحدث التهاب الغشاء القولوني الكاذب، إسهال أو إسهال دموي.

فرط الجرعة:

لا يتوقع حدوث فرط الجرعة عند الاستعمال العادي.

ظروف الحفظ:

يحفظ بين ١٥ - ٣٠°م.

كيفية التزويد:

داناللي® جل: يحتوي كل ١ غرام على كليندامايسين فوسفات ما يعادل كليندامايسين ١٠ ملغم (١٪ وزن/وزن) في أنابيب سعة ٣٠ غرام.

السواغات:

كاربوبول، اللاننتوين، بروبيلين جليكول، بولي ايثيلين جليكول، ميتل باربين، هيدروكسيد الصوديوم و ماء نقي.

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يركز على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدلاني هما الغيران بالدواء وينفعه وضروه.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- إحتفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيدالنة العرب

الشركة المتحدة لصناعة الأدوية ذ.م.ج
ص ب ٦٩ عمان ١١٥٩١ الأردن