

نوفارتس

لومير إس آر أو

مضاد للكالسيوم

التركيب

لومير

يتولى المرض الحزق الواحد على المادة الفعالة. إيسرادييين ٢٠٠ مجم - السواغ كبريتات صوديوم لوبل، سواغ لعلل قرص.

لومير إس آر أو

تتولى الكبسولة الواحدة المتخلفة الجرعة على المادة الفعالة. إيسرادييين ٢٠٠ مجم - السواغ سواغ لعلل كبسولة - تتولى الكبسولة الواحدة على المادة الفعالة. إيسرادييين ٢٠٠ مجم - السواغ سواغ لعلل كبسولة

الخصائص/الأثار

إيسرادييين، المكون الفعال في لومير-٢، يتكون الكالسيوم له خصائص للكالسيوم له قابلية أعلى للذوبان الكالسيوم الموجودة في القلب الأيسر الشرياني من تلك الموجودة في عضلة القلب، ويعد ذلك فهو يوسع الشرايين الوعائية الشريانية، يصفى خصائص تلك الموجودة في القلب والوعاء العضلات الكيائية، بدون أن يحد من ضغط الدم، وكذلك لا يعوق الأيونات الطرفية. يخفض ضغط الدم الشرياني، ويوسع الشعيرات، ويمنع حدوث ارتفاع ضغط الدم الشرياني. لا تتسبب الآثار الجانبية على الحيوانات إلى أن إيسرادييين يزاو فعالية انتقائية منخفضة للقدرة الهيبيدية، ولكنه لا يعوق التوصيل الكهربائي الطبيعي أو الوظيفة الانقباضية للعضلة القلب. لذلك فإن تسرع القلب المتكسر يكون معتدلاً، ولا تحدث إبطاء للمضخة P٥، حتى بعد العلاج النسيق باحد حاصرات بيتا. يجرعات الفانطازين لخفض الدم، ثبت أيضاً إيسرادييين له فاعلية معزلة مصدر للفيديو، ولكنه مفعل بعتد.

يتمتع الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يستحق انخفاض مرتبط بالجرعة لخفض الدم أثناء، الرقاد والجنوس والقيام خلال ٢-٢ ساعات من تناول جرعة مفردة باليوم. لومير له مدة فاعل طويلة مما يضمن السيطرة على ضغط الدم لمدة ٢٤ ساعة عند تناول قرصين ٢٠٠ مجم مرة واحدة يومياً أو كبسولة واحدة إس آر أو ٢٠٠ مجم مرة واحدة يومياً، ويتخفف ضغط الدم بشكل بعتد بعد انسداد واحد من العلاج، ولكن يظل على الأقل ٢-٢ أسابيع للخصوس على

التأثير الأقصر. لم تُشاهد في المعاد تغيرات في سرعة القلب مع الكبسولات إس آر أو. كانت القدرة على تحمل إيسرادييين جيدة عند إعطائه للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو الذين الصدرية المتفرقة بجرعات تصل إلى ٩٠ و ٢٠٠ و ٢٢٠مجم/يوم. أدت الجرعات المفردة باليوم من لومير إلى إخماد الشرايين المتشنجة الشغوية في مرضى الربو الناتجة من التسريع لومير ليس له دلالة إكلينيكية على استقرار الجلوكوز وبالتالي يمكن إعطائه مرضى السكر. لم تره تأثيره في حالات ارتفاع الكوليسترول وخفض لخفض الدم. لم تُشاهد حدوث انخفاض لومير الفانطازين لخفض الدم في الدراسات التي استمرت مدة تصل إلى سنتين.

الحرائك الدوائية

بعد الامتصاص لبيسي ٩-٩/١٠٠ من الفعالة الهضمية، يتعرض إيسرادييين لنسبة المرور الأول بشكل موزع، مما يؤدي إلى توافر حيوي بنسبة ٢٠٪ تقريباً. بعد تناول جرعات مفردة باليوم ٢٠٠-٢٠٠ مجم، يظهر الدواء في البلازما خلال ٢٠ ساعة، ويتم بلوغ تركيزات الذروة في البلازما بعد ١-٢ ساعة. في حالة الإفراط، عند إعطاء المتطوعين الأصحاء، ٢٠٠مجم لومير إس آر أو في حالة الصيام مرة واحدة يومياً لمدة ٧ أيام، كانت تركيزات الدواء في البلازما (C_{max}) حوالي ٢.٢ نانوجرام/مليتلتر بعد ٧-٦ ساعات من تناول الدواء، (T_{max})

يؤدي تناول القرص مع الطعام إلى إبطاء زمن الوصول إلى مستوى الذروة في الدم بحوالي ساعة واحدة بدون التأثير على التوافر الحيوي. يؤدي تناول كبسولة إس آر أو الطعام إلى ارتفاع طفيف في تركيزات الذروة في البلازما وزيادة التوافر الحيوي بنسبة ٢٠٪ تقريباً. يؤدي مصير الصريب فوراً إلى زيادة التوافر الحيوي للكريات الداهييدروبايريدين من خلال تثبيط تأثير المرور الأول. يرتبط إيسرادييين ببروتينات البلازما بنسبة ٩٥٪ تقريباً. ويمنع حجم توزيعه الظاهري ١٢٨٢. توجد علاقة خطية بين كل من تركيز الذروة في البلازما والمساحة تحت المنحنى وبين الجرعة قلب إعطاء جرعات باليوم تصل إلى ٢٠٠مجم. تبلغ التصفية الإجمالية لإيسرادييين ٢٢٠ لتر/ساعة/٢ والإخراج ثنائي الأجزاء، ويكون العمر النصف التفاضلي ٢.٢ ساعة في المرضى الأصغر سناً و١.٤ ساعة في المرضى فوق ٦٠ سنة. يكون الأيض كاملاً، فلا يظهر في البول أي قدر من الدواء، غير المتغير يتم إخراج حوالي ٢٠-٢٥٪ من الجرعة في البول (٢٥-٢٠٪) في البراز.

في المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يستحق انخفاض مرتبط بالجرعة لخفض الدم أثناء، الرقاد والجنوس والقيام خلال ٢-٢ ساعات من تناول جرعة مفردة باليوم. لومير له مدة فاعل طويلة مما يضمن السيطرة على ضغط الدم لمدة ٢٤ ساعة عند تناول قرصين ٢٠٠ مجم مرة واحدة يومياً أو كبسولة واحدة إس آر أو ٢٠٠ مجم مرة واحدة يومياً، ويتخفف ضغط الدم بشكل بعتد بعد انسداد واحد من العلاج، ولكن يظل على الأقل ٢-٢ أسابيع للخصوس على

للتأثيرات الحرائك الدوائية انظر بند الناثرات.

دواعي الاستعمال/الاستخدامات الممكنة

ارتفاع ضغط الدم.

الجرعة وطريقة الاستعمال

الجرعة الموصى بها في المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم متوسط لخفض الدم هي قرص واحد ٢٠٠مجم مرتين يومياً أو كبسولة واحدة إس آر أو ٢٠٠مجم مرة واحدة يومياً.

تعليمات خاصة بالجرعة

الإفراط يصاحبه العلاج بالجرعة ٢٠٠مجم مرتين يومياً. ويمكن زيادة هذه الجرعة تدريجياً على فترات كل ٤ أسابيع إلى حد أقصى ٢٠٠مجم مرتين يومياً. إذا لم تتحسن المستويات الطبيعية لضغط الدم، يجب التفكير في إضافة دواء آخر. خفض ضغط الدم مع نظام لومير الكبسولات، إذا لم تكن كبسولة واحدة ٢٠٠مجم مرة واحدة يومياً فعالة بالقدر الكافي بعد مدة علاج ٤ أسابيع على الأقل، يوصى بإضافة دواء آخر لخفض ضغط الدم.

في المرضى المسنين وفي مرضى الفشل الكبدى أو الكلوى، يوصى باستخدام جرعة ابتدائية ١٠٠مجم (نصف قرص) مرتين يومياً أو كبسولة واحدة إس آر أو ٢٠٠مجم مرة واحدة يومياً. يمكن أيضاً إضافة لومير إلى العلاج الشافط لخفض الدم المنبع بالقلب. عند إعطاء لومير في نفس الوقت مع سيبيديين، تُخفض جرعة لومير بنسبة ٢٥٪ (انظر الناثرات). أقراص لومير وكبسولات لومير إس آر أو يجب أو تُبذل صحياً.

التحذير على الاستعمال

موانع الاستعمال

فرط الحساسية لمركبات الداهييدروبايريدين أو أي من السواغ. لومير أقراص فقط احتشاش، عضلة القلب قبل بدء العلاج بأقل من شهر واحد، الذئبة الصدرية غير المتفرقة.

الاحتياطات

يوصى بتسوية السائل الكهربائي عند إعطاء مسرعات الداهييدروبايريدين للمرضى الذين يعانون من ضعف أو اضطراب شديد. يوصى بتسوية جرعة لومير بشكل فردي في المرضى الذين يعانون من ضعف بالوظيفة الكبدية أو القصور الكلوي المزمن، وكذلك في المرضى المسنين. يوصى بتسوية السائل عند علاج المرضى الذين لديهم حالة

مؤكدة أو شُبهت فيها بشدة من متلازمة الأمثال الجيني الذين لم يتم تزويدهم بالمناعة للقلب، يوصى أيضاً بتسوية السائل الكهربائي للمرضى الذين لديهم انخفاض في ضغط الدم الانقباضى.

لا توجد في الوقت الحالي خبرة بشأن استعمال لومير أو لومير إس آر أو في المرضى تحت ١٦ سنة.

توجد أدلة قاطعة لا سيما في المرضى بمرض قلبي ناجي، قد تؤدي مضاعفات الكالسيوم المنخفضة المفحولة من نوع الهيدروكلوريد يوربيدين إلى زيادة معدل المرض والوفاة لأسباب قلبية وعائية. قد يحدث ارتفاع لنسبة الصوديوم وانخفاض حاد لخفض الدم وتسرع القلب والذي قد يستدعي مسارات غير مواتية، أثناء العلاج بهذا المتحضر.

الحمل والإرضاع

لا تقدم البيانات في البشر مع ديهوكسين، وأرفارين، بروبرينولول، أو هيدروكلوريد ثيازيد، لا يوش إيسرادييين على مرضى حركته ديهوكسين، وأرفارين، أو هيدروكلوريد ثيازيد، ولكنه يوصى إلى زيادة التركيز الأقصى (C_{max}) والتوافر الحيوي (AUC) لاستعماله أثناء الحمل إلا في حالات الرجوة لتفاد لخطر بشكل واضح أي مضاهرة ممكنة على الطفل. عند استعمال لومير من طريق الفم أثناء الشهور الثلاثة الأخير من الحمل لم يكن ذلك مصحوباً بأي تغيرات في سرعة قلب الجنين أو في سريان الدم في الرحم والحيوانات. توحى المشاهدات السلبية لولادة في الحيوانات بين الجرعات المرتفعة من إيسرادييين قد تؤدي إلى إبطاء زمن الولادة.

أظهرت إحدى الدراسات التي أجراها على الجرذان أن كيرات صغيرة من إيسرادييين سُفد إلى الجنين، ولم يتم إجراء دراسات في الإنسان، ولم يتم على الدراسات في الحيوانات أن تكشف عن أي آثار سامة كتجنيد لإعطاء إيسرادييين أثناء الإرضاع، إلا أنه لم يتم إثبات آثار استعمال الدواء في الأطفال الرضّع غير مرضون من الثدي لذلك يجب على الأمهات اللاتي يستعملن لومير ألا يرضعن أطفالهن من الثدي.

الأثار الجانبية

الأثار الجانبية الأكثر تكراراً في التقارير هي الصداع، الإمساك بالنسبة، تسبب الوجه، ودمة طرفية موضعية ذات منشأ غير قلبي، دوار، فقدان، وتسرع القلب. هذه الأثار مرتبطة بخصائص إيسرادييين المنخفضة للأوعية وتشمل:

للاختلال، أو انخفاض من استمرار العلاج. انخفاض ضغط الدم في أحوال نادرة. الأثار الجانبية غير النوعية، وهي نادرة، تشمل الشعب، والطفح، والاضطرابات الهضمية (عثاش، قن، إسهال). شوهه ارتفاع وتذبذب الشرايين المتصل في حالات متعزلة قليلة ونسبة كانت قابلة للتوقف إما أثناء العلاج أو عقب وقف الدواء.

كما هو الحال مع الأدوية الأخرى المنخفضة للأوعية، قد تحدث

ذبحة صدرية في حالات نادرة، ولا سيما في المرضى الذين يعانون من قبل من مرض قلبي ناجي في المرضى الذين يعانون من قبل من ذبحة صدرية، قد يزداد تكرار ودمد وشدة النوبات عند بدء العلاج أو كتجنيد زيادة الجرعة بسرعة مفردة.

التأثيرات

لا يؤثر تناول الأقراص مع الطعام على التوافر الحيوي للفيديو، ولكنه قد يبطئ كل من بدء الامتصاص وزمن الوصول إلى تركيز الذروة في البلازما. إضافة يؤدي تناول كبسولات لومير إس آر أو مع الطعام إلى زيادة طفيفة في تركيزات الذروة في البلازما وزيادة التوافر الحيوي بنسبة ٢٠٪ تقريباً.

لا تغير خواص الحرائك الدوائية لإيسرادييين بإعطائه في نفس الوقت مع ديهوكسين، وأرفارين، بروبرينولول، أو هيدروكلوريد ثيازيد، لا يوش إيسرادييين على مرضى حركته ديهوكسين، وأرفارين، أو هيدروكلوريد ثيازيد، ولكنه يوصى إلى زيادة التركيز الأقصى (C_{max}) والتوافر الحيوي (AUC) لبروبرينولول بنسبة ٢٨ و ٢٦٪، على الترتيب. لا يرتبط إيسرادييين بشكل نوعي بالبروتينات، ومع ذلك فإنه يوصى بتسوية العذر في الحالات التي يستعمل فيها في نفس الوقت أدوية مضادة للتشنج.

يؤدي الاستعمال المتزامن لنسيبيديين، وهو أحد مثبطات جهاز إنزيم سينوكروم P450، إلى زيادة التوافر الحيوي لإيسرادييين بنسبة ٢٠٪ تقريباً (نصف الجرعة ووظيفة الاستعمال)، في حين أن الاستعمال المتزامن لريغابيسين، والذي يعرف بأنه حصف قوى لجهاز إنزيم سينوكروم P450، يخفض بشدة تركيزات إيسرادييين في البلازما بحيث تصبح غير كافية للاستعمال إيسرادييين في نفس الوقت مع ريغابيسين أو غيره من الأدوية المفردة لثانوي (مثل فينوباريتال).

قد يؤدي إيسرادييين إلى انخفاض طفيف في زمن البروترومين، غير أن هذا ليس له دلالة إكلينيكية. يشهد مصير الجريب فوراً التسلط التاكسدي لمركبات الداهييدروبايريدين، وبالتالي فإن تناوله في نفس الوقت مع إيسرادييين قد يؤدي إلى زيادة التوافر في البلازما وانخفاض القرط لخفض الدم.

تجاوز الجرعة

الخطر مصدرة بشأن التسمم بإيسرادييين توحى البيانات المتاحة بأنه قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ ومعتد لضغط الدم مما يتطلب تقديم الدعم الحيوي المتواصل (مثلاً بإعطاء، سوائل في الوريد أو سويعات حجم البلازما)، مع مراقبة الوظيفة الكبدية والتنفسية وحجم الدم الساري في الدورة الدموية. قد يكون من المفيد استعمال مضيققات الأوعية، بشرط ألا يكون استعمالها محظوراً، يمكن أيضاً محاولة إعطاء الكالسيوم في الوريد.

معلومات أخرى

ملحوظة

يُستحق لومير بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

العمر الرقبي

لا ينبغي استعمال الدواء، بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) المطبوع على العبوة.

الصانع

انظر العبوة

أخر معلومات لهذه المعلومات

١٩٩٨

تاريخ الموافقة (النص)

٢١ يناير ٢٠٠٠

(م) = علامة تجارية مسجلة

نوفارتس فارما شركة مساهمة، بازل، سويسرا

(إن هذا دواء)

- الدواء، مستحضر يوش على صنائه واستهلاكه خلافاً للتعليمات بعبوة الحفظ.

- إن سبقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- قاتطبيب و الصيدلاني هما المتبهران بالدواء، ويتفهم وحظر.

- لا تلتقط مدة العلاج المدة لك من تلقا، نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

حفظ الأدوية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيادلة العرب