

نشرة العبوة: معلومات للمستخدم

زيرتك ١٠ ملجم أقراص مغلفة بالفلم

محلول زيرتك ١ ملجم/مل عن طريق الفم

قطرات زيرتك ١٠ ملجم/مل عن طريق الفم

ثاني هيدروكلوريد السيتريزين

يُرجى قراءة هذه النشرة بأكملها بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة، اسأل طبيبك أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء لك شخصيًا.
- لا تعطي هذا الدواء للأشخاص آخرين، فقد يسبب ضررًا لهم حتى لو بدت أعراضهم نفس الأعراض التي تعاني منها.
- في حالة اشتداد أي من الأعراض الجانبية، أو إذا لاحظت أي أعراض جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، يُرجى إخبار طبيبك أو الصيدلي.

محتويات هذه النشرة

- ١- ما هو زيرتك وما هي دواعي استعماله
- ٢- قبل تناول زيرتك
- ٣- كيفية تناول زيرتك
- ٤- الآثار الجانبية المحتملة
- ٥- كيفية تخزين زيرتك
- ٦- معلومات إضافية

١- ما هو زيرتك وما هي دواعي استعماله

يحتوي زيرتك على المادة النشطة: السيتريزين. تنتمي مادة السيتريزين إلى مجموعة من الأدوية المضادة للحساسية تُسمى مضادات الهيستامين.

يُستخدم زيرتك لعلاج الأعراض المرتبطة بأمراض الحساسية، مثل:

- أعراض التهاب الأنف التحسسي الموسمي والحوالي التي تصيب الأنف و العين.
- طفح وحكة الشرى المزمن (الشرى).

٢- قبل تناول زيرتك

لا تتناول زيرتك

- إذا كنت تعاني من الحساسية (فرط الحساسية) من السيتريزين أو الهيدروكسيزين أو أي من مشتقات البيبرازين

(المكونات النشطة وثيقة الصلة من الأدوية الأخرى)، أو أي من مكونات زيرتك الأخرى (المُدرجة في القسم ٦).

- إذا كنت تعاني من مرض كلوي حاد (ضعف شديد في وظائف الكلى مع انخفاض معدل تصفية الكرياتينين عن ١٠ مل/دقيقة).

← إذا كنت تعتقد أن أي مما سبق ينطبق عليك، لا تتناول زيرتك حتى تستشير طبيبك.

يجب توخي الحذر الشديد مع زيرتك

قبل تناول زيرتك، يحتاج أن يعرف طبيبك ما يلي:

- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى (قد يقلل طبيبك جرعتك من زيرتك).
- إذا كنت تواجه صعوبة في التبول أو كنت تعاني من ظروف تجعلك أكثر عرضة لعدم القدرة على إفراغ المثانة، مثل إصابة النخاع الشوكي أو تضخم البروستاتا.
- إذا كنت تعاني من الصرع أو كنت عرضة لخطر التشنجات (نوبات).

← استشر طبيبك إذا كنت تعتقد أن أيًا مما سبق قد ينطبق عليك.

لا يُنصح بتناول زيرتك قطرات الفم/ زيرتك محلول فموي من قبل الرضع والأطفال تحت سن عامين.

لا يُنصح بتناول زيرتك أقراص مغلفة بالفلم من قبل الأطفال تحت سن ٦ أعوام، حيث إن هذه التركيبة لا تسمح بالتكبير مع الجرعة المناسبة.

أثناء تناولك زيرتك:

- تجنب تناول الكحوليات أثناء تناول زيرتك.
- قد يؤثر زيرتك على نتائج اختبار حساسية الجلد لديك. إذا كان من المقرر خضوعك لاختبار الحساسية، اسأل طبيبك إذا كان يتوجب عليك التوقف عن تناول زيرتك لعدة أيام قبل الاختبار.

حالات ينبغي الانتباه لها

يمكن أن يجعل زيرتك بعض الحالات الحالية أسوأ، أو يسبب تفاعلات الحساسية الشديدة أو احتباس البول. قد يعاني بعض الأشخاص من أفكار انتحارية عند تناول زيرتك.

يجب عليك الانتباه إلى أعراض معينة أثناء تناول زيرتك ، وذلك للحد من خطر حدوث أي مشاكل. راجع " حالات ينبغي الانتباه لها " في القسم ٤ .

الأدوية الأخرى وزيرتك

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى، أو إذا كنت قد تناولت أي أدوية مؤخرًا، أو إذا بدأت في تناول أدوية جديدة. يشمل هذا الأدوية التي تشتريها بدون وصفة طبية. قد تؤثر بعض الأدوية على كيفية عمل زيرتك ، أو تزيد من احتمال تعرضك لآثار جانبية. يمكن أن يؤثر زيرتك أيضًا على كيفية عمل بعض الأدوية الأخرى. تشمل هذه الأدوية ما يلي:

- الأدوية التي تعمل على الدماغ، على سبيل المثال مضادات الهيستامين الأخرى مثل الهيدروكسيزين، والكليماستين، والأدوية المستخدمة لعلاج القلق مثل الديازيبام أو الحبوب المنومة مثل الزولبيديم (قد يتسبب تناول زيرتك بالتزامن مع المواد الأخرى التي تعمل على الدماغ في حدوث انخفاض إضافي في مستوى اليقظة وضعف الأداء، انظر "تناول الطعام والشراب مع زيرتك" أدناه في القسم ٢).

← أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية.

تناول الطعام والشراب مع زيرتك

تجنب تناول الكحوليات عند تناول زيرتك. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الحساسية، قد يؤدي تناول زيرتك بالتزامن مع الكحوليات إلى حدوث انخفاض إضافي في مستوى اليقظة وضعف الأداء.

الحمل والرضاعة الطبيعية

لا يُنصح بتناول زيرتك أثناء الحمل.

- أخبر طبيبك إذا كنت حاملًا أو تخططين لتصبحي حاملًا.

- إذا أصبحت حاملًا أثناء تناول زيرتك ، أخبر طبيبك.

قد تنتقل مكونات زيرتك إلى حليب الثدي. إذا كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، يجب عليكِ استشارة طبيبك قبل تناول زيرتك.

القيادة واستخدام الآلات

من غير المحتمل أن يؤثر تناول زيرتك بالجرعة الموصى بها على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات. ومع ذلك، قد يشعر بعض المرضى الذين يتناولون زيرتك بالنعاس أو التعب أو الضعف (انظر "الآثار الجانبية المحتملة" في القسم ٤).

← لا تُقد السيارة أو تستخدم الآلات إلا إذا كنت متأكدًا من عدم تأثرك بتناول زيرتك.

يحتوي زيرتك ١٠ ملجم أقراص مغلفة بالفلم على أحادي هيدرات اللاكتوز

لذا ينبغي للمرضى الذين يعانون من مشكلات وراثية نادرة من عدم تحمل الجالاكتوز (نقص في إنزيم اللاب لاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز – الجالاكتوز)، عدم تناول هذا الدواء.

يحتوي محلول زيرتك ١ ملجم/مل عن طريق الفم على مادة الصوربيتول

يجب ألا يتناول هذا الدواء المرضى الذين يعانون من مشكلات وراثية نادرة من عدم تحمل الفركتوز.

يحتوي محلول زيرتك ١ ملجم/مل عن طريق الفم وقطرات زيرتك ١٠ ملجم/مل عن طريق الفم على البارابينات

يحتوي محلول زيرتك ١ ملجم/مل عن طريق الفم وقطرات زيرتك ١٠ ملجم/مل عن طريق الفم على ميثيل باراهيدروكسي بنزوات أو بروبيل باراهيدروكسي بنزوات، اللتان قد تتسببا في تفاعلات حساسية (قد تكون متأخرة).

٣- كيفية تناول زيرتك

ما هي الجرعة التي تحتاج إلى تناولها؟

تناول دوائنا زيرتك وفقًا للجرعة التي أخبرك طبيبك بها بالضبط. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

← اتصل بطبيبك إذا تفاقت الأعراض أو لم تتحسن حالتك.

الكبار والمراهقون فوق ١٢ عامًا

زيرتك ١٠ ملجم أقراص مغلفة بالفلم

الجرعة المعتادة من زيرتك هي قرص واحد ١٠ ملجم، مرة واحدة يوميًا.

محلول زيرتك ١ ملجم/مل عن طريق الفم

الجرعة المعتادة من محلول زيرتك عن طريق الفم هي ١٠ مل (١٠ ملجم)، مرة واحدة يوميًا.

قطرات زيرتك ١٠ ملجم/مل عن طريق الفم
الجرعة المعتادة من قطرات زيرتك عن طريق الفم هي ٢٠ قطرة (١٠ ملجم) من قطرات الفم، مرة واحدة يوميًا.

الأطفال من ٦ إلى ١٢ عامًا

زيرتك ١٠ ملجم أقراص مغلفة بالفلم
الجرعة المعتادة من زيرتك هي نصف قرص (٥ ملجم)، مرتين يوميًا.

محلول زيرتك ١ ملجم/مل عن طريق الفم
الجرعة المعتادة من محلول زيرتك عن طريق الفم هي ٥ مل (٥ ملجم)، مرتين يوميًا.

قطرات زيرتك ١٠ ملجم/مل عن طريق الفم
الجرعة المعتادة من قطرات زيرتك عن طريق الفم هي ١٠ قطرات (٥ ملجم)، مرتين يوميًا.

الأطفال من سن عامين إلى ٦ أعوام
زيرتك ١٠ ملجم أقراص مغلفة بالفلم
لا يُنصح بتناول الأقراص المغلفة بالفلم من زيرتك من قبل الأطفال تحت ٦ أعوام، حيث إن هذه التركيبة لا تسمح بالتكيف مع الجرعة المناسبة.

محلول زيرتك ١ ملجم/مل عن طريق الفم
الجرعة المعتادة من محلول زيرتك عن طريق الفم هي ٢,٥ مل (٢,٥ ملجم)، مرتين يوميًا.

قطرات زيرتك ١٠ ملجم/مل عن طريق الفم
الجرعة المعتادة من قطرات زيرتك عن طريق الفم هي ٥ قطرات (٥,٢ ملجم)، مرتين يوميًا.

المرضى الذين يعانون من امراض الكلى والكبد:
يقرر طبيبك الجرعة الصحيحة من زيرتك حسب المرض ونتائج اختبارات الدم التي أجريت قبل العلاج. يجب على المرضى الذين يعانون من المرحلة النهائية من ضعف وظائف الكلى عدم تناول زيرتك (انظر "لا تتناول زيرتك" بالقسم ٢).

إذا كان طفلك يعاني من مرض كلوي، يُرجى الاتصال بطبيبك أو الصيدلي من أجل تعديل الجرعة وفقًا لذلك.

لا تتناول جرعةً من زيرتك أكثر من تلك التي أوصى بها طبيبك. تتوقف مدة العلاج على نوع الشكوى المرضية ومدتها ومداها.

كيفية تناول زيرتك

زيرتك ١٠ ملجم أقراص مغلفة بالفلم
تناول القرص بأكمله مع كوب من الماء. يمكنك تقسيم القرص على جرعتين متساويتين.

محلول زيرتك ١ ملجم/مل عن طريق الفم
يمكن ابتلاع المحلول كما هو.

يتم توفير ملعقة مدرجة لقياس الجرعة بتدرج [٢,٥ مل و ٥ مل] مع العبوة حتى تتمكن من قياس الجرعة بدقة. في حالة عدم توفر ملعقة مدرجة، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.

قطرات زيرتك ١٠ ملجم/مل عن طريق الفم
خفف القطرات بالماء. يجب ابتلاع القطرات المخففة على الفور.

في حالة نسيان تناول زيرتك

لا تتناول جرعة إضافية لتعويض الجرعة الفائتة. فقط تناول جرعتك التالية في الوقت المعتاد. **← إذا لم تكن متأكد مما عليك فعله، اسأل طبيبك أو الصيدلي.**

في حالة تناول جرعة كبيرة من زيرتك

في حالة تناول جرعة كبيرة من زيرتك، اتصل بطبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة. أعرض عليهم عبوة زيرتك إذا كان ذلك ممكنًا.

في حالة تناول جرعة كبيرة من زيرتك، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بآثار جانبية مثل:

الارتباك، والإسهال، والدوخة، والتعب، والصداع، والتوعل، واتساع حدقة العين، والحكة، وعدم الراحة، والتهدئة، والنوم (الشعور بالنعاس)، والذهول، ومعدل ضربات قلب سريع وغير طبيعي، ورعشة، واحتباس البول.

إذا توقفت عن تناول زيرتك
قد تعاني في حالات نادرة من الحكة (الحكة الشديدة) و/أو الشرى إذا توقفت عن تناول زيرتك.

٤- الآثار الجانبية المحتملة
مثله مثل جميع الأدوية، يمكن أن يتسبب زيرتك في حدوث آثار جانبية، ولكن لا يصاب الجميع بهذه الأعراض.

حالات ينبغي الانتباه لها
تفاعلات الحساسية الشديدة. تشمل الأعراض ما يلي:

• الطفح الجلدي البارز مع الحكة (الشرى).

• التورم، في بعض الأحيان في الوجه أو الفم (وذمة وعائية)، ما يسبب صعوبة في البلع أو التنفس.

• الهبوط أو فقدان الوعي

احتباس البول. تشمل الأعراض ما يلي:

• الشعور بالألم عند التبول أو عدم القدرة على التبول.

• **الأفكار الانتحارية.** قد عانى بعض الأشخاص من أفكار انتحارية عند تناول زيرتك.

← اتصل بطبيبك على الفور إذا عانيت من هذه الأعراض. **توقف عن تناول زيرتك.**

الآثار الجانبية الشائعة
قد تؤثر هذه الآثار على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠ أشخاص:

• النوم (النعاس)

• الدوخة والصداع

• التهاب البلعوم (التهاب الحلق وعدم الراحة عند البلع) والتهاب الأنف (عند الأطفال).

• الإسهال (عند الأطفال) والغثيان وجفاف الفم.

• الإرهاق

الآثار الجانبية غير الشائعة
قد تؤثر هذه الآثار على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠٠ شخص:

• التهيج

• الوخز أو خدر في اليدين أو القدمين (التمميل)

• الإسهال

• ألم المعدة

• الحكة (الحك الجلدي) والطفح الجلدي

• الوهن (الضعف غير العادي) والتوعل (الشعور بالإعياء بشكل عام)

الآثار الجانبية النادرة
قد تؤثر هذه الآثار على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١,٠٠٠ شخص:

• تفاعلات الحساسية (فرط الحساسية).

• العدوانية والارتباك والاكتئاب والهلوسة (رؤية أو سماع أشياء غير موجودة في الواقع) والأرق (عدم القدرة على النوم).

• التشنجات

• زيادة معدل ضربات القلب (ضربات القلب سريعة)

• وظائف الكبد غير الطبيعية (زيادة كميات أنزيمات الكبد في الدم، والتي قد تظهر في اختبارات الدم).

• الشرى

• الوذمة (التورم)

• زيادة الوزن

الآثار الجانبية النادرة للغاية
قد تؤثر هذه الآثار على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل ١٠,٠٠٠ شخص:

• قلة الصفائح (انخفاض عدد الصفائح الدموية في الدم)

• الصدمة التأقية (انظر "تفاعلات الحساسية الشديدة" في القسم ٤ أعلاه)

• التشنجات اللاإرادية (حركات الجسم اللاإرادية)

• خلل في حاسة التذوق (اضطراب حاسة التذوق أو فقدان القدرة على التذوق)، وخلل الحركة (حركات لا يمكن السيطرة عليها)، وخلل التوتر العضلي (تشنج العضلات الإرادي)، والإغماء (فقدان الوعي)، والرعشة

• اضطراب تكيف العين (صعوبة في التركيز)، وعدم وضوح الرؤية، وحركة المقلة الالتفافية (حركات دائرية لاإرادية بالعين).

• الوذمة الوعائية (تفاعلات حساسية خطيرة تسبب تورمًا في الوجه أو الحلق)، ويقع صغيرة من التورم واحمرار الجلد، والتي قد تتحول إلى بثور (الطفح الدوائي الثابت).

• عسر التبول (الشعور بالألم عند التبول) (انظر "احتباس البول" في القسم ٤ أعلاه)، وسلس البول (التبول اللاإرادي)

آثار جانبية أخرى
لقد حدثت هذه الآثار، ولكن معدل تكررها بالضبط غير معروف:

• زيادة الشهية

• الأفكار الانتحارية (انظر "الأفكار الانتحارية" في القسم ٤ أعلاه) والكوابيس



- فقدان الذاكرة وضعف الذاكرة
- الدوار (الإحساس بالدوران)
- التهاب الكبد
- احتباس البول (صعوبة في التبول) (انظر "احتباس البول" في القسم ٤ أعلاه)
- ألم المفاصل
- طفح مع ظهور بثور تحتوي على صديد
- الحكة الشديدة (الحكة) عند التوقف.

← **أخبر طبيبك أو الصيدلي** إذا أصبحت أي من الآثار الجانبية المذكورة شديدة أو مزعجة، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا تعرضت لأي آثار جانبية. ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير واردة في هذه النشرة. فمن خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

من أجل تسجيل شكوي بخصوص الدواء أو أعراض جانبية مرتبطة باستخدام دواء شركة GSK برجاء التواصل عبر gulf.safety@gsk.com.

٥- كيفية تخزين زيرتك

زيرتك ١٠ ملجم أقراص مغلفة بالفلم

لا تُخزن الدواء في درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية.

محلول زيرتك ١ ملجم/مل عن طريق الفم

خزن الدواء في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية.

قطرات زيرتك ١٠ ملجم/مل عن طريق الفم

لا تُخزن الدواء في درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على الكرتون الخارجي بعد "EXP". الأقراص

لا تتخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد في حاجة إليها، فهذا سيساعد على حماية البيئة.

المحلول الفموي وقطرات الفم

تخلص من الزجاجة بعد مرور [٣] أشهر من تاريخ فتحها لأول مرة، ولكن لا تتخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد في حاجة إليها، فهذا سيساعد على حماية البيئة.

٦- معلومات إضافية

مكونات زيرتك

المادة الفعالة هي ثنائي هيدروكلوريد السيتريزين.

يحتوي كل قرص مغلف على ١٠ ملجم من ثنائي هيدروكلوريد السيتريزين.

مواد السواغ ذات التأثير المعروف:

- يحتوي كل قرص على ٦٦,٤٠ ملجم من أحادي هيدرات اللاكتوز.
- يحتوي كل مل من المحلول الفموي على ١ ملجم من ثنائي هيدروكلوريد السيتريزين.

مواد السواغ ذات التأثير المعروف:

- يحتوي كل مل من المحلول على ٤٥٠ ملجم من محلول الصوريبتول بنسبة ٧٠٪ (غير مبلورة)
- يحتوي كل مل من المحلول على ١,٣٥ ملجم من ميثيل باراهيدروكسي بنزوات
- يحتوي كل مل من المحلول على ٠,١٥ ملجم من بروبييل باراهيدروكسي بنزوات
- يحتوي كل ١ مل من محلول القطرات عن طريق الفم على ١٠ ملجم من ثنائي هيدروكلوريد السيتريزين. وتحتوي القطرة الواحدة من المحلول على ٠,٥ ملجم من ثنائي هيدروكلوريد السيتريزين

مواد السواغ ذات التأثير المعروف:

- يحتوي كل مل من المحلول على ١,٣٥ ملجم من ميثيل باراهيدروكسي بنزوات
- يحتوي كل مل من المحلول على ٠,١٥ ملجم من بروبييل باراهيدروكسي بنزوات

قائمة مواد السواغ

زيرتك ١٠ ملجم أقراص مغلفة بالفلم

ميكروكريستالين سيليلوز، أحادي هيدرات اللاكتوز، السيليكا اللامائية الغروانية، ستيرات المغنيسيوم، أوبادري Y-1-7000 الذي يتكون من (هيدروكسي بروبييل ميثيل سيليلوز (E464)، ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، ماكروجول (٤٠٠).

محلول زيرتك ١ ملجم/مل عن طريق الفم

محلول الصوريبتول بنسبة ٧٠٪ (غير مبلورة)، جليسيرول (٨٥٪)، بروبييل جلايكول، سكارين الصوديوم، ميثيل باراهيدروكسي بنزوات، بروبييل باراهيدروكسي بنزوات، نكهة الموز 54.330/A، أسيتات الصوديوم، حمض الأسيتيك الثلجي، ماء مطهر.

قطرات زيرتك ١٠ ملجم/مل عن طريق الفم

جليسيرول (٨٥٪)، بروبييل جلايكول، سكارين الصوديوم، ميثيل باراهيدروكسي بنزوات، بروبييل باراهيدروكسي بنزوات، حمض الأسيتيك الثلجي، ماء مطهر.

شكل عبوة زيرتك ومحتوياتها

زيرتك ١٠ ملجم أقراص مغلفة بالفلم

يتوفر زيرتك ١٠ ملجم قرص مغلف بالفلم للاستخدام عن طريق الفم على هيئة قرص أبيض مستطيل مغلف بالفلم مع خط فاصل في المنتصف و شعار Y-Y.

محلول زيرتك ١ ملجم/مل عن طريق الفم

محلول زيرتك عن طريق الفم هو سائل بنكهة الموز شفاف عديم اللون، ويحتوي على ١ ملجم من المادة الدوائية ثنائي هيدروكلوريد السيتريزين لكل ١ مل (٥ ملجم/مل) للاستخدام عن طريق الفم.

قطرات زيرتك ١٠ ملجم/مل عن طريق الفم

محلول قطرات زيرتك عن طريق الفم هو سائل شفاف عديم اللون، ويحتوي على ١٠ ملجم من ثنائي هيدروكلوريد السيتريزين لكل ١ مل للاستخدام عن طريق الفم.

الشركة المصنعة

زيرتك ١٠ ملجم أقراص مغلفة بالفلم

التصنيع و الإفراج عن التغليفات عن طريق:

UCB Farchim SA

Bulle

Switzerland

التعبئة الأولية و التعبئة الثانوية عن طريق:

Aesica Pharmaceuticals S.r.l.

Pianezza (TO)

Italy

محلول زيرتك ١ ملجم/مل عن طريق الفم و قطرات زيرتك ١٠ ملجم/مل عن طريق الفم

التصنيع عن طريق:

Aesica Pharmaceuticals S.r.l.

Pianezza (TO)

Italy

لصالح شركة GlaxoSmithKline Export Limited, UK

العلامات التجارية مملوكة لمجموعة شركات GSK أو مرخصة لها.

حقوق النشر © لعام ٢٠٢٠ محفوظة لمجموعة شركات GSK أو مانح التراخيص الخاص بها.

NCDS رقم الإصدار: ٠٠٦، تاريخ الإصدار: ٠٢ أبريل ٢٠١٩

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء و نفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصيدالة العرب