

## سيفيزوكس® (سيفيتزوكسيم صوديوم معقم)

### المفعول

طور مستحضر سيفيزوكس في مختبرات الأبحاث في شركة أستيلاس، وهو سفالوسبورين نصف مصنع ذو طيف واسع في مقاومة الببتالكتاميز للاستعمال الوريحي «وريدي، عضلي».

### دواعي الاستعمال

إن سيفيزوكس فعال ضد نطاق واسع من البكتيريا: بكتيريا موجبة الغرام وتشمل ستافيلوكوكس أوريوس (المنتجة وغير المنتجة للبنيسيلينيز)، سترپتوكوكس ابديرميديس (المنتجة وغير المنتجة للبنسلينيز)، سترپتوكوكس اجالكتيا، سترپتوكوكس نيومونيا، سترپتوكوكس بيوجينز. بكتيريا سالبة الغرام وتشمل اسينيتويكتر، انتيروباكتر، اشيريشيا كولاي، هيوموفيليس انفلونزا (وتشمل السلالات المقاومة للامبيسيلين)، كلبيسيلا نيومونيا، مورغانيللا مورغانسي، نيسيريا غونوريا، بروتيس ميرابيليس، بروتيس فلغاريس، بروفيشنشيا رتجيري، سراسيا مارسيشنز. البكتيريا اللاهوائية: باكتيرويديس، بينتوكوكس، بينتوسترپتوكوكس، ابويكتريريوم وسلالات كلوستريديوم.

يستعمل سيفيزوكس في معالجة:

- التهابات المجرى التنفسي السطحي
- التهابات الجلد والأنسجة الناعمة
- التهابات المجاري البولية
- التهابات العظم والمفاصل
- السيلان
- التهابات البطنية الداخلية بما فيها التهابات الصفراوية
- التهابات الأمراض النسائية
- تسهم الدم

### الجرعة وطريقة الاستعمال

الجرعة المعتادة للكبار: ١-٢غم سيفيزوكس كل ٨-١٢ ساعة عن طريق العضل أو الوريد.

في حالة داء السيلان (غير المعقد): ١غم عضليا جرعة واحدة.

في حالة التهابات المجاري البولية: ١-٢غم وريديا أو عضليا كل ١٢ ساعة.

في حالة تسهم الدم: يمكن اعطاء ٦-١٢غم يوميا مقسمة على ثلاث جرعات عن طريق الوريد.

يجب ان لا تتعدى الجرعة اليومية ١٢غم.

الجرعة للإطفال من ٦ اشهر فما فوق: ٥٠ ملغم/كغم من وزن الجسم كل ٦-٨ ساعات عن طريق العضل أو الوريد.

يجب ان لا تتعدى الجرعة اليومية ٢٠٠ ملغم/كغم من وزن الجسم (على ان لا تتعدى الجرعة القصوى المستخدمة للكبار في التهابات الشديدة).

إن تعديل الجرعة ضروري عند المرضى المصابين بقصور كلوي، للكبار، بعد اعطاء المريض ١٠٠-١غم كجرعة محملة ابتدائية سوا من طريق العضل أو الوريد وتكون الجرعة الاستمرارية.

كالجدول الآتي:

تصفية الكرياتينين ملليتر /دقيقة	الالتهابات المتوسطة	الالتهابات الشديدة والمهددة للحياة
٥٠-٧٩	٥٠٠ ملغم / ٨ ساعات	٧٥٠-١٠٠٠ ملغم / ٨ ساعات
٤٩-٥٠	٣٥٠-٥٠٠ ملغم / ١٢ ساعة	١٢٠٠-١٦٠٠ ملغم / ١٢ ساعة
صفر-٤	٣٥٠-٥٠٠ ملغم / ٢٤ ساعة	٥٠٠-٧٥٠ ملغم / ٢٤ ساعة

كيفية التحضير

الحقن الوريدي:

يذاب سيفيزوكس بواسطة الماء المعقم للحقن حسب الجدول المبين ادناه، يخض جيدا.

للاستعمال الوريدي المباشر، يحقن ببطء خلال ٣-٥ دقائق.

حجم الزجاجاة

٥٠٠ ملغم

١٠٠ ملليتر

١٠٠٠ ملليتر

للمحاليل الوريدية:

يخفف سيفيزوكس المذاب بالماء المعد للحقن الوريدي في ٥٠-١٠٠ ملليتر من أي من المحاليل الوريدية التالية:

• محلول كلوريد الصوديوم للحقن

• محلول لاكتات رينجرز للحقن

• محلول دكستروز ٥% أو ١٠% للحقن

• محلول دكستروز ٥% مع كلوريد الصوديوم ٠.٩%، ٤.٥%، أو ٠.٣%

• محلول بيكربونات الصوديوم ٤% في ماء معد للحقن

• محلول دكستروز ٥% في لاكتات رينجرز (فقط في حال تحضير المحلول المركز من سيفيزوكس بواسطة محلول بيكربونات الصوديوم ٤%).

الحقن العضلي:

• يذاب سيفيزوكس بواسطة حقن اليدوكين هيدروكلورايد المرفقة أو بواسطة الماء المعقم للحقن، يخض جيدا.

• لا يستعمل اليدوكين لمن لديهم حساسية ضده.

• لا يحقن وريديا عند الازابة باليدوكين هيدروكلورايد.

حجم الزجاجة	كمية الـيدوكسين ٥٠٠ر / المضافة	الكمية المضافة من الماء المعقم
٥٠٠ ملغم	٢ مليلتر	٢ مليلتر
١غم	٤ مليلتر	٣ مليلتر

• يجب أن يحقن في عضلة كبيرة.

ملاحظة: ثبات المحاليل المحضرة والمخففة:

ينصح باستخدام المحاليل المحضرة والمخففة مباشرة بعد التحضير، إذا استدعت الظروف تخزين هذه المحاليل، فإنه ينصح بحفظها كما هو موضح في الجدول أدناه:

بعد التحضير	الحفظ في درجة حرارة الغرفة	الحفظ في الثلاجة (٢-٨)°م
التحضير بواسطة الماء المعد للحقن	٨ ساعات	١٢ ساعة
التحضير بواسطة ليدوكابين ٠.٠٪	٤ ساعات	٤ ساعات
بعد الحل	٦ ساعات	٢٤ ساعة

• يتراوح لون المحلول من اصفر فاتح الى اصفر غامق، ولا يؤثر هذا على فعالية المستحضر.

• يجب فحص المستحضرات الزرقية بالبرص لاية مواد دقيقة قبل اعطاء الحقنة، اذا لوحظ وجود اية مواد دقيقة في المستحضر المذاب، لا يستعمل المحلول.

الحاذير

يجب الحذر عند اعطاء السيفتيزوكسيم للمرضى الذين يعانون من حساسية للبنسلين او الذين يعانون من قصر في وظائف الكلى.

مضادات الاستعمال

لا يعطى سيفتيزوكسيم للمرضى الذين يعانون من حساسية للسيفالوسبورينات.

الاحتياطات

ان الاستعمال الطويل للمضادات الحيوية واسعة الطيف قد يؤدي الى نمو بكتيريا مقاومة. لا يوجد دراسات كافية لا ستخدام الدواء لدى الحوامل، لذلك يستعمل هذا الدواء للحوامل فقط اذا كان هناك حاجة. عادة يتم طرح سيفتيزوكسيم في حليب الام بكميات قليلة. لم يتم تسجيل مشاكل لدى الانسان حتى اليوم.

التأثيرات الجانبية

بشكل عام سيفتيزوكسيم جيد التحمل، نادرا ما تحدث التأثيرات الجانبية التالية: حساسية مفرطة، ارتفاع عابر في SGPT، SGOT، وانزيم الفوسفاتيز، اسهال، غثيان، قي.

فرط الجرعة

تفاعلات الحساسية المفرطة الحادة قد تتطلب المعالجة بالادرينالين واجراءات طارئة اخرى.

التخزين

لا يحفظ فوق ٣٠ مئوية، يحفظ بعيداً عن الضوء.

الاشكال الصيدلانية

زجاجات

سيفيزوكس ٥٠٠ للحقن الوريدي:

٥٠٠ ملغم سيفتيزوكسيم على شكل

٥٢٨ر٦٦ ملغم سيفتيزوكسيم صوديوم

١٠٠٠ ملغم سيفتيزوكسيم على شكل

١٠٥٧ر٣٣ ملغم سيفتيزوكسيم صوديوم

٥٠٠ ملغم سيفتيزوكسيم على شكل

٥٢٨ر٦٦ ملغم سيفتيزوكسيم صوديوم + أمبولة ٠.٠٪ ليدوكائين

١٠٠٠ ملغم سيفتيزوكسيم على شكل

١٠٥٧ر٣٣ ملغم سيفتيزوكسيم صوديوم + أمبولة ٠.٠٪ ليدوكائين

سيفيزوكس ١٠٠٠ للحقن الوريدي:

سيفيزوكس ٥٠٠ للحقن العضلي:

سيفيزوكس ١٠٠٠ للحقن العضلي:

### إن هذا دواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- ان الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.



بترخيص من:

شركة أستلس أوساكا - اليابان

انتاج: شركة أدوية الحكمة، البرتغال

لشركة أدوية الحكمة، عمان - الأردن



لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

Rev-12/2015