

Produit polyvitaminique avec minéraux et oligo-éléments pour les femmes avant, pendant et après la grossesse

Composition

1 comprimé contient:

12 vitamines

Vitamine A (rétinol) (3600 UI)	1080 µg
Vitamine B1 (thiamine)	1,6 mg
Vitamine B2 (riboflavine)	1,8 mg
Vitamine B6 (pyridoxine)	2,6 mg
Vitamine B12 (cyanocobalamine)	4 µg
Vitamine C (acide ascorbique)	100 mg
Vitamine D3 (cholécalférol) (500 UI)	12,5 µg
Vitamine E (acétate de dl- α -tocophérol)	15 mg
Biotine (vitamine H)	0,2 mg
Pantothénate de calcium	10 mg
Acide folique	0,8 mg
Nicotinamide	19 mg

3 minéraux

Calcium	125 mg
Magnésium	100 mg
Phosphore	125 mg

4 oligo-éléments

Fer	60 mg
Cuivre	1 mg
Manganèse	1 mg
Zinc	7,5 mg

Propriétés/Effets

L'Elévit Pronatal assure un apport complémentaire approprié en vitamines, minéraux et oligo-éléments, tel qu'il est requis chez la femme avant, pendant et après la grossesse. Le fer contenu dans l'Elévit Pronatal prévient en particulier l'anémie ferriprive, fréquemment observée chez la femme enceinte; ainsi, une thérapeutique martiale devient superflue dans la plupart des cas.

L'Elévit Pronatal couvre les besoins de l'organisme en substances vitales, besoins qui - comme l'ont montré de récentes données issues de la recherche - sont accrus pendant la grossesse et la période d'allaitement. En outre, le nombre d'anomalies du tube neural (spina bifida, myélo-méningocèle, encéphalocèle, anencéphalie) peut être réduit grâce à la prise périconceptionnelle d'Elévit Pronatal.

L'utilisation du produit pendant deux ou trois mois après la naissance répond également aux besoins en substances vitales des mères qui n'allaitent pas.

Indications/Possibilités d'emploi

Besoins accrus en vitamines, minéraux et oligo-éléments avant, pendant et après la grossesse.

Prévention des anomalies du tube neural chez l'embryon et prophylaxie de l'anémie ferriprive ainsi que de l'anémie par carence en acide folique au cours de la grossesse.

Posologie/Mode d'emploi

1 comprimé par jour à prendre avec le petit déjeuner ou selon les prescriptions du médecin.

Lors de nausées matinales de la grossesse, il est recommandé de prendre provisoirement le comprimé à midi ou éventuellement le soir.

Prévention des anomalies du tube neural: commencer à prendre le produit 1 mois au moins avant la grossesse prévue. Si aucune grossesse n'intervient après 2 à 3 mois, la posologie peut être réduite de moitié (1/2 comprimé par jour ou 1 comprimé tous les deux jours).

Limitations d'emploi

L'Elévit Pronatal ne doit pas être utilisé lors de la prise simultanée d'autres produits contenant de la vitamine A et/ou de la vitamine D, en cas d'antécédents d'hypervitaminose A et/ou D ni en cas d'insuffisance rénale, d'accumulation de fer dans l'organisme et de troubles de l'utilisation du fer, d'hypercalcémie, d'hypercalciurie et d'hypersensibilité à l'un ou plusieurs des composants du produit.

Effets indésirables

L'Elévit Pronatal est bien toléré. Dans de rares cas, il peut se produire des troubles gastro-intestinaux (constipation, par exemple) qui, en général, ne rendent cependant pas nécessaire l'arrêt du traitement.

Une hyperstimulation peut survenir sous Elévit Pronatal chez les femmes qui y sont prédisposées. Dans de tels cas, il est conseillé de ne pas prendre le comprimé le soir.

Interactions

Les produits contenant du fer ne doivent pas être pris pendant un traitement par des tétracyclines, étant donné la possibilité d'une altération réciproque de leur absorption. Si un traitement concomitant par des tétracyclines s'avère indispensable, il convient de respecter un intervalle d'environ deux heures entre la prise des produits.

Des doses élevées d'acide folique, en particulier, peuvent atténuer l'effet d'antiépileptiques et d'anticonvulsivants tels que la carbamazépine, la phénytoïne, la primidone et les barbituriques.

Conservation

Conserver à moins de 25°C et à l'abri de l'humidité.

Le médicament ne peut être utilisé que jusqu'à la date indiquée sur le récipient par EXP.

Ceci est un médicament.

- Un médicament est un produit qui influe sur votre santé; utilisez-le conformément aux instructions du médecin, faute de quoi il pourrait être dangereux pour vous.
- Suivez scrupuleusement les prescriptions de votre médecin, le mode d'emploi ainsi que les instructions du pharmacien qui vous a vendu le médicament.
- Le médecin et le pharmacien sont des experts en médicaments; ils en connaissent les avantages et les risques.
- N'interrompez pas de vous-même la durée de traitement qui vous a été prescrite.
- Ne renouvelez pas le traitement sans avoir consulté préalablement votre médecin.

Médicament : tenir hors de portée des enfants



Conseil des Ministres Arabes de la Santé
Union des Pharmaciens Arabes

Fabriqué sous licence Bayer Consumer Care Ltd, Bâle, Suisse, par Rottendorf Pharma GmbH, Ennigerloh, Germany