

مرهم ديرموفيت

بروبيونات كلوبيتاسول

يرجى قراءة كامل محتويات هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى إعادة قراءتها لاحقًا.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء لك فقط. لا توصي الآخرين باستخدامه ولا تمنحه للغير، فقد يسبب لهم الضرر، حتى لو كانت أعراض المرض لديهم هي نفسها التي تظهر لديك.
- إذا عانيت من أي آثار جانبية، استشر طبيبك أو الصيدلي. يتضمن هذا أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم ٤.

محتويات هذه النشرة:

- ما هو ديرموفيت وما هي دواعي الاستخدام
- ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام ديرموفيت
- كيفية استخدام ديرموفيت
- الآثار الجانبية المحتملة
- كيفية تخزين ديرموفيت
- محتويات العبوة ومعلومات أخرى

١- ما هو ديرموفيت وما دواعي استخدامه

- يحتوي ديرموفيت على مادة تسمى بروبيونات كلوبيتاسول. تنتمي هذه المادة إلى مجموعة من الأدوية تسمى السموم المنشطة (ستيرويد). هذه المادة تساعد في تقليل التورم والتهيج. يستخدم ديرموفيت للمساعدة في تقليل الاحمرار والحكة الناتجة عن بعض مشاكل الجلد. تشمل مشاكل الجلد هذه على:
- الأكزيما المتكررة
 - الصدفية (بمعن سميكة مع احمرار في التهاب في الجلد، وغالبًا ما تغطيها قشور فضية)، باستثناء الصدفية اللويحية الواسعة الانتشار.
 - الحرزاز المسطح (مرض جلدي يسبب نوات مسطحة أرجوانية حمراء مسببة للحكة على الرغين أو الساعدين أو أسفل الساقين).
 - الذئبة الحمامية القرصية (مرض جلدي يصيب أغلب الأحيان الوجه والأندين وفروة الرأس مما يسبب تندب وزيادة حساسية الجلد المصاب لأشعة الشمس).
 - التهاب الجلد وأمراض الجلد الأخرى التي لم تستجب إلى مرهمات أو مراهم الستيرويد المعتدلة.

٢- ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام ديرموفيت

موانع استخدام ديرموفيت:

- لا يستخدم لمن لديهم حساسية (تحسس شديد) من مادة بروبيونات كلوبيتاسول أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المذكورة في القسم ٦)
- لا يستخدم للأطفال ممن هم دون السنة.
- لا يستخدم لعلاج أي من مشاكل الجلد التالية، فقد يزيد الأمر سوءًا:
 - حب الشباب
 - احمرار شديد في الجلد داخل الأنف وحوله (الوردية)
 - طفح جلدي أحمر حول فمك (التهاب الجلد حول الفم)
 - يمنع استخدام المرهم للأشخاص الذين يعانون من حكة حول الشرج أو بمناطق الاعضاء التناسلية (العضو الذكري أو المهبل).
 - العدوى الجلدية (ما لم يتم علاج العدوى عن طريق الأدوية المضادة للعدوى في نفس الوقت)
 - حكة في الجلد غير ناتجة عن التهابات
 - الصدفية اللويحية الواسعة الانتشار، باستثناء الجروح الواحدة.
- لا تستخدم ديرموفيت إذا كان أي مما سبق ينطبق عليك. إذا لم تكن متأكدًا، استشر طبيبك أو الصيدلي قبل الاستخدام.

التحذيرات والاحتياطات

استشر طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام ديرموفيت في الحالات التالية:

- قد تعاني من الام حديثة في العظام أو قد تتفاقم أي من أعراض الام العظام التي كنت تعاني منها مسبقًا خلال العلاج باستخدام ديرموفيت، لاسيما إذا كنت تستخدم ديرموفيت لفترة طويلة من الوقت أو بشكل متكرر.

عمر الطفل	الوجه والرقبة	الذراع واليد	الرجل والقدم	الصدر	الظهر بما في ذلك الأرداف
٢-١ سنة	١,٥	١,٥	٢	٢	٣
٣-٥ سنوات	١,٥	٢	٣	٣	٣,٥
٦-١٠ سنوات	٢	٢,٥	٤,٥	٣,٥	٥

استخدام ديرموفيت للأطفال

- لا تستخدمه للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة.
- من المهم بشكل خاص في حال استخدامه للأطفال ألا يتجاوز الكمية المحددة.
- يجب ألا تستمر مدة العلاج الأطفال ممن هم فوق العام عادة أكثر من ٥ أيام ما لم يطلب منك طبيبك استخدامه لفترة أطول. يفضل مراجعة طبيب الطفل كل أسبوع، أثناء استخدام المرهم.
- يجب عدم استخدام الضمادات أو العصابات عند الاستخدام للأطفال في أماكن وضع المرهم.
- إذا كان لديك الصدفية**

إذا كانت لديك بقع سمكية من الصدفية في المرفقين أو الركبتين، فقد يشير إليك الطبيب بوضع المرهم تحت ضمادة محكمة الغلق. توضع الضمادة فقط في الليل لمساعدة المرهم في بدء العمل. بعد فترة قصيرة من الوقت سوف تقوم بوضع المرهم بشكل طبيعي.

عند استخدام ديرموفيت على وجهك

يجب عليك وضع المرهم على وجهك فقط بناءً على تعليمات طبيبك. يجب أن لا يزيد استخدامه عن ٥ أيام فقط لأنه يؤدي إلى ترقيق جلد وجهك بدون شك. لا ينبغي استخدام الضمادات أو العصابات على الوجه في مكان وضع المرهم. **لا تدع المرهم يدخل في عينيك.** إذا حدث ذلك، فقم بغسله بكمية كبيرة من الماء.

في حال استخدمت جرعة زائدة من ديرموفيت

إذا وضعت كمية كبيرة أو إذا تم ابتلاع المرهم عن غير قصد، فقد يسبب لك ذلك الإصابة بالمرض. استشر طبيبك أو أذهب إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن.

إذا نسيت استخدام جرعة ديرموفيت

إذا نسيت وضع المرهم، فقم بوضعه بمجرد أن تتذكره. إذا كان الوقت الذي تنكرت فيه قريبًا من وقت الجرعة التالية، فانظر حتى هذا الوقت. لا تستخدم جرعة إضافية من ديرموفيت لتعويض جرعة فاتتة.

إذا توقفت عن استخدام ديرموفيت

إذا كنت تستخدم ديرموفيت بانتظام فلابد من استشارة طبيبك قبل التوقف عن استخدامه لأن التوقف المفاجئ ربما يؤدي إلى تفاقم حالتك.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى بخصوص استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

٤- الآثار الجانبية المحتملة

- مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية، على الرغم من أنها لا تحدث للجميع. **توقف عن استخدام ديرموفيت وأخبر طبيبك في الحال في الحالات التالية:**
- عندما تجد أن مشكلة جلدك تزداد سوءًا أو تتطور إلى طفح جلدي معمم أو أن جلدك يتورم أثناء العلاج. قد تكون لديك حساسية من المرهم، أو لديك عدوى أو تحتاج إلى علاج آخر.
 - إذا كنت تعاني من مرض الصدفية فقد تصاب ببثور و صديد تحت الجلد. يمكن أن يحدث هذا أثناء أو بعد العلاج ويعرف باسم الصدفية البثرية.

الآثار الجانبية الأخرى التي قد تلاحظها عند استخدام ديرموفيت تشمل:

- أثار شائعة (قد تظهر على شخص واحد من كل ١٠ أشخاص)**
- الشعور بالحرقة أو الألم أو التهيج أو الحكة في مكان وضع المرهم.
- أثار غير شائعة (قد تظهر على شخص واحد من كل ١٠٠ شخص)**
- ترقق الجلد، وهذا قد يسبب ظهور علامات تمدد

- قد تصبح الأوعية الدموية تحت سطح جلدك أكثر وضوحًا.
- نادرة جدًا (قد تظهر على شخص واحد من كل ١٠٠٠٠ شخص)**
- استخدام ديرموفيت لفترة زمنية طويلة، أو استخدامه تحت ضمادة محكمة الغلق، قد يسبب الأعراض التالية:
- زيادة الوزن
- استدارة الوجه (وجه القمر)
- بدانة



- ترقق الجلد
- تجاعيد الجلد
- جفاف الجلد
- تغير لون بشرتك
- زيادة شعر الجسم
- تساقط الشعر / نقص نمو الشعر / الشعر التالف المظهر
- التفاعلات الجلدية النادرة الأخرى التي قد تحدث هي:
- حساسية في منطقة وضعة المرهم
- تفاقم الحالة
- تهيج في مكان وضع المرهم/ الألم
- احمرار
- الطفح الجلدي أو خلايا النحل
- إذا كنت تعاني من مرض الصدفية فقد تصاب ببثور و صديد تحت الجلد. يمكن أن يحدث هذا أثناء أو بعد العلاج ويعرف باسم الصدفية البثرية.
- عدوى الجلد
- حب الشباب

عند الأطفال، ابحث أيضًا عن الآثار التالية:

- تأخر زيادة الوزن
- تباطؤ النمو

أثار جانبية نادرة جدًا قد تظهر في اختبارات الدم أو عند الفحص الطبي من قبل طبيبك:

- انخفاض مستوى هرمون الكورتيزول في الدم
- زيادة مستويات السكر في الدم أو في البول
- ارتفاع ضغط الدم
- عدسة غائمة في العين (إعتام عدسة العين)
- زيادة الضغط في العين (الجلوكوما)
- مشاكل في الرؤية ناجمة عن انفصال شبكية العين (اعتلال الشبكية والشبكية المصلي المركزي)
- ضعف العظام من خلال فقدان التنريجي للعظام (هشاشة العظام)؛ قد تكون هناك حاجة إلى اختبارات إضافية بعد الفحص الطبي الخاص بك لتأكيد ما إذا كان لديك هذه الحالة.

آثار غير معروفة (لا يمكن تقدير التكرار من البيانات المتاحة)

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية، فيادر باستشارة طبيبك أو الصيدلي. يتضمن هذا أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. للإبلاغ عن الشكاوى أو الأحداث السلبية المرتبطة باستخدام منتج/منتجات جلاكوسميثكلاين، يرجى الاتصال بنا عبر: gulf.safety@gsk.com عندما تُبلغ عن الآثار الجانبية، فانت تساهم في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

٥- كيفية حفظ ديرموفيت

- يحفظ هذا الدواء بعيدا عن أنظار ومتناول الأطفال.
- لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور في الأنبوية أو العبوة الكرتون بعد كلمة (*EXP*). يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية.
- لا تخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. من شأن هذه التدابير أن تساهم في حماية البيئة.

٦- محتويات العبوة ومعلومات أخرى

محتويات ديرموفيت

- المادة الفعالة هي بروبيونات كلوبيتاسول. كل ١ جرام يحتوي على ٠,٥ ملجم من بروبيونات كلوبيتاسول (٠,٠٥ ٪ وزن / وزن).
- المكونات الأخرى هي:
 - البروبيلين جليكول (انظر القسم ٢)
 - سوربيتان سيسيكوليت
 - البارافين الأبيض الطرى
- كيف يبدو ديرموفيت ومحتويات العبوة**
- يوجد داخل كل عبوة كرتون أنبوب ذو غطاء بلاستيكي يحتوي إما على ٣٠ جم من المرهم.
- الشركة المصنعة**
- Glaxo Operations UK Limited* Barnard Castle United Kingdom**
- Member of the GSK group of companies**
- روجعت هذه النشرة في ٢٢ مارس ٢٠٢١**

© ٢٠٢١ مجموعة شركات جلاكوسميث كلاين (GSK) أو مرخصها.

هذا منتج دوائي

المنتج الدوائي هو منتج يؤثر على صحتهك ويعد استهلاكه بخلاف التعليمات أمر خطير بالنسبة لك.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي باع لك الدواء.

- يُعد الطبيب والصيدلي خبراء في الأدوية وفوائدها ومخاطر استخدامها.

- لا تقاطع فترة العلاج الموصوفة من تلقاء نفسك.

- لا تكرر نفس الوصفة الطبية دون استشارة الطبيب.


- احفظ جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب، اتحاد الصيدالة العرب.



٢- ما لم يُقصد من وضع المرهم على يدك استخدامه في علاج اليد، اغسل يدك مرة أخرى بعد استخدام المرهم.

للبالغين



لا تعلق إذا وجدت أنك تحتاج إلى أكثر أو أقل قليلاً من هذه الجرعة. هذا دليل تقريبي فقط.