

، أو الفكين وربما يصاحبها حركة دودية بطيئة للسان والضم مع انخفاض القدرة على فتح الفم بصورة كاملة وكثافتها اعراض قد لا تختفي حتى مع وقف العلاج .

- تشوهات اضافية في النطق الحركي أو في الحركة الالارادية في العضلات مثل حركة تشنجية في مقلات العيون في وضع ثابت عادة ما يكون لاعلى ، بطيء في الحركات ، وحركات ترجيجية أو ايجابية . تصلب في العضلات ، تقلصات عضلية تسبب التواءات وحركات متكررة أو اوضاع غير طبيعية ، وجوهاً مختلفة للتعبير: مشية غير طبيعية، وعدم القدرة على اليقأة ثابتة .

- التناس .

- نوم مفرط .

- رؤية بشكل غير متعدد .

- مصووبة في انتاج الحركات الامعائية، غشيان ، قيء ، زيادة في انتاج اللعاب ، أو جفاف الفم .

- انخفاض ضغط الدم بصورة غير طبيعية (يسمى هيبوتونيا ضعف الدم) ، انخفاض ملحوظ في ضغط الدم أثناء الوقوف أو تغير الوضع .

- شدود في اختبارات الدم الكبدية .

- ملطف جلدي .

- عدم القدرة على اليقأة ثابتة .

- الجزع الجنسي أو عدم القدرة على الانتصاب .

- زيادة الوزن بشكل غير مقصود أو انتصان في الوزن .

أعراض غير شائعة (سجلت على الأقل واحد في كل ١٠٠٠ مريض ولكن أقل من ١ في كل ١٠٠٠٠ مريض) :

- حساسية وتشمل بثور، تورم فيوجه .

- الارق، الإرثات، فقدان الدافع الجنسي أو الرغبة الجنسية .

- تقلصات عضلية لا ارادية مثل مرض باركنسون .

- تحدير .

- تشنجات وصدمات أصلًا تخلصات عصبية .

- تقصص غير مماثل في حركة الجسم .

- تصلب متدرج في الأطراف .

- عدم وصول في الرؤية .

- تسارع غير عادي في ضربات القلب .

- شعور بعدم راحة مع التنفس (ضيق نفس) .

- التهاب البكير، ازدياد الصفراء في الدم بسبب اصغرار الجلد واللثة والعنين ويسمي البراقون) .

- حكة الجلد، التعرق، الإفراط في درجة حرارة الجسم عند التعرض للضوء .

- اضطرابات جينية مثل حدوث اتم في المخط أو انقطاع في نترات المحيض .

- افراز سوائل من حملات الثدي وعدم راحة والم في الثدي .

- مشية غير طبيعية .

- تورم في الاطراف بسبب الاحتباس الشديد للسوائل .

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم بشكل غير متعدد .

تأثيرات نادرة (سجلت على الأقل واحد في كل ١٠٠٠٠٠ مريض ولكن أقل من ١ في كل ١٠٠٠٠٠) :

- زيادة في كمية كيماويات الجسم والتي ينتج عنها تكوين الحليب في الثدي حتى في الرجال .

- متلازمة صرعية عصبية خبيثة (حالة مطية ملترة تشمل تصلب الجسم مع ارتفاع درجة الحرارة) .

- حركة العين من جانب الآخر وهي حركة مرتبطة بالشعور بأن الغرفة تدور حول الرأس والجسم .

- تضيق الانبات المأدبة إلى الرئتين والتي ينتج عنها الصفير .

- فقدان مد أثناء الحميات .

- مشاكل في الأداء الجنسي .

- شدود في احتضار تتابع القلب (رسم القلب الكهربائي) .

تأثيرات مديدة لافتة (سجلت في أقل من ١ في كل ١٠٠٠٠٠ مريض) :

- انخفاض في عدد الخلايا الدموية عن تكوين الجلطات وتسنمى الصفات الدموية، وأيضاً لها تأثيرات على كثافة الخلايا المنسنة عن تكوين الخلايا البيضاء،

تماماً. كما أن كافة أنواع الخلايا الدموية التي تقارب العدوى وتسمى الخلايا البيضاء .

- رد فعل تحسسي (حساسية كافية لإمساد أو زيرن مع النفس) ، مصووبة في اضطرابات شديدة في ضغط الدم .

- تورم في الصلوة والحنجرة بالسائل، تشنج الحالب المسوية والحنجرة

(نادر جداً) .

- فشل الكيد على مدار أيام واسابيع ويسمى الفشل الكيدي الحاد وانسداد في القناة الصفراء ويسمى انسداد مارواي .

- ظهور علامات أرجوانية حمراء صغيرة ، احياناً مع كتل من الجلد أو في الأنسجة الأخرى الناجمة عن التهاب الأوعية الدموية . ملطف جلدي ناتج عن فقدان الطبلة الخارجية من الجلد .

- كبر حجم الثدي حتى في الذكور .

- انتصاف لفترة طويلة بشكل غير متعدد وغير مرتبط بالآثار الجنسية .

- تورم في الرؤوس بسبب احتباس مفروط في السوائل .

- انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل غير متعدد .

معلومات اضافية مهمة :

- المرض المستعين المصابين بالخرف والذين يتطلبون العلاج باستخدام هالدول للمسيطرة على السلوك قد يواجهون خطرًا أعلى في الوفاة باقتنائه مع عدم علاجه به .

- إذا كنت تعاني من عدم انتظام ضربات القلب (الخفقان، الدوخة أو الإغماء) .

- حمى عالية ، تصلب العضلات ، تنفس سريعة ، تعرق غير متعدد ، أو تقصص البقطة القلبية، عليك ابلاغ طبيبك على الفور قد يكون جسمك لا يتفاعل مع الدواء بشكل ملائم .

يجب اخبار الطبيب أو الصيدلي عن أي اثار جانبية أخرى غير مرغوبه قد تواجهك.

الجرعة الواحدة : احصل طبيبك على الفور إذا اخذت جرعة هالدول اكبر من اللازم .

وتشمل اعراض مابلي :

انخفاض البقطة القلبية، رجفة شديدة، تصلب في العضلات، هذه الآثار يمكنها البدء في علاج هذه الإضطرابات باستخدام الفحم المنشط الذي يمتص أي دواء يتعذر على معدنك .

معلومات للطبيب في حالة الجرعة الواحدة :

- النظر في تضليل المعدة أو تخفيف القيء، أو اعطاء الفحم المنشط .

- انشاء جريحاً هوائي وتطهير التدبر الداعمة .

- النظر في القتل المنشطة .

- مرافق تخطيط القلب والعلامة الحدية حتى يصبح التخطيط طبيعياً .

- لا يوجد ترافق محدد ولكن يمكن سحبه على رود الفعل خارج الهرمية عن طريق الحقن بمضاد الشلل الرعاش مثل بينزودوربين .

كيفية حفظ هالدول :

يمكن حفظ هالدول بين ٣٠-٥٠°C و هي درجة حرارة الفرة العادمة .

يمكنك الاحتفاظ بهذا الدواء لفترة محدودة فقط. لا تستخدم هالدول بعد التاريخ المطبع بـ EXP .

الشارب : احفظه باردة من التجمد .

محلول الحقن : يحفظ بعيداً عن الضوء .

تنصحك بإعادة الأدوية السابقة إلى الصيدلية .

ماهي مكونات هالدول ؟

الدواه الفعلي هي هالدول هالوسيرو .

اقراص هالدول :

يأتي هالدول اقراص في أكثر من تركيز :

١ - ملجم

تحتوي أيضًا على لاكتوز أحادي التميوه، نشا ذرة ، سكروز، تالك، زيت بذر القطن المهدج، ماء نقى .

٢ - ملجم

تحتوي على لاكتوز أحادي التميوه، ، نشا ذرة ، سكروز، تالك، زيت بذر القطن المهدج، ماء نقى، اندیجونين سلفونات الصوديوم .

٥ - ملجم

تحتوي على لاكتوز أحادي التميوه، ، نشا ذرة ، سكروز، تالك، زيت بذر القطن المهدج، ماء نقى، اندیجونين سلفونات الصوديوم .

١٠ - ملجم

تحتوي على كالسيوم هيدروجين فوسفات ثانوي التميوه، نشا ذرة ، كالسيوم سيرات، كينتون أنسفر، ماء نقى .

٢٠ - ملجم

تحتوي على كالسيوم هيدروجين فوسفات ثانوي التميوه، نشا ذرة ، كالسيوم سيرات، نشا ذرة عليه جيلاتين مسبقاً، ماء نقى .

الهالدول نقطات بالحقن :

يأتي هالدول نقطات بالحقن مع قطارة .

القوة :

١ مل يحتوي على ١ ملجم هالوبيرودول قطارة واحدة .

١ مل يحتوي على ١١٠ ملجم هالوبيرودول قطارة واحدة .

تحتوي النقاط أيضًا على حمض الالكتين، ميثيل باراهيدروكسيبينزوات وماء نقى .

الهالدول شراب :

يأتي هالدول شراب في زجاجة لأجل اعطاء الفحم المنشط .

التركيز :

١ مل يحتوي على ٦٣ ملجم هالوبيرودول قطارة واحدة بها .

١ مل يحتوي على ٦٣٥ ملجم هالوبيرودول قطارة واحدة بها .

يحتوي الشراب أيضًا على حمض الالكتين، ميثيل باراهيدروكسيبينزوات وماء نقى .

الهالدول محلول للحقن :

يحتوي المحلول على ملجم هالوبيرودول .

يحتوي المحلول أيضًا على ماء الحقن ، حمض الالكتين .

تسجل الشركة الصادحة / المصنعة :

راجح العالمية التجارية .

آخر تحديث لثمرة الدواء الداخلية : يوليو ٢٠٠٨

ما يتوجب عليك معرفته بشأن الأدوية ...

بلغ طبيبك أو الصيدلي عن أي أدوية أخرى غير مرغوبه قد تواجهك.

عدم تناولها معها .

من الهم استخدام الدواء بالشكل الصحيح ولذا فإنني ينصح عليك ان :

تقرا نشرة المعلومات الخاصة بالدواء بكمية متعارضة .

تستخدم الدواء فقط للمرض الذي وصف من الجله .

استخدم الدواء بالشكل الموصوف فقط .

احفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال .

لا تتبع أي دواعي إلحادية في العلاج .

تم وصفه للأفراد في عيادات الأطباء .

اخفظ الأدوية في عيادات الأطباء .

يجب اخبار الطبيب أو الصيدلي عن أي اثار جانبية أخرى غير مرغوبه قد تواجهك.

الجرعة الواحدة :

اصلح طبيبك على الفور إذا اخذت جرعة هالدول اكبر من اللازم .

وتشمل اعراض مابلي :

انخفاض البقطة القلبية، رجفة شديدة، تصلب في العضلات، هذه الآثار يمكنها البدء في علاج هذه الإضطرابات باستخدام الفحم المنشط الذي يمتص أي دواء يتعذر على معدنك .

معلومات للطبيب في حالة الجرعة الواحدة :

- النطق في تضليل المعدة أو تخفيف القيء، أو اعطاء الفحم المنشط .

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم .

- رد فعل تحسسي (حساسية كافية لإمساد أو زيرن مع النفس) ، مصووبة في اضطرابات شديدة في ضغط الدم .

- تورم في الصلوة والحنجرة بالسائل، تشنج الحالب المسوية والحنجرة

(نادر جداً) .

- فشل الكيد على مدار أيام واسابيع ويسمى الفشل الكيدي الحاد وانسداد في القناة الصفراء ويسمى انسداد مارواي .

- ظهور علامات أرجوانية حمراء صغيرة ، احياناً مع كتل من الجلد أو في الأنسجة الأخرى الناجمة عن التهاب الأوعية الدموية . ملطف جلدي ناتج عن فقدان الطبلة الخارجية من الجلد .

- كبر حجم الثدي حتى في الذكور .

- انتصاف لفترة طويلة بشكل غير متعدد وغير مرتبط بالآثار الجنسية .

- تورم في الرؤوس بسبب احتباس مفروط في السوائل .

- انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل غير متعدد .

- يأخذ طبيبك أو الصيدلي عن أي ادوية أخرى غير مرغوبه قد تواجهك.

الجرعة الواحدة :

اصلح طبيبك على الفور إذا اخذت جرعة هالدول اكبر من اللازم .

وتشمل اعراض مابلي :

انخفاض البقطة القلبية، رجفة شديدة، تصلب في العضلات، هذه الآثار يمكنها البدء في علاج هذه الإضطرابات باستخدام الفحم المنشط الذي يمتص أي دواء يتعذر على معدنك .

معلومات للطبيب في حالة الجرعة الواحدة :

- النطق في تضليل المعدة أو تخفيف القيء، أو اعطاء الفحم المنشط .

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم .

- رد فعل تحسسي (حساسية كافية لإمساد أو زيرن مع النفس) ، مصووبة في اضطرابات شديدة في ضغط الدم .

- تورم في الصلوة والحنجرة بالسائل، تشنج الحالب المسوية والحنجرة

(نادر جداً) .

- فشل الكيد على مدار أيام واسابيع ويسمى الفشل الكيدي الحاد وانسداد في القناة الصفراء ويسمى انسداد مارواي .

- ظهور علامات أرجوانية حمراء صغيرة ، احياناً مع كتل من الجلد أو في الأنسجة الأخرى الناجمة عن التهاب الأوعية الدموية . ملطف جلدي ناتج عن فقدان الطبلة الخارجية من الجلد .

- كبر حجم الثدي حتى في الذكور .

- انتصاف لفترة طويلة بشكل غير متعدد وغير مرتبط بالآثار الجنسية .

- تورم في الرؤوس بسبب احتباس مفروط في السوائل .

- انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل غير متعدد .

- يأخذ طبيبك أو الصيدلي عن أي ادوية أخرى غير مرغوبه قد تواجهك.

الجرعة الواحدة :

اصلح طبيبك على الفور إذا اخذت جرعة هالدول اكبر من اللازم .

وتشمل اعراض مابلي :

انخفاض البقطة القلبية، رجفة شديدة، تصلب في العضلات، هذه الآثار يمكنها البدء في علاج هذه الإضطرابات باستخدام الفحم المنشط الذي يمتص أي دواء يتعذر على معدنك .

معلومات للطبيب في حالة الجرعة الواحدة :

- النطق في تضليل المعدة أو تخفيف القيء، أو اعطاء الفحم المنشط .

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم .

- رد فعل تحسسي (حساسية كافية لإمساد أو زيرن مع النفس) ، مصووبة في اضطرابات شديدة في ضغط الدم .

- تورم في الصلوة والحنجرة بالسائل، تشنج الحالب المسوية والحنجرة

(نادر جداً) .

- فشل الكيد على مدار أيام واسابيع ويسمى الفشل الكيدي الحاد وانسداد في القناة الصفراء ويسمى انسداد مارواي .

- ظهور علامات أرجوانية حمراء صغيرة ، احياناً مع كتل من الجلد أو في الأنسجة الأخرى الناجمة عن التهاب الأوعية الدموية . ملطف جلدي ناتج عن فقدان الطبلة الخارجية من الجلد .

- كبر حجم الثدي حتى في الذكور .

- انتصاف لفترة طويلة بشكل غير متعدد وغير مرتبط بالآثار الجنسية .

- تورم في الرؤوس بسبب احتباس مفروط في السوائل .

- انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل غير متعدد .

- يأخذ طبيبك أو الصيدلي عن أي ادوية أخرى غير مرغوبه قد تواجهك.

الجرعة الواحدة :

اصلح طبيبك على الفور إذا اخذت جرعة هالدول اكبر من اللازم .

وتشمل اعراض مابلي :

انخفاض البقطة القلبية، رجفة شديدة، تصلب في العضلات، هذه الآثار يمكنها البدء في علاج هذه الإضطرابات باستخدام الفحم المنشط الذي يمتص أي دواء يتعذر على معدنك .

معلومات للطبيب في حالة الجرعة الواحدة :

- النطق في تضليل المعدة أو تخفيف القيء، أو اعطاء الفحم المنشط .

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم .

- رد فعل تحسسي (حساسية كافية لإمساد أو زيرن مع النفس) ، مصووبة في اضطرابات شديدة في ضغط الدم .

- تورم في الصلوة والحنجرة بالسائل، تشنج الحالب المسوية والحنجرة

(نادر جداً) .

- فشل الكيد على مدار أيام واسابيع ويسمى الفشل الكيدي الحاد وانسداد في القناة الصفراء ويسمى انسداد مارواي .

- ظهور علامات أرجوانية حمراء صغيرة ، احياناً مع كتل من الجلد أو في الأنسجة الأخرى الناجمة عن التهاب الأوعية الدموية . ملطف جلدي ناتج عن فقدان الطبلة الخارجية من الجلد .

- كبر حجم الثدي حتى في الذكور .

- انتصاف لفترة طويلة بشكل غير متعدد وغير مرتبط بالآثار الجنسية .

- تورم في الرؤوس بسبب احتباس مفروط في السوائل .

- انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل غير متعدد .

- يأخذ طبيبك أو الصيدلي عن أي ادوية أخرى غير مرغوبه قد تواجهك.

الجرعة الواحدة :

اصلح طبيبك على الفور إذا اخذت جرعة هالدول اكبر من اللازم .

وتشمل اعراض مابلي :

انخفاض البقطة القلبية، رجفة شديدة، تصلب في العضلات، هذه الآثار يمكنها البدء في علاج هذه الإضطرابات باستخدام الفحم المنشط الذي يمتص أي دواء يتعذر على معدنك .