

انتبه واقرأ بعناية**أليرجوديل بخاخ للأنف**

المكونات الفعالة : أزيلاستين هايدروكلورايد

التركيب :

كل بخة (تعادل ٠.١٤ ميليلتر من المحلول) تحتوي على ٠.١٤ ملليغرام من أزيلاستين هايدروكلورايد .

مكونات أخرى :

ايديتات الصوديوم ، ميثايل هيدروكسي بروبيل سيليلوز ، حمض الستريك منزوع الماء فوسفات الصوديوم ، كلورايد الصوديوم ، ماء مقطر .

دواعي الاستعمال :

لعلاج أعراض التهاب الانف التحسسي الموسمي (حمى القش) أو التهاب غشاء الانف التحسسي غير الموسمي (الدائم).

مضادات الاستعمال :

أليرجوديل يجب ألا يستعمل للمرض ذوي فرط التحسس للأزيلاستين هايدروكلورايد ، أو الايدتا ولا للأطفال دون سن ٦ سنوات .

الاستعمال في حالتي الحمل و الرضاعة :

على الرغم من أن الجرعات الزائدة جدا عن معدل الجرعة العلاجية المجربة على حيوانات المختبر ، لم تؤد الى اظهار أية دلالة على أن العقار له تأثير غير طبيعي على الجنين ، الا أن النظريات الطبية الحالية لا تشجع على استعمال اليرجوديل في فترة الثلاثة أشهر الأولى من الحمل .

يجب ألا تستعمل الأمهات المرضعات الأليليرجوديل لأنه لا يوجد دليل كاف على سلامة استعمال العقار خلال فترة الرضاعة

التأثيرات الجانبية :

في حالات نادرة تحدث تهيجات في الغشاء المخاطي الملتهب للأنف عند الرش، مثل : لسع ، حكة و عطاس . وفي بعض الحالات قد يحدث للمريض نزع أنفي . في حالة الاستعمال غير الصحيح (الرأس مائل للخلف ، انظر تعليمات الجرعة و طريقة الاستعمال) ربما يحدث طعما مرا و الذي يمكن أن يؤدي أحيانا الى الغثيان .

التفاعل مع الأدوية الأخرى :

غير معروف

تعليمات الجرعة، وكيف تستعمل الدواء و مدة العلاج:مالم يصف لك الطبيب خلاف ذلك ، رش الدواء في كل فتحة أنف مرتين يوميا (يعادل جرعة يومية مقدارها ٠.٥٦ ملليغرام أزيلاستين هايدروكلورايد)
رش الدواء و راسك في وضعه المنتصب (راجع : كيف تستعمل اليرجوديل).

اليرجوديل يمكن استعماله حتى تزول الاعراض ، ولكن يجب عدم الاستمرار بالمعالجة لأكثر من (٦ أشهر) متتالية .

ملاحظة خاصة بالثباتية :

لا يحفظ في الثلاجة / يحفظ عند درجة حرارة اقل من ٢٥ م°

لا تستعمل الدواء بعد تاريخ انتهاء فترة الصلاحية على العبوة .

لا تستعمل الدواء لأكثر من (٦ أشهر) بعد فتح العبوة لأول مرة .

احفظ الأدوية بعيدا عن متناول الاطفال!

العبوة:

قارورة تحتوي على ١٠ مليلتر محلول .

الجهة المالكة المفوضة بالتسويق:

ميدا للصناعات الدوائية ذات المسؤولية المحدودة

بنزستراس ١

٦١٣٥٢ بادهمبورغ، ألمانيا

الجهة المصنعة:

ميدا للصناعات الدوائية ذات المسؤولية المحدودة

نيوراذر رينغ ١

٥١٠٦٣ كولون ، ألمانيا

"ان هذا دواء "

الدواء مستحضر و لكن ليس كغيره من المستحضرات .

الدواء يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك .

الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره .

لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .

لا تكرر صرف الدواء بدون إستشارة الطبيب .


كيف تستعمل اليرجوديل:

١ - أزل الغطاء الواقي .


٢ - قبل أول إستعمال ، اضغط المضخة عدة مرات إلى أن يصبح الرش الخارج منتظما .

٣ - رش في كل فتحة أنف مرة واحدة ورأسك في وضعه المنتصب .


٤ - إمسح ، وضع الغطاء الواقي .



الشكل ٣



الشكل ٢



الشكل ١

تاريخ الإصدار يناير ٢٠١١

T5005196
562202-5810ME01 C120