

**نشرة الدواء: معلومات للمريض**

**إتوكسا ٦٠ ملغ أقراص ملبسة بالفيلم**

**إتوكسا ٩٠ ملغ أقراص ملبسة بالفيلم**

**إتوكسا ١٢٠ملغ أقراص ملبسة بالفيلم**

**إتوريكوكسيب**

**اقرأ هذه النشرة كاملة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة.**

– احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.

– إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، يتنغي عليك طرحها على الطبيب أو الصيدلي.

– هذا الدواء قد تم وصفه لك فلا تزم بوصفه للأخرين، فإنه قد يلحق الضرر بهم حتى لو كان لديهم نفس الأعراض التي تعاني منها.

– إذا أصبت بأي من الآثار الجانبية أو إذا لاحظت أي آثار جانبية ليست مدرجة في هذه النشرة، يرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي.

**في هذه النشرة:**

١. ما هو إتوكسا وما هي دواعي استعماله
٢. ما عليك معرفته قبل تناول إتوكسا
٣. كيفية تناول إتوكسا
٤. الآثار الجانبية المحتملة
٥. كيفية حفظ إتوكسا
٦. محتويات العبوة ومعلومات إضافية

**١. ما هو إتوكسا وما هي دواعي استعماله**

يحتوي إتوكسا على المادة الفعالة إتوريكوكسيب. إتوكسا هو واحد من مجموعة أدوية تدعى مثبطات سيكلوأوكسيجيناز-٢ الانتقائية. هذه الأدوية تنتمي إلى عائلة من الأدوية تُدعى مضادات التهاب غير ستيروئيدية.

إتوكسا يساعد على تخفيف الألم والوذمة (الانتهاج) في المفاصل والعضلات عند الأشخاص من عمر ١٦ سنة وأكبر الذين يعانون من فصال عظمي التهاب مفاصل رثيوي.

التهاب الفقار المقسط والتهرس.

إتوكسا يستخدم أيضا للعلاج لفترة قصيرة للألام المتوسطة الناتجة عن جراحة الأسنان عند الأشخاص من عمر ١٦ سنة وأكبر.

ما هو الفصال العظمي؟
ما هو مرض فيصيب المفاصل. هو ينتج عن تحطم تدريجي للغضروف الذي يكسو نهايات العظام. وهذا يسبب وذمة (التهاب) ووجع، إيلام، صلابة وعجز الفصال العظمي هو مرض يصيب المفاصل.

ما هو التهاب المفاصل الرثيوي؟

التهاب المفاصل الرثيوي هو مرض التهابي طويل الأمد في المفاصل. يسبب ألم، صلابة، وذمة، و زيادة في تناقص حركة المفاصل المصابة. يمكن أن يسبب أيضا التهاب

في أماكن أخرى من الجسم.

ما هو التهاب في المفاصل ناتج عن نوبات مفاجئة ومتكررة لاحمرار والتهاب مؤلم جدا. العامل المسبب هو ترسب بلورات معدنية في المفاصل.

ما هو التهاب الفقار المقسط؟

التهاب الفقار المقسط هو مرض التهابي يصيب العمود الفقري والمفاصل الكبيرة.

**٢. ما عليك معرفته قبل تناول إتوكسا**

**لا تتناول إتوكسا:**

- إذا كنت تعاني من الحساسية المفرطة على إتوريكوكسيب أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء المبنية في الفقرة ٦.
- إذا كنت تعاني من حساسية على مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، والتي تتضمن أسبيرين ومثبطات سيكلو أوكسيجيناز-٢ (أنظر «الآثار الجانبية المحتملة»، فقرة ٤).
- إذا كنت تعاني من قرحة في المعدة أو نزيف في المعدة أو الأمعاء.
- إذا كنت تعاني من مرض كبدى خطير.
- إذا كنت تعاني من مرض كلوي خطير.
- في حالة الحمل أو الرضاعة (أنظر«الحمل. الرضاعة. والخصوبة»).
- إذا كنت أصغر من ١١ سنة.
- إذا كنت تعاني من مرض قولوني التهابي، مثل داء كروهن. التهاب القولون المتفرح، أو التهاب القولون.
- إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم غير مرافق بعلاج (يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد من أن ضغطك الدموي مرافق بشكل مناسب).
- إذا أجرى الطبيب تشخيصا لمشاكل قلبية تتضمن قصور قلب (متوسط أو شديد)، خناق ألم صدرى).
- إذا كنت تعاني من نوبة قلبية، جراحة تحويلية، مرض شرياني محيطي (دوران دموي ضعيف في القدمين بسبب تضيق أو انسداد شرياني).
- إذا كنت تعاني من أي نوع من السمكات (سكتة صغيرة، نوبة اقفارية عابرة).
- إتوكسا يستخد كإدوية قد يزيد قليلا من خطر حدوث نوبة قلبية وسكتة ولذلك يجب عدم استخدامه عند الذين يعانون من مشاكل قلبية أو سكتة.
- إتوريكوكسيب قد يزيد قليلا من خطر حدوث نوبة قلبية وسكتة ولذلك يجب عدم تناوله هذا الدواء إلا بعد استشارة الطبيب.
- إذا كنت تعتقد بأن أي مما سبق يتعلق بحالتك، لا تتناول هذا الدواء إلا بعد استشارة الطبيب.

**التحذيرات والإحتياطات**

يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول إتوكسا إذا:

- كنت تعاني من نزيف في المعدة أو قرحة.
- كنت تعاني من تحفاف ناتج عن فيء أو إسهال.
- كنت تعاني من وذمة ناتجة عن احتباس سوائل.
- كنت تعاني من قصور قلب، أو أي شكل آخر من الأمراض القلبية.
- كنت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، إتوكسا يرفع ضغط الدم عند بعض الأشخاص. خاصة بجرعات عالية، وينبغي على الطبيب مراقبة ضغط الدم بين الحين والآخر.
- كنت تعاني من أي مرض كبدى أو كلوي.
- كنت تتعالج من عدوى، إتوكسا يمكن أن يخفي الحرارة التي تعتبر مؤشرا للعدوى.
- كنت تعاني من داء سكري، ارتفاع كولسترول، أو كنت من المدخنين. هذه العوامل قد تزيد من خطر التعرض لأمراض قلبية.
- كنت إمراة تحاول الحمل.
- كنت أكبر من ٦٥ سنة.

إذا لم تكن متأكد مما إذا كان أي من أعلاه ينطبق عليك، ينبغي التحدث مع طبيبك قبل تناول إتوكسا لمعرفة ما إذا كان هذا الدواء مناسب لك.

يعمل إتوكسا بنفس الفير في المرضى البالغين الأكبر سنا والأصغر سنا. إذا كنت أكبر من ٦٥ سنة، يفضل الطبيب وضعك تحت المراقبة الملائمة. إن تعديل الجرعة هو أمر غير ضروري للمرضى أكبر من ٦٥ سنة.

**الأطفال والبالغين**

هذا الدواء لا يعطى للأطفال والمراهقين دون سن ١١ عاماً.

**إتوكسا وأدوية أخرى**

آخر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تتناول في وقت قريب أو يمكن أن تتناول أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية دون وصفة طبية.

لا سيما إذا كنت تتناول أي من الأدوية التالية، قد يزيد الطبيب مراقبتك للتأكد من أن أدويةك تعمل بشكل صحيح. بمجرد البدء بأخذ إتوكسا:

- أدوية تمنع الدم (مضادات التخثر)، مثل الوارفارين.
- ريفامبيسين (مضاد حيوي).
- منوترنكسات (دواء مشيط للجهاز المناعي، وعادة يستخدم في التهاب المفاصل الرثيوي).
- سيكلوسبورين أو تاكروليموس (أدوية منيطة للجهاز المناعي).
- لينجوم (دواء يستخدم لعلاج بعض أنواع الاكتئاب).
- أدوية تساعد على التحكم بضغط الدم المرتفع وقصور القلب تدعى مثبطات الأنجيوتنسين المنقلبة وحاجبات مستقبل الأنجيوتنسين، وتتضمن الأمثلة إنالابريل ورامبيريل، ولوزرتان وفاليزتان.
- المدرات (أقراص مدرة للبول).
- ديجوكسين (دواء يستخدم لعلاج قصور القلب واضطراب نظم القلب).
- مينوكسيديل (دواء يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم).
- أقراص أو محلول الساليتامول (دواء للربو).
- موانع الحمل الفموية (مشاركتها يمكن أن يزيد من خطر التأثيرات الجانبية).
- بدائل هرمونية (مشاركتها يمكن أن يزيد من خطر التأثيرات الجانبية).
- أسبيرين. خطر حدوث قرحة هضمية هو أشد عند تناول إتوكسا مع أسبيرين.

• أسبيرين للوقاية من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية:

يمكن تناول إتوكسا مع جرعة منخفضة من الأسبيرين. إذا كنت تتناول حاليا جرعة منخفضة من الأسبيرين للوقاية من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية، لا ينبغي التوقف عن تناول الأسبيرين إلا بعد استشارة طبيبك.

• أسبيرين وأدوية أخرى مضادة للالتهاب غير ستيروئيدية: لا تأخذ جرعات عالية من أسبيرين أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب أثناء تناول إتوكسا.

**إتوكسا مع الطعام والشراب**

إن بدء تأثير إتوكسا يمكن أن يكون أسرع عند تناوله دون الطعام.

**الحمل. الرضاعة. والخصوبة**

**الحمل**

يجب عدم تناول إتوكسا أثناء الحمل.

في حالة الحمل أو إذا كان هناك تفكير في إمكانية الحمل أو تخطيط للحمل، يجب عدم تناول إتوكسا. في حالة الحمل، يجب التوقف عن تناول الأقراص ومراجعة الطبيب. يجب مراجعة الطبيب في حال عدم التأكد أو عند الحاجة لمزيد من النصائح.

**الرضاعة**

من غير المعروف ما إذا كان إتوكسا يمر عبر حليب الأم، في حالة الإرضاع أو البدء بالإرضاع يجب مراجعة الطبيب قبل تناول إتوكسا. عند تناول إتوكسا يجب التوقف عن الرضاعة.

**الخصوبة**

لا يوصى باستخدام إتوكسا عند النساء اللواتي تحاولن الحمل.

**القيادة وتشغيل الماكينات**

لقد أفيد عن حالات دوار ونعاس عند بعض المرضى أثناء استخدام إتوريكوكسيب.

يجب عدم القيادة عند الشعور بالدوار والنعاس.

يجب عدم استخدام المعدات أو الماكينات عند الشعور بالدوار والنعاس.

**يحتوي إتوكسا على الصوديوم**

يحتوي إتوكسا على أقل من ١ ميليمول من الصوديوم ما يعادل ٢٣ ملغ في كلِّ قرص مغلف، ممَّا يجعله بشكل أساسي "خالي من الصوديوم".

**٣ – كيفية تناول إتوكسا**

ينبغي تناول هذا الدواء دائما حسب إرشادات الطبيب. استشر الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

لا تأخذ أكثر من الجرعة الموصى بها لجألتك. سوف يرغب الطبيب بمناقشة العلاج معك بين الحين والآخر. من المهم تناول أقل جرعة للتحكم بالألم ويجب عدم تناول إتوكسا لفترة أطول من اللازم. ذلك لأن خطر حدوث نوبات قلبية وسكتات دماغية قد يزداد بعد المعالجة الطويلة الأمد. خاصة بجرعات عالية.

هناك مقادير مختلفة متوفرة لهذا المنتج الدوائي واستنادا للمرض سيصف الطبيب الجرعة اللازمة لحالتك.

**الجرعة الموصى بها هي:**

الجرعة الموصى بها هي ٣٠ ملغ مرة يوميا، ويمكن زيادتها كحد أقصى حتى ٦٠ ملغ مرة يوميا عند اللازم.

التهاب المفاصل الرثيوي

الجرعة الموصى بها هي ٦٠ ملغ مرة يوميا، ويمكن زيادتها كحد أقصى حتى ٩٠ ملغ مرة يوميا عند اللازم.

التهاب الفقار المقسط

الجرعة الموصى بها هي ٦٠ ملغ مرة يوميا، ويمكن زيادتها كحد أقصى حتى ٩٠ ملغ مرة يوميا عند اللازم.

**حالات الألم الحاد**

يجب استخدام إتوريكوكسيب فقط في فترة الألم الحاد.

**التهرس**

الجرعة الموصى بها هي ٦٠ ملغ مرة يوميا والتي يجب أن تستخدم فقط لفترة الألم الحاد، ولغاية ٨ أيام من المعالجة كحد أقصى.

الم بعد الإجراء الجراحي للأنسنان

الجرعة الموصى بها هي ٩٠ ملغ مرة يوميا، ولغاية ٣ أيام من المعالجة كحد أقصى.

**أشخاص لديهم مشاكل كبدية**

– إذا كنت تعاني من داء كبدي خفيف، يجب عدم تناول أكثر من ٦٠ ملغ يوميا.

– إذا كنت تعاني من داء كبدي متوسط، يجب عدم تناول أكثر من ٣٠ ملغ يوميا.

**الاستعمال عند الأطفال والبالغين**

أقراص إتوكسا لا تعطى للأطفال أو البالغين تحت سن ١١ سنة.

**المسننين**

لا ضرورة لتعديل الجرعة عند المرضى المسنين. كما هو الحال مع الأدوية الأخرى، يجب توخي الحذر عند المرضى المسنين.

**طريقة الاستعمال**

إتوكسا يعطى عن طريق الفم. تؤخذ الأقراص مرة يوميا. يمكن أن يؤخذ إتوكسا مع أو بدون طعام.

**في حال تناول إتوكسا بكمية أكبر مما يجب**

لا ينبغي تناول أقراص أكثر ممَّا يوصى به الطبيب.

يجب التماس العناية الطبية الفورية عند تناول عدد كبير من أقراص إتوكسا.

**في حال نسيان تناول إتوكسا**

من المهم تناول إتوكسا كما هو محدد من قبل الطبيب. عند نسيان تناول جرعة، يمكن استئناف الجدول المعتاد في اليوم التالي. لا ينبغي تناول جرعة مضاعفة للجرعة عن الجرعة المنسية.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى عن استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

**٤- الآثار الجانبية المحتملة**

كما هو الحال مع جميع الأدوية، هذا الدواء يمكن أن يسبب آثاراً جانبية، ولكن ليس من الضروري أن يصاب بها كل المرضى.

**في حال حدوث أي من الإشارات التالية يجب تناول إتوكسا ومراجعة الطبيب فوراً (أنظر « ما عليك معرفته قبل تناول إتوكسا» الفقرة ٢):**

- قصور نفس، ألم في الصدر، أو ظهور تورم في الكاحل أو إذا ازدادت هذه الحالات سوءاً.
- اصفرار الجلد والعيون (يرقان) – هذه إشارات لمشاكل كبدية.
- ألم في المعدة شديد أو مستمر أو إذا أصبح لون البراز أسود.
- تفاعل تحسسي – قد يتضمن مشاكل جلدية مثل التقرحات، أو تورم في الوجه، الشفاه، اللسان، أو الحلق والذي قد يسبب صعوبة في التنفس.

يتمّ تحديد مدى تكرار الآثار الجانبية المحتملة مدته باستخدام الإصطلاح التّالي:

- **شائعة جداً** (يؤثر على أكثر من مستخدم ١ من بين ١٠)
- **شائعة** (يصيب ١ إلى ١٠ مستخدمين من بين ١٠٠)
- **غير شائعة** (يصيب ١ إلى ١٠ مستخدمين من بين ١٠٠٠)
- **نادرة** (يصيب ١ إلى ١٠مستخدمين من بين ١٠٠٠٠)
- **نادرة جداً** (يصيب أقل من مستخدم ١ من بين ١٠٠٠٠)

يمكن أن تحدث التأثيرات الجانبية التالية أثناء المعالجة بإتوكسا:

**شائعة جداً**، (يؤثر على أكثر من مستخدم ١ في كل ١٠)

– ألم في المعدة.

**شائعة**، (يصيب ١ إلى ١٠ مستخدمين من بين ١٠٠)

– سنخ جاف (التهاب وآلم بعد قلع السن).

– تورم الرجلين و/أو القدمين بسبب احتباس السوائل (وذمة).

– دوار صراع.

– خفقان (تض قلب سريع أو غير منتظم)، نظم قلب غير طبيعي (لا نظمية).

– ارتفاع ضغط الدم.

– ازدياد أو قصور نفس (تشنج القصات).

– إسهال، ريح، التهاب معدة (التهاب في بطانة المعدة)، حرقة، إسهال عسر هضم، غثيان، قيئ، التهاب المريئ، تقرحات في الفم.

– تقرحات في فحوص الدم متعلقة بالكبد.

– تكدم.

– وهن وتعب، واعتلال شببيه بالإنفلونزا.

**غير شائعة**، (يصيب ١ إلى ١٠ مستخدمين من بين ١٠٠٠)

– التهاب هضمي (التهاب في جهاز الهضم يتضمن المعدة والأمعاء الدقيقة)، إصابة جراثيمية في الطرق التنفسية العلوية، إصابة جراثيمية في المسالك البولية.

– تغير في القيم المخبرية (انخفاض عدد كريات الدم الحمراء، انخفاض عدد كريات الدم البيضاء، انخفاض ضغط الدم البيضاء، انخفاض الصفائح).

– فرط تحسس (تفاعل تحسسي يتمثل الحشرى والذي قد يكون خطير بشكل كافي للاتماس العناية الطبية الفورية).

– ازدياد أو تناقص في الشهية، زيادة وزن.

– قلق، اكتئاب، تناقض في الحدة الذهنية، رؤية، إحساس أو سماع أشياء غير موجودة (هلوسة).

– تبدل المزاج، عدم القدرة على النوم، إحدرار أو نخر، قلة نوم.

– تشوش رؤية، نخريش واحمرار في العين.

– نطش في الأذنين، دوخة.

– نظم قلب غير طبيعي (رجفان أذيني)، تسارع قلب، قصور قلب، إحساس بالضيق، الضغط أو الثقل في الصدر(خناق صدرى)، نوبة قلبية.

– نومه، سكتة دماغية، سكتة صغيرة (نوبة إقفار عابرة)، ارتفاع شديد في ضغط الدم، التهاب في الأوعية الدموية.

– سعال، عدم القدرة على التنفس، نيفز أنفي.

– تضليل المعدة أو الأغور، جفاف فم، قرحة في المعدة، التهاب بطانة المعدة الذي قد يشتد و يؤدي إلى نزيف. متلازمة القولون المتهيج، التهاب البنكرياس.

– تورم الوجه، طفح جلدي، احمرار الجلد.

– تشنج عضلات، ألم / صلابة في العضلات.

– فرط بوتاسيوم الدم، تبدل في فحص الدم أو البول ذات الصلة في الكلية، مشاكل كلوية.

– ألم في الصدر.

**نادرة**، (يصيب ١ إلى ١٠ مستخدمين من بين ١٠٠٠)

– وذمة وثنائية (تفاعل تحسسي مع تورم في الوجه، الشفاه، اللسان و/أو الحلق والذي قد يسبب صعوبة في التنفس أو البلع، قد يكون خطير بشكل كاف للاتماس العناية الطبية الفورية) / صدمة تأقية (تفاعل تحسسي خطير يستدعي التماس العناية الطبية الفورية).

– آرتياك، عدم راحة.

– مشاكل كبدية (التهاب كبد).

– نقص صوديوم الدم.

– تقصّلات كبدي، اصفرار في الجلد و/ أو العيون (يرقان).

– تقصّلات جلدية شديدة.

**الإبلاغ عن الآثار الجانبية**

إذا شعرت بأي من الآثار الجانبية، أبلغ الطبيب أو الصيدلي. هذا يتضمن أي من التأثيرات الجانبية المحتملة وغير الواردة في هذه النشرة.

من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

**٥ – كيفية حفظ إتوكسا**

– بحفظ هذا الدواء بعيدا عن مرآى ومتناول الأطفال.

– لا تستخدم هذا الدواء بعد انتهاء مدة فعاليته المدونة على الشريط والعبوة الخارجية. تاريخ الانتهاء هو آخر يوم من ذلك الشهر.

– احفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠° مئوية بعيداً عن الرطوبة.

– ينبغي عدم استخدام هذا الدواء عند ملاحظة أي علامة تدل على تخربه.

– لا تقوم برمي أي دواء في مياه الصرف الصحي. اسأل الصيدلي عن كيفية رمي الأدوية غير المستعملة. هذه المعايير يمكن أن تساعد على حماية البيئة.

**٦ – محتوى العبوة ومعلومات إضافية**

**محتوى إتوكسا**

– المادة الفعالة هي إتوريكوكسيب. كل قرص ملبس بالفيلم يحتوي على ٩٠، ٦٠ أو ١٢٠ ملغ من إتوريكوكسيب.

– العناصر الأخرى هي: هروجن فوسفات (الأماني)، كروسكارملوز الصوديوم، شمععات المغنيزيوم، هيكوكريستالين، سللوز، سيليكات غروية لامائية، تلبس الفرض، هيبيرملوز، ثاني أكسيد التيتانيوم (E ١٧١)، بولي إيثيلين غليكول، أكسيد الحديد الأحمر (E ١٧١).

**بشكل إتوكسا ومحتوى العبوة**

أقراص إتوكسا متوفرة في ثلاثة جرعات:

١٠ ملغ زهرية اللون، دائرية، ثنائية التحب. أقراص ملبسة بالفيلم.

٩٠ ملغ زهرية اللون، بيضاوية، ثنائية التحب. أقراص ملبسة بالفيلم.

١٢٠ ملغ زهرية اللون، بيضاوية، ثنائية التحب. أقراص ملبسة بالفيلم.

إتوكسا ٦٠ ملغ و ٩٠ ملغ أقراص ملبسة بالفيلم متوفرة في أشرطة ألومنيوم / ألومنيوم (جرعات موحدة) في عبوات تحتوي على ١٠ و ٣٠ قرص.

إتوكسا ١٢٠ ملغ أقراص ملبسة بالفيلم متوفرة في أشرطة ألومنيوم / ألومنيوم (جرعات موحدة) في عبوات تحتوي على ٧ أقراص.

**حامل إذن التسويق والشركة المصنعة**

فارماليين سي.مل – لبنان

صندوق بريد ٩٠٢١٠ جديدة المتين، لبنان

للاتصال بنا: pharmaline@maliagroup.com

الموقع الإلكتروني: www.pharmaline.com

إتوكسا ٦٠ ملغ ١٠ أقراص ملبسة بالفيلم رقم التسجيل لبنان ١/١٧٨٢٠

إتوكسا ٦٠ ملغ ٣٠ قرص ملبس بالفيلم رقم التسجيل لبنان ١/٢٨٣١٧

إتوكسا ٩٠ ملغ ١٠ أقراص ملبسة بالفيلم رقم التسجيل لبنان ١/١٧٨٢٠

إتوكسا ٩٠ ملغ ٣٠ قرص ملبس بالفيلم رقم التسجيل لبنان ١/٢٨٣١٧

إتوكسا ١٢٠ ملغ ٧ أقراص ملبسة بالفيلم رقم التسجيل لبنان ١/٢٨٣١٧

من الممكن ألا تكون جميع أحجام العبوات متسوّقة.

**هذا المنتج هو دواء**

– الدواء منتج يؤثر على صحتكم ويمكن أن يشكّل خطراً عليكم إذا ما استُعمل خلافاً للتعليمات

– يجب اتباع وصفة الطبيب وتعليماته بشكل صارم ودقيق، وكذلك يجب اتباع طريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي باعكم الدواء.

– الأطباء والصيدالة خبراء في الأدوية وسنساعدكم ومخاطرها.

– لا توقفوا فترة العلاج المحددة لكم من تلقاء نفسم.

– لا تقوموا بتكرار الوصفة الطبية لكم من دون استشارة الطبيب.

– لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

– محصل وزراء الصحة العرب

اتحاد صيادلة العرب