

لاميزيل

تيربيتاين هيدروكلوريد ١٪

كريم

ملاسته خطأ للعيدين. قد تتفاقم العدوى الفطرية المستبطنة في حالات نادرة.

فيما يلي سرد الآثار الجانبية حسب صنف الجهاز ومدى التواتر. تُعرف بيانات التواتر كما يلي:

تُحدد الآثار الجانبية عن طريق خفض مدى التواتر في نطاق كل فئة تواتر.

ناتج (≤ ١٪)، شائع (≤ ١٠٪)، متوسط (≤ ١٠٪)، عالي (≤ ١٪)، عالي (≤ ٠،٠٠١٪).

تُحدد الآثار الجانبية من طريقة خفض مدى التواتر في نطاق كل فئة تواتر وذلك من أجل تقليل الخطورة.

الجهاز المناعي

لوتحت تفاعلات فرط الحساسية التالية:

نادر جداً: الشرى

حالات فردية: وذمة وعائية، صدمة الحساسية

العيدين

حالات نادرة: تهيج

البشرة

حالات شائعة: تقرّر الجلد، الحكة

حالات عرضية: الجروح، تكون قشور، تغيرات الجلد، اضطرابات تصبغ الجلد، التهاب الجلد التماسي، الإكزيما

حالات نادرة: جفاف الجلد، التهاب الجلد التماسي، الإكزيما

حالات نادرة جداً: تهيج جلدي أو بثور جلدية

اضطرابات عامة

حالات غير شائعة: ألم، ألم في موضع الدهان أو تهيجه.

حالات نادرة: تفاقم المرض المستطن.

في حالة ظهور أي آثار جانبية أخرى غير تلك الموصوفة في هذه النشرة يجب وقف العلاج واستحضر لاميزيل فوراً وإخبار الطبيب أو الصيدلي.

لا توجد تفاعلات دوائية معروفة مع الاستخدام الموضعي للتيربيتاين

٦. الجرعة الزائدة

نتيجة لانخفاض امتصاص التيربيتاين في الدم، فإن الجرعات الزائدة مستبعدة.

على سبيل المثال، إذا تم إيتالاع أدويباً من كريم لاميزيل عن طريق الخطأ فإنهم يحتوون على ٣٠ مجم من هيدروكلوريد التيربيتاين مما يعادل نفس كريم لاميزيل بكمية أكبر خطأ، فإن الأعراض الجانبية المتوقعة هي نفسها بالمقارنة بالجرعة الزائدة في أفراد لاميزيل وتشمل الصداع، الغثيان، الألم البطن، الدوار.

٧. علاج الجرعات الزائدة

في حالة الابتلاء عن طريق الخطأ، فإن العلاج الموصى به للجرعة الزائدة هو التخلص من المنتج الطبي باستخدام القضم المشط للحد من الأعراض الجانبية مع معالجة الأعراض الجانبية إن لزم.

٨. كيفية تخزين كريم لاميزيل

- يجب أن تحفظ الأدوية بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

- لا يزيد كريم لاميزيل درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية.

- لا يجب استخدام هذا الدواء بعد انتقاء فترة الصلاحية الموضحة على **البيئة <EXP>**.

للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة، قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي اللذين تكون بحوزتهم معلومات تفصيلية مخصصة للعاملين بال المجال الطبي.

٩. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

ال الكريم: ١٥ جم

صنف من قبل:

جي إس كي كونسيومر هيلث كير إس أيه، نيون، سويسرا.

الشركة المالكة لحق التسويق:

جي إس كي كونسيومر هيلث كير

شويز إيه جي، سويسرا

تاریخ التحدیت:

GDS Version 1 حسب ١

تمت المراجعة في نوفمبر ٢٠١٨

العلامة التجارية مملوكة/مرخصة لمجموعة شركات جي إس كي.

هذه دواء هو مستحضر يؤثر على صحتك واستخدامه بعكس التوجيهات قد يكون خطراً.

- اتبع توجيهات الطبيب، وطريقة الاستخدام وتوجيهات الصيدلي الذي قام ببيع الدواء لك.

- لا يقطع مدة العلاج المحددة لك دون الرجوع إلى الطبيب.

- لا ت عبد استخدام نفس الوصفة دون الرجوع إلى الطبيب.

- إحفظ بالآدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

إتحاد الصيادلة العرب

تحتوي هذه النشرة على:

١. ما الذي يحتويه كريم لاميزيل

٢. ما هو كريم لاميزيل وما هي استخداماته

٣. ما الذي يجب أن تعرفه قبل استخدام كريم لاميزيل

٤. كيف يستخدم كريم لاميزيل

٥. الآثار الجانبية المحتملة

٦. الجرعة الزائدة

٧. كيفية تخزين كريم لاميزيل

٨. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

٩. ما الذي يحتويه كريم لاميزيل

١٠. جم من كريم لاميزيل يحتوي على ١٠ ملجم هيدروكلوريد التيربيتاين

(مادة فعالة)، مما يعادل ٨,٨ ملجم من التيربيتاين الأساسي.

المادة الإضافية: ماء منقى، هيدروكسيد الصوديوم، كحول البنزيل، سيارات

السوبريتان، سيليلوبوليميتات، كحول السيتيل، كحول ستيرابل، بولي سوربات

أ.يزوبروبيل ميرسيات.

١٠. ما هو كريم لاميزيل وما هي استخداماته

يستخدم كريم لاميزيل لمعالجة العدوى الفطرية للجلد الناتجة عن فطريات

الجلد مثل تينيا القدم (القدم الرياضي).

كما يستخدم كريم لاميزيل عدو فطريات الخبيرة في الجلد تسمى (النخالية البرقشة).

إضافةً إلى ذلك فإنه يعالج العدوى الفطرية في الجلد بسبب فطريات الخبيرة، خاصةً عند الكاذبين (مثل الفطريات الميبيضة).

١١. ما الذي يجب أن تعرفه قبل استخدام كريم لاميزيل

أ. لا تستخدم كريم لاميزيل في حال:

- فرط التحسّن من هيدروكلوريد التيربيتاين أو أي من المواد الإضافية الأخرى في الكريم.

ب. التهذيرات والاحتياطات

مستحضر لاميزيل معد للاستخدام الخارجي فقط.

تجنب ملامسة العينين.

ينبغي توخي الحذر عند استخدام لاميزيل على الآفات الجلدية، حيث قد

يؤدي الكحول أو إلى تهيج الجلد.

يحتوي كريم لاميزيل على كحول ستيرابل وكحول ستيرابل، مما قد يثير

تفاعلات جلدية موضعية (مثل التهاب الجلد التماسي).

يحفظ بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

ج. العمل والرضا عن الطبيعة:

الحمل

لا توجد تجارب على النساء الحوامل، لم تثبت التجارب على الحيوانات أي

أضرار على الجنين. لا تستخدم لاميزيل في الحمل إلا عند الضرورة.

الرضا عن الطبيعة:

يفرز التيربيتاين بكميات قليلة في حليب الأم المرضعة ولا توجد دراسات

تثبت تأثير هذه الكميّات الصغيرة على الطفل. لا يجب استخدام كريم

لاميزيل في حالة الرضاعة الطبيعية. كما يجب عدم ملامسة الطفل

للم منطقة العالجة باللاميزيل.

د. القيادة واستخدام الآلات:

لا توجد دراسات

١٢. كيف تستخدم كريم لاميزيل

للباغين والأطفال فوق سن الـ ١١ سنة: قبل استعمال لاميزيل، أغسل بعناية

الأجزاء المصابة بواسطة قطعة من القطن والماء الفاتر ثم جفف بعناية.

ضع كريم لاميزيل على الأجزاء المصابة والمناطق المحيطة بها ثم افركه

بلطف للتأكد من ش瑟ته فيها.

في حالة الأصابة بتهابات الشفرين، بين

الأصابع، بين الالتباس، بين الأصابع، بين الالتباس، بين شفرين فيها.

المصابة بعد استخدام لاميزيل كريم خاصة على مدار الليل.

فترقة الماحلة المائية:

- (القدم الرياضي)، اضطرابات الجلد السطحية: مرة يومياً لمدة أسبوع

تبني اختفاء الأعراض عادة بعد أيام قليلة.

- القدم الرياضي من " نوع الخ" (القدم الرياضي على باطن وحروف

القسمين) مرتين يومياً لمدة أسبوعين

- الالتباسات المطرية الناتجة عن الخميرة: مرتين إلى مرتين يومياً لمدة

أسبوع واحد.

- لداء النخالية المبرقشة: استعمل الدواء مرة أو مرتين يومياً لمدة

أسبوعين.

يبدأ اختفاء الأعراض عادة بعد أيام قليلة، الاستخدام عدم المنتظم أو وقف

الاستخدام المبكر قد يسبب ظهور المرض من جديد، إذا لم يحدث أي تحسن

بعد أسبوع يجب استشارة الطبيب.

كاراسين:

كبار السن: لا توجد أي دلائل أن كبار السن بحاجة إلى جرعات خاصة. ولا

تؤخذ دلائل لظهور آثار جانبية لا تظهر عند المرضى الأصغر سنًا.

الأطفال:

لا يوصى باستخدام لاميزيل كريم في الأطفال أقل من ١٢ سنة وذلك لعدم

وجود دراسات طبية على هذا السن.

١٣. الآثار الجانبية المحتملة ل الكريم لاميزيل

قد يسبب لاميزيل بعض الأعراض المرضية مثل الأدوية لكنها لا تحدث

في جميع المرضى.

قد تظهر في موضع الدهان أعراض مرضية مثل الحكة أو تحسف الجلد أو

الآلم أو التهيج أو اضطرابات تصبغ الجلد أو الشعور بحرقان أو الحمام أو

تكون شفرين، ويجب تجنب هذه الأعراض غير الصادرة عن تفاعلات فرط

الحساسية، بما في ذلك الطفح الجلدي، وهو ما أفادت التقارير ظهوره في

حالات فردية وينطلب الوقف الفوري للعلاج. وقد يحدث تهيج للعينين بعد