

أوتريفيين

النشرة الدوائية المرفقة مع الدواء

أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١٪

بخاخ الأنف محدد الجرعة

تستعمل فطرات أوتريفيين لأنف وأوتريفيين ميتشول بخاخ محدد الجرعة عن طريق الأنف فقط
يطلق البخاخ محدد الجرعة ٠,١٤ مل في البخة الواحدة (١٤ - ملجم من زيلوميثازولين هيدروكلوريد).

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل بدء استعمال هذا الاحتوائها على معلومات تهتم.
استعمل هذا الدواء وفقاً وفق التعليمات الواردة في هذه النشرة أو وفق ما أخبرك به الطبيب أو الصيدلاني.
احفظ هذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مرة ثانية.
- إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو استشارة أخرى فاسأل الصيدلاني.
- إذا أصبت بأي آثار جانبية فتحدث إلى الطبيب أو الصيدلاني ويشمل هذا أي آثار جانبية محتملة غير واردة في هذه النشرة.
- يجب التحدث إلى الطبيب إذا لم تشعر بتحسن أو إذا شعرت بتفاقم حالتك.

محتويات هذه النشرة

١. ما هو أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١ وما هي دواعي استعماله؟
٢. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل استعمال أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١؟
٣. ما هي كيفية استخدام أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١؟
٤. الآثار الجانبية المحتملة
٥. كيفية تخزين أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١
٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

١. ما هو أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١ وما هي دواعي استعماله؟

يستخدم أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١ لعلاج عدة أنواع من نزلات البرد. ومع ذلك لا ينصح في فحش الأنف لما له من تأثير ضيق للأوعية يؤدي إلى إزالة احتقان الأنفية المخاطية في الأنف والحلق
ويسمح هذا التأثير للمرضى المصابين بنزلات البرد بالتنفس بسهولة عن طريق الأنف.
أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١ يسهل تدفق إفرازات التهاب الجيوب الأنفية.
في حالة التهاب الأنف الوسطى يساعد على عدم احتقان الغشاء المخاطي الأنفي البلعومي.
لتسهيل نظف الأنف.

يسري مفعول أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١ خلال بخاخ دقائق ويستمر لمدة ساعات.
- يُوصى بعدم استعمال أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١ لأكثر من أسبوع حيث يمكن أن يؤدي استعماله لفترة طويلة إلى تلف الأنفية المخاطية التهاب الأنف الناجم عن الأوبئة).

٢. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل استعمال أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١؟

- لا تستعمل أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١ في الحالات التالية:
 - إذا كنت لديك حساسية تجاه زيلوميثازولين أو جازه أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.
 - إذا أجريت لك مؤخراً جراحة عبر الأنف (جراحة مامغية من إجراءها من خلال الأنف أو الفم).
 - إذا كنت مصاباً بجلوكوما انسداد الزاوية (زيادة الضغط في العين).
 - إذا كنت مصاباً بالتهاب الأنف المزمن مع الجفاف الشديد في المرات الأخيرة (التهاب الأنف الحاد أو التهاب الأنف الصموري).
- إذا كنت تعاني من أي ما سبق فخير الطبيب أو الصيدلي نظراً لأن أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١ ليس مناسباً لك في هذه الحالات.

ب. تحذيرات واحتياطات

خُذت إلى الطبيب أو الصيدلاني قبل استعمال أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١ في حالة:

- إذا كنت مصاباً بارتفاع ضغط الدم.
- إذا كنت تعاني من مرض القلب، المرضى الذين يعانون من قترنة طويلة لديهم خطر متزايد من عدم انتظام ضربات القلب الطبيعي الشديد عند الخضوع للعلاج بالزيلوميثازولين
- إذا كنت مصاباً بفرط نشاط الغدة الدرقية (فرط الدرقية).
- إذا كنت تعاني من واد السكري.
- إذا كنت مصاباً بتضخم غدة البروستاتا (تضخم غدة البروستاتا).

EXP. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر يسري هذا التاريخ حتى إذا تم فتح العبوة.

حفظ الأوبئة بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

يجب أن لا يتم التخلص من الأوبئة عن خلال مياه الصرف أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأوبئة التي لا تحتاج إليها. فهذا من شأنه أن يحمي البيئة.

١. محتويات العبوة ومعلومات أخرى:

- ما محتويات أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١؟

على المادة الفعالة لتحتوي أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١ في زيلوميثازولين هيدروكلوريد. بخاخ الأنف محدد الجرعة ٠,١٤ مل في البخة الواحدة (١٤ - ملجم من زيلوميثازولين هيدروكلوريد).

يحتوي هذا المستحضر على المواد الإضافية التالية:
بنزلكونيوم كلورايد (مادة مضافة)، ثنائي ميرات فوسفات الصوديوم ثنائي الهيدروجين، فوسفات ثنائي الصوديوم غلديرات الهيدرات، كلوريد الصوديوم ثنائي صوديوم إيثيدنات، ليفوميتشول، سينبول، ستريولول.

يتم الخرج للمخرج حميد الأوكسيل (Cremophor RH 40). ماء مقطر.

- ما شكل أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١ وما محتوياته؟
بخاخ الأنف محدد الجرعة، راحة من البولاي إيثيلين عالي الكثافة مثبتة بمضخة جرعات مفاصلة المواد اللاصقة للمحلول، بولي إيثيلين منخفض الكثافة وبولي إيثيلين عالي الكثافة وبولي إيثيلين/بوليت وستايلين (ستييل) وفوهة بولي بروبيلين مغطاة وأقفي.

المحتويات: ١٠٠ مل
العلامات التجارية ملوكة أو مرخصة لصالح ج أس كيه.

صنع من قبل: جي أس كيه كوسيمور هيلث كير إس إيه آر إل نيون، سويسرا
الشركة المالكة: فو التسويق: جي أس كيه كوسيمور هيلث كير شوبر إيه جي سويسرا



تاريخ مراجعة Smpc: مايو ٢٠١١

تاريخ المراجعة: فبراير ٢٠١٢

- هذا الدواء عبارة عن منتج يؤخذ عن طريق الحقن ويحفظ استخدامه على نحو مخالف للتعليمات
للتعليمات.

- تجنب تعليمات الطبيب وطريقة الاستخدام والتعليمات الصيدلاني الذي باع لك الدواء بعناية.
العقبة.

- الطبيب والصيدلاني هما أهل الخبرة في مجال الأوبئة وفوائدها ومخاطرها.
- لا تقطع على العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.- لا تكرر نفس الوصفة الطبية دون استشارة طبيبك المالك.- احفظ جميع الأوبئة بعيداً عن متناول الأطفال.مجلس وزراء الصحة العرب
أخذ الصياغة العربية

العمر	الجرعة
أوتريفيين ميتشول ١, ٠, ٠١ مناسب فقط للبالغين والراهقين الذين تتراوح أعمارهم من ١٢ سنة فما فوق.	بخة واحدة في كل فحة أنف كجرعة حسب الحاجة. بحيث لا تزيد عن ٣ مرات يومياً. لمن الغرض استعمال آخر جرعة في اليوم قبل الخلود للنوم لفترة قصيرة.
١٠ - ١٢ سنة فما فوق	١٢ سنة فما فوق
١٢ سنة فما فوق	١٢ سنة فما فوق
١٢ سنة فما فوق	١٢ سنة فما فوق