

سينيكود

نقط

٠,٥ ٪ (وزن/حجم نقط الغم للأطفال)

للتناول عن طريق الفم فقط

التركيب:

يحتوي كل ١ مل (= ٢٢ نقطة) من سينيكود على:

المادة الفعالة: ٥ ملجم بوتاميرات سيترات
المواد الإضافية ذات التأثير المعروف: محلول سوربيتول ٧٠ ٪ (E-420)، إيثانول ٩٦ ٪
المواد الإضافية الأخرى: جليسيرول، وسكريين الصوديوم، حمض البنزويك (E-210) (مادة حافظة)، ورائحة الفانيليا، وهيدروكسيد الصوديوم بنسبة ٣٠ ٪، وماء مقطر

يرجى قراءة جميع تعليمات هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

احرص دائماً على استخدام هذا الدواء بالضبط كما هو موضح في هذه النشرة أو بالطريقة التي أخبرك بها الطبيب أو الصيدلي.
- احفظ هذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- توجه للصيدلي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو المشورة.
- في حالة حدوث **تأثير جانبي**، فاحذر الطبيب أو الصيدلي، وذلك يشمل أي آثار جانبية محتملة غير المذكورة في هذه النشرة.

في هذه النشرة:

١. ما هي نقط سينيكود وما دواعي استخدامها؟
٢. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل استخدام نقط سينيكود؟
٣. كيف تستخدم نقط سينيكود؟
٤. الآثار الجانبية المحتملة
٥. كيف تخزن نقط سينيكود؟
٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

١. ما هي نقط سينيكود وما دواعي استخدامها؟

* تستخدم لعلاج أعراض السعال ذات المصادر المختلفة

نقط سينيكود تسكن السعال، بما في ذلك السعال الغير مصاحب للبلغم، الناجم عن نزلات البرد، ويمكن أيضاً استخدام نقط سينيكود لعلاج نوبات السعال الحادة متعددة الأسباب بوصفة طبية فقط. يمكن استخدام نقط سينيكود بوصفة طبية مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وأكبر. ونظراً للمحتوى المنخفض للمادة الفعالة، فإنه غير مناسب للمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن ١٢ عاماً.

* يجب أخذ الآتي باعتبار:

- نظراً لأن نقط الغم سينيكود تحلى بالسكازين وال سوربيتول، فيمكن أيضاً إعطاؤها للأطفال المصابين بداء السكري

٢. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل استخدام نقط سينيكود؟

أ. تجنب استخدام نقط سينيكود في الحالات التالية:

- يعاني طفلك من حساسية تجاه مادة بوتاميرات سيترات أو تجاه أي من المواد الإضافية المغطاة وفقاً للتركيب
- يعاني طفلك الحساسية المفرطة للفركتوز (بسبب محتوى السوربيتول، ينتج السكر الفركتوز أثناء تحوله للأضحي)

ب. التحذيرات والاحتياطات

- إذا كان السعال لدى طفلك مصحوباً بالبلغم، أي أنه ينتج كمية كبيرة من المخاط، فيجب عليك استشارة الطبيب قبل إعطاء نقط سينيكود لطفلك. تعمل نقط سينيكود على إخماد منعكس السعال، الذي يعزز تآكل المخاط داخل الأنابيب القصية. مما يزيد من خطورة عدوى المسالك التنفسية (مثل التهاب الرئوي) وقد يؤدي هذا أيضاً إلى تقلص خطير في الأنابيب القصية (التهنق القصبي). وبالتالي يجب عدم إعطاء طفلك أية أدوية للسعال من شأنها تقليل لزوجة المخاط في الأنابيب القصية (الأدوية الطاردة للبلغم والأدوية اللدنية للبلغم) في نفس الوقت الذي تستخدم فيه نقط سينيكود
- بالنسبة للأطفال الأقل من سنتين، يجب عدم استخدام هذا الدواء إلا بوصفة من الطبيب
- يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة استمرار السعال لأكثر من ٧ أيام إذا ساءت الأعراض
- وإلا وصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة أو ظهور طلع جلدي أو صداع مستمر، فيجب استشارة طبيب لتأكيد وجود حالة مرضية أساسية إذا لزم الأمر.

- تحتوي كل ٥ نقط من هذا الدواء على ٧١ ملجم من السوربيتول. ويجب على المرضى الذين يعانون من مرض وراثي تادر المعروف بالحساسية المفرطة للفركتوز عدم تناول هذا الدواء.
- قد يسبب السوربيتول اضطراب إخراج الجهاز الهضمي ويكون له تأثير ملين.
- تحتوي نقط سينيكود على إيثانول (٢,٨١ ٪ ملجم/مل).
- يحتوي نقط سينيكود على أقل من مليون صوديوم (٣٣ ملجم) في الجرعة، مما يعني أنه تقريباً بدون صوديوم
- أخطر طبيك أو الصيدلي إذا كان طفلك يعاني من أي أمراض أخرى، أو حساسية أو يتناول أي أدوية أخرى أو يستخدمها خارجياً (عاً) في ذلك تلك التي يتم تناولها دون وصفة طبية)
- يجب أن يتجنب طفلك ركوب الدراجة على الطريق

ج. تناول الأدوية الأخرى:

يجب تجنب تناول أي دواء طارد للبلغم أو مذهب للبلغم بشكل مصاحب لهذا الدواء (انظر «التحذيرات والاحتياطات الخاصة بالاستخدام»).

لا تتوفر دراسات محددة بشأن التفاعلات، وبناءً على اعتبارات أساسية، لا يمكن استبعاد احتمالية زيادة تأثير المواد النشطة للجهاز العصبي المركزي والتي يتم تناولها تزامنياً مع هذا الدواء، بما في ذلك الكحول، حيث يعتقد أن آلية عمل كبت السعال تؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

د. الحيل والراحة الطبية والخصوية

تعد نقط سينيكود غير مناسبة لعلاج السعال لدى البالغين. إذا كنت حاملاً أو ترضعين طبيعياً، وقد تناولت هذا الدواء عن طريق الخطأ، فيجب إبلاغ الطبيب كإجراء احترازي

هـ. القيادة واستخدام الآلات

يمكن لنقط سينيكود أن تسبب التعب، وقد تؤثر على القدرة على القيادة وتشغيل الآلات. يجب أن يتجنب طفلك ركوب الدراجة على الطريق.

٣. كيف تستخدم نقط سينيكود؟

ما لم يذكر الطبيب خلاف ذلك:

ينبغي إعطاء نقط سينيكود للأطفال أقل من سنتين بناءً على وصفة طبية فقط.

الجرعة الموصى بها	الفئة العمرية
١٠ نقط ٤ مرات يومياً	الأطفال من عمر شهرين إلى سنة
١٥ نقطة ٤ مرات يومياً	الأطفال الصغار من سنة إلى ثلاث سنوات
٢٥ نقطة ٤ مرات يومياً	الأطفال أكبر من ٣ سنوات

- للتناول عن طريق الفم فقط
- لا تتجاوز الجرعة الموصى بها
- يبلغ الحد الأقصى لمدة العلاج دون وصفة طبية ٧ أيام
- يفضل تناوله قبل الوجبات.
- ينبغي استخدام أقل جرعة فعالة ولأقصر وقت ممكن

- إذا تناول طفلك نقط زائدة من سينيكود، فاحذر طبيبك على الفور.
- حافظ دائماً على إعطاء الجرعة وفقاً لهذه النشرة أو على النحو الذي يحدده الطبيب. إذا كنت تعتقد أن تأثير هذا الدواء ضعيف للغاية أو قوي للغاية، فتحدث إلى الطبيب أو الصيدلي.

تجاوز الجرعة

يمكن لتجاوز الجرعة من نقط سينيكود بشكل عارض أن يتسبب في الأعراض التالية: غثاس، وغثيان، وفي، وإسهال وفقدان التوازن وانخفاض ضغط الدم.
ويجب تقديم المساعدة الطارئة المعتادة: غسيل المعدة، الفحم المنشط، والمراقبة والعلاج اللازم للمؤلفات الحيوية. لا يوجد تفاعل محدد معروف.

يتم علاج الجرعة الزائدة حسب الحالة السريرية، وإذا لزم الأمر، بعد استشارة مركز مكافحة السموم القومي، حيثما أمكن.

٤. الآثار الجانبية المحتملة:

قد يؤدي استخدام نقط سينيكود إلى الآثار الجانبية التالية:
اضطرابات الجهاز العصبي: غير شائع (٠,٠١ - ١ ٪): دوام، غثاس ودوخة خفيفة
اضطرابات الجهاز الهضمي: غير شائع (٠,٠١ - ١ ٪): غثيان، وإسهال.
الجلد: نادر (٠,٠١ - ١ ٪): طفح، وحرق.

إذا لاحظت آثاراً جانبية غير موصوفة هنا، فيجب إخبار الطبيب أو الصيدلي.
٥. كيف تخزن نقط سينيكود؟
- يحفظ بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.
- لا يخزن في درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية يجب حمايته من الحرارة
- لا تستخدم الدواء بعد انتهاء مدة الصلاحية المذكورة على العبوة الخارجية والمصلق الداخلي
الدواء صالح حتى تاريخ يوم من شهر تاريخ انتهاء الصلاحية

٦. العبوة والمعلومات الأخرى:

نقط سينيكود محلول حلى شفاف عديم اللون برائحة الفانيليا

العبوة ٢٠ مل

يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات



العلامات التجارية مملوكة أو مرخصة لصالح شركة جي أس كيه

صنع من قبل: جي أس كي كونسيومير هيلث كير إين إيه آر إل، نيون سويسرا

الشركة المالكة لخن التسويق: جي أس كي كونسيومير هيلث كير شوايز إيه جي، سويسرا

تاريخ المراجعة: ديسمبر 2020
GDS ١٠.0 dated July 2018
SmpC date of revision August 2019

هذا الدواء

أ. هذا الدواء عبارة عن منتج يؤثر على صحته واستخدامه خلافًا لتعليمات يُعرضك الخطر.
ب. اتبع وصفة الطبيب وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي صرف الدواء بدقة.
ج. الطبيب والصيدلي هما أهل الخبرة بالدواء، وفوائده ومخاطره.
د. لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
هـ. لا تكرر العلاج دون استشارة الطبيب.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

يجس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيدالة العرب

NPA002250