

سينيكود خلال فترة الحمل إلا عند الضرورة بشكل واضح بناءً على استشارة الطبيب.

الرضاة

لم تتم دراسة مرور سينيکود في حليب الثدي، لذا ينبغي عدم استخدام المنتج خلال الرضاة الطبيعية.

هـ. القيادة واستخدام الآلات

يمكن لشراب سينيکود أن يسبب التعب، وقد يؤثر على القيادة وتشغيل الآلات. يتجنب طفلك ركوب الدراجة على الطريق.

٣. كيف يستخدم شراب سينيکود؟

ما لم ينصح الطبيب بخلاف ذلك:

يستخدم سينيکود شراب للأطفال من عمر ٣ سنوات وأكثر

الجرعة الموصى بها	الفترة العمرية
٥ مل ٣ مرات يومياً	الأطفال من ٣ إلى ٦ سنوات
١٠ مل ٣ مرات يومياً	الأطفال من ٦ إلى ١٢ سنوات
١٥ مل ٣ مرات يومياً	المراهقون من سن ١٢ إلى ١٨ عاماً
١٥ مل ٤ مرات يومياً	البالغون

- قم بمعايرة الشراب باستخدام المكيل المدرج المرفق بالدواء.

- قم بسطفه وتجفيف المكيل المدرج بعد كل استعمال وقبل أن يستخدمه شخص آخر.

- للتناول عن طريق الفم فقط

- لا تتجاوز الجرعة الموصى بها

- بيلغ الحد الأقصى لمدة العلاج دون وصفة طبية ٧ أيام

- يفضل تناوله قبل الوجبات.

- إذا تناول طفلك كمية زائدة من شراب سينيکود، فأخبر الطبيب على الفور

- ينبغي استخدام أقل جرعة فعالة وأقصر وقت ممكن.

- احرص دائمًا على إعطاء الجرعة وفقًا لهذه النشرة أو على النحو الذي يحدده الطبيب. إذا كنت تعتقد أن تأثير هذا الدواء ضعيف للغاية أو قوى للغاية، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي.

تجاوز الجرعة

يمكن لتجاوز الجرعة من شراب سينيکود بشكل عارض أن يتسبب في الأعراض التالية: التاعس، والغثيان، والقيء، والإسهال،

وفقدان التوازن، وانخفاض ضغط الدم. ويجب تقديم المساعدة الطارئة المعتمدة: غسيل المعدة، الفحص المنتشط، والمراقبة، والعلاج

اللازم للوظائف الحيوية. لا يوجد ترافق محدد معروف. يتم علاج الجرعة الزائدة حسب الحالة السريرية، وإذا لزم الأمر، بعد استشارة مركز مكافحة السموم القومي، حيثًا أمكن.

٤. الآثار الجانبية المحتملة:

قد يؤدي استخدام شراب سينيکود إلى الآثار الجانبية التالية: اضطرابات الجهاز العصبي: غير شائع (١٪ إلى ١٠٪): دوران وغثاء ودوخة خفيفة.

اضطرابات الجهاز الهضمي: غير شائع (١٪ إلى ٠٪): غثاء وإسهال.

الجلد: نادر (٠٪ إلى ١٪): الطفح، الشرى.

إذا لاحظت آثارًا جانبية غير موصوفة هنا، فيجب إخبار الطبيب أو الصيدلي.

٥. كيف تُخزن شراب سينيکود؟

- يحفظ بعيدًا عن متناول ونظر الأطفال.

- لا يذخن في درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية يجب حمايته من الحرارة.

- لا تستخدم الدواء بعد انتهاء مدة الصلاحية المذكورة على العبوة الخارجية والملصق الداخلي.

الدواء صالح حتى آخر يوم من شهر تاريخ انتهاء الصلاحية.

٦. العبوة والمعلومات الأخرى:

شراب سينيکود شراب مُحل شفاف عديم اللون براحة الفانيلا

العبوة ٢٠٠ مل يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات

صنع من قيل: جي أنس كي كونسيومر هيلث كير أنس إيه أر إل، نيون سويسرا.

الشركة المالكة لحق التسويق: جي أنس كي كونسيومر هيلث كير شوبيز أيه جي سويسرا.

العلامات التجارية مملوكة أو مرخصة لصالح جي أنس كيه

٢٠٢٠ تاريخ المراجعة: يونيو

GDS v1.0 dated July 2018

SmpC date of revision August 2019

هـ. الدواء

أ. هذا الدواء عبارة عن منتج يؤثر على صحتك واستخدامه خلافاً للتعليمات يُعرضك للخطر.

ب. اتبع وصفة الطبيب وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي صرف الدواء بدقّة.

ج. الطبيب والصيدلي هما أهل خبرة بالدواء وفوانده ومحاطوه.

د. لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

هـ. لا تكرر العلاج دون استشارة الطبيب.

يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيادلة العرب

شراب ١٥٪ وزن/حجم شراب

للتناول عن طريق الفم فقط

التركيب:

يحتوي كل ٥ مل من شراب سينيکود على:

المادة الفعالة ٧٪، ملجم بوتاميرات سيرترات

المواد الإضافية ذات التأثير المعروفة: محلول سوربيتول ٪٧٠، إيثانول ٪٦٠

المواد الإضافية الأخرى: جليسبرول، وساكرين الصوديوم، ومحضر البنزويك (E210)، ورانحة الفانيلا

وهيدروكسيبيد الصوديوم (أضبيط pH) وماء مقتدر

يرجى قراءة جميع محتويات هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

احرص دائمًا على استخدام هذا الدواء بالضبط كما هو موضح في هذه النشرة أو بالطريقة التي أخبرك بها الطبيب أو الصيدلي.

- احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

- توجه للصيدلي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو المنشورة.

- في حالة حدوث أي آثار جانبية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي.

- وذلك يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة.

في هذه النشرة

١. ما هو شراب سينيکود وما هي دواعي استخدامه؟

٢. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل استخدام شراب سينيکود؟

٣. كيف يستخدم شراب سينيکود؟

٤. الآثار الجانبية المحتملة؟

٥. كيف تُخزن شراب سينيکود؟

٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

١. ما هو شراب سينيکود وما هي دواعي استخدامه؟

* يستخدم لعلاج عراض السعال ذات المصادر المختلفة

شراب سينيکود يسكن السعال، بما في ذلك السعال الغير مصاحب

للنفم، الناجم عن نزلات البرد. ويمكن أيضًا استخدام شراب سينيکود لعلاج نوبات السعال الحادة متعددة الأسباب بوصفة طبية فقط.

- يمكن استخدام سينيکود شراب للأطفال من عمر ٣ سنوات وأكثر.

* يجبأخذ الآتي بالاعتبار:

- التدخين يجعلك تُشعّل، لذا بإمكانك دعم تأثير شراب سينيکود

عن طريق الإقلاع عن التدخين.

- نظرًا لأن الشراب مُحل بالساكرين والسوربيتول، فيمكن

أيضًا تناوله لدى المصابين بداء السكري.

٢. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل استخدام شراب سينيکود؟

أ. تجنب استخدام سينيکود شراب في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه مادة بوتاميرات سيرترات أو

تجاه أي من المواد الإضافية المعطاة وفقًا للتركيب.

- تعاني أنت أو طفلك من مرض وراثي (نادر) المعروف

بالحساسية المفرطة للفركتوز، مما يؤثر على التمثيل

ال الغذائي للسكر. ونظرًا لأن الشراب مُحل، فإنه يحتوي على سوربيتول، وهو سكر ينتاج الفركتوز عند هضمه.

ب. التدابير والاحتياطات

- إذا كان السعال لديك أو لدى طفلك مصحوباً ببلغم، أي أنه

ينتج كمية كبيرة من المخاط، فيجب عليك استشارة الطبيب

قبل تناول شراب سينيکود. يعلم شراب سينيکود على إخراج

منعكس السعال، الذي يعزز تراكم المخاط داخل الأنابيب

القصبية. مما يزيد من خطورة عدوى المسالك التنفسية (مثل

الانفلونزا الرئوي) وقد يؤدي هذا أيضًا إلى تقصّص خطير في

الأذيليب القصبية (التشنج القصبي). وبالتالي يجب عليك عدم

تناول أي أدوية للسعال من شأنها تقليل لزوجة المخاط في

الأذيليب القصبية (الأدوية الطاردة للبلغم والأدوية المذيبة

للبلغم) في نفس الوقت الذي تتناول فيه شراب سينيکود.

- يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة استمرار السعال

لأكثر من ٧ أيام أو إذا ساءت الأعراض وأو صاحبها ارتفاع

في درجة الحرارة أو ظهور طفح جلدي أو صداع مستمر، فيجب

استشارة طبيب لتحديد وجود حالة مرضية أساسية إذا لزم الأمر.

- يحتوي شراب سينيکود على ٢٨٪ ملجم من السوربيتول في كل

مل. السوربيتول هو مصدر للفركتوز. ويجب على المرضى

الذين يعانون من مرض وراثي نادر مصابون بداء مرضي بالحساسية

المفرطة للفركتوز عدم تناول هذا الدواء. قد يسبب السوربيتول

اضطرابات الجهاز الهضمي ويكون له تأثير ملén.

- يحتوي شراب سينيکود على إيثانول (١١٪٧٣٪).

- يحتوي نفط سينيکود على أقل من ١ مل مول صوديوم (٣٪).

- أكبر طبيب والصيدلي إذا كنت أنت أو طفلك تعانين من أي

أمراض أخرى، أو حساسية أو إذا كنت أنت أو طفلك تتناولن

أي أدوية أخرى تستخدمانها خارجيًا. (بما في ذلك التي

يتم تناولها دون وصفة طبية).

- يجب أن يتجنب طفلك ركوب الدراجة على الطريق

ج. تناول الأدوية الأخرى:

يجب تناول أي دواء طارد للبلغم أو مذيب للبلغم بشكل مصاحب لهذا

الدواء (انظر «التدابير والاحتياطات الخاصة بالاستخدام»).

لا تتوفر دراسات محددة بشأن التفاعلات. وبناءً على اعتبارات

الحساسية، لا يمكن استبعاد احتمالية زيادة تأثير الماد المثبتة

للجهاز العصبي المركزي والتي يتم تناولها تزامنًا مع هذا الدواء،

ما في ذلك الكحول حيث يُعتقد أن آلية عمل كيت السعال تؤثر

على الجهاز العصبي المركزي.

د. الحمل والرضاة الطبيعية

إذا كنت حاملاً أو ترضعين طبيعياً، فيجب عدم تناول شراب

سينيکود خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

لم يتم تقييم سلامة استخدام أثناء الحمل والرضاة في دراسات

محددة.

الحمل

ينبغي تجنب استخدام شراب سينيکود خلال الأشهر الثلاثة الأولى

من الحمل.

وقد أظهرت الدراسات الإنجليزية على الحيوانات عدم وجود أي

خطر على الجنين. إلا أنه لم يتم إجراء أي دراسات خاصة

للمرأة على النساء الحوامل. وبالتالي لا يوصى بتناول شراب