

أتوزيت أقراص مغلفة 10/10 ملغم

أتوزيت أقراص مغلفة 20/10 ملغم

أتوزيت أقراص مغلفة 40/10 ملغم

أتوزيت أقراص مغلفة 80/10 ملغم

إيزيتيميب وأتوفاستاتين

اقرأ كامل هذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ في استخدام هذا الدواء، فهي تحتوي على معلومات هامة بالنسبة إليك.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى الأطلاع عليها مجددًا.

- استشر طبيبك أو الصيدلي إن كانت لديك آية شديدة ضيق.

- وصف هذا الدواء لك وجذب، فلا تتعطى لآخرين؛ لأنه قد يضرهم حتى لو كانت لديهم نفس العلامات المرضية التي تعاني منها.

- إذا أصبت بأية آثار جانبية، فتحدد إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك. يشمل ذلك آية آثار جانبية محتملة لم ترد في هذه النشرة.

معلومات هذه النشرة

1. ما هو عقار أتوزيت وفيما يستخدم؟

2. المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل استخدام عقار أتوزيت

3. كيفية تناول عقار أتوزيت

4. الآثار الجانبية المحتملة

5. كيفية تخزين عقار أتوزيت

6. معلومات البرءة ومعلومات إضافية

6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية

محتويات عقار أتوزيت
المواد الفعالة هي إيزيتيميب وأتوفاستاتين، يحتوي كل قرص مغلف على 10 ملغم من الإيزيتيميب و 10 أو 20 أو 40 أو 80 ملغم من الأتوفاستاتين (في هيئة أتوفاستاتين كالسيوم ثلاثي الهايدرات).

المكونات الأخرى: كربونات كالسيوم، سيليكا غروية لامانية؛ كروس كاربليز الموسوب؛ هيدروكسي بروبيل السليوز؛ لاكتوز أحادي الدهن؛ ستيرات الماغنيسيوم؛ بليلوز حرق القبار؛ بولي سوربات 80؛ بوفيفون؛ لوريل سلفات الموسوب.

يحتوي علاج الفصوص على: هيدروميوز، ماكروجلول 8000، ثانى أكسيد التيتانيوم (E171)، ثالث.

شكل عقار أتوزيت ومحظى المبرأة

أقراص مقلدة لها بياض إلى بيج إلى أصفر على شكل كبسولة ممدبة من الجهيدين.

أقراص أتوزيت 10/10 ملغم: 257[°] محفورة على جهة واحدة.

أقراص أتوزيت 20/10 ملغم: 333[°] محفورة على جهة واحدة.

أقراص أتوزيت 40/10 ملغم: 337[°] محفورة على جهة واحدة.

أقراص أتوزيت 80/10-لغز: 357[°] محفورة على جهة واحدة.

أجمالي العبوة:

عبوات تحفيظ على 10 (10×1) و 30 (10×3) و 90 و 100 قرص مغلف في شرائط مصنوعة من الألومنيوم/الألومنيوم المنخفض بالفينيلوجين (حوفيق من عديد الأميد الموجة/الألومنيوم)؛ كلوريد عديد الفينيل مع غطاء من الألومنيوم.

عبوات تحفيظ شريحة واحدة من 1 أر 45 فرمتاً متفقاً في جرعت مفردة، ضمن ساراخ مصنوعة من الألومنيوم/الألومنيوم المنخفض بالفينيلوجين (حوفيق من عديد الأميد الموجة/الألومنيوم). كلوريد عديد الفينيل مع غطاء من الألومنيوم.

قد لا يتم تسويق جميع الأشكال والتركيزات.

الشركة المالكة لحقوق التسويق والشركة المصنعة والشركة المصدرة للشريحة:

إن.في. أورجانون.

كولستيرات 5349، اي بي اوس.

ص.ب. 204، 5340، اي بي اوس،

هولندا

الشركة المصنعة:

ام ادنى اينثانثيول جي بي ايش (فرع بورنوريكو) ال آل سي،

بريديك اندستريول بارك، ستيفن ود 183،

00771 لاس بيراس، بورنوريكو

الشركة المصدرة للشريحة:

ميرك شارب آند دوم بي، في.

وارنر بريج 39

2031 بي هارلين

هولندا

تم آخر مراجعة لهذه النشرة في يونيو 2023.

© مجموعة شركات أورجانون. جميع الحقوق محفوظة.

إن هذه الدواء

- استحضر بواشر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بوصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنسوص عليها وتليمي الصيدلي الذي ي开具 الدواء.
- لا توقف العلاج من ققاء نفسك.
- لا تكرر وصف الدواء بلا استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

ORGANON

تناول عقار أتوزيت مع الأطعمة والكموليات

أنظر قسم 3 للاطلاع على تليمي حول تناول عقار أتوزيت. تجد الإشارة إلى ما يلى:

عصير الجريب فروت لا تتناول أكثر من كوب واحد أو كوبين صغيرين من عصير الجريب فروت في اليوم؛ لأن هذا العصير يكتسب كثافة يوثر على مفعول

أغذية أخرى، مما يزيد من انتشاره.

الكموليات لا تسرف في شرب الكحوليات أثناء تناول هذا الدواء، التفصيل، انظر قسم 2 "تحذيرات واحتياطات".

الحمل والرضاعة لا تتناول عقار الكحوليات أثناء تناول هذا الدواء، التفصيل، انظر قسم 2 "تحذيرات واحتياطات".

لا تتناول عقار الكحوليات أثناء تناول هذا الدواء، التفصيل، انظر قسم 2 "تحذيرات واحتياطات".

أغذية طيبة لا تتناول عقار أتوزيت إذا كنت حاملة أو تجاويني الإنجاب أو تعتقدين أنه قد تكونين حاملة، لا تتناول عقار أتوزيت إذا كنت قارئة على

العمل إلا إذا كنت تستعمل سائل موئنة لمنع الحمل، في حال أسيحيت حاملة أثناء تناول عقار أتوزيت، توقيع على تناول على الفور

وأخير طيبة.

لا تتناول عقار أتوزيت إذا كنت مثقبة إلى بياض إلى أصفر على شكل كبسولة ممدبة من الجهيدين.

أقراص أتوزيت 10/10 ملغم: 257[°] محفورة على جهة واحدة.

أقراص أتوزيت 20/10 ملغم: 333[°] محفورة على جهة واحدة.

أقراص أتوزيت 40/10 ملغم: 337[°] محفورة على جهة واحدة.

أقراص أتوزيت 80/ـلغز: 357[°] محفورة على جهة واحدة.

أجمالي العبوة:

عبوات تحفيظ على 10 (10×1) و 30 (10×3) و 90 و 100 قرص مغلف في شرائط مصنوعة من الألومنيوم/الألومنيوم المنخفض

بالفينيلوجين (حوفيق من عديد الأميد الموجة/الألومنيوم)؛ كلوريد عديد الفينيل مع غطاء من الألومنيوم.

عبوات تحفيظ شريحة واحدة من 1 أر 45 فرمتاً متفقاً في جرعت مفردة، ضمن ساراخ مصنوعة من الألومنيوم/الألومنيوم.

قد لا يتم تسويق جميع الأشكال والتركيزات.

فأصلل به قل الذهن على تناول هذا المنتج الدوائي.

أتوزيت يحتوي على الصوديوم يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ملليمول سوديوم (23 ملغم) لكل قرص، وهذا يعني بشكل أساسي "خل من الصوديوم".

3. كيفية تناول عقار أتوزيت

تقدر دosis بجرعات الطبيب بعد تناول هذا الدواء، طبيبك هو من يحدّد تركيز الدواء المطلوب بالنسبة إليه، على ضوء العلاج الحالي الذي

تنفسه وعامل الخطير الخاص بك، تحقق أن طبيبك أو الصيدلي في حال راوحت أيام شوك.

* قلب الذهن في تناول عقار أتوزيت، يجب أن تتابع نظام غذائي خالص للكوليسترون.

* ينصح أن تستمتع في اتباع نظام غذائي خالص للكوليسترون أثناء تناول عقار أتوزيت.

الجرعة الموصى بها إن العرجمة الموصى بها من عقار أتوزيت هي قرص واحد من طبق الموصى بها.

موعده تناول الدواء

تناول عقار أتوزيت في أي وقت من النهار، مع الطعام أو بدون.

إذا وصفت الطبيب أو أتوفاستاتين أو كوليسترون في جرعة مفردة، من عقار أتوزيت على الفور أو

تناول عقار أتوزيت قبل تناول عقار أتوزيت في موعدها في اليوم التالي.

استمر طبيبك أو الصيدلي إذا كانت لديك آية استهلاك حوصل على ماء.

4. الآثار الجانبية المحتملة

على غرار الأدوية كافة، يمكن لعقار أتوزيت أن يتسبب في بعض الآثار الجانبية، مع العلم أنها لا تصيب الجميع.

إذا بدأ علك أيًّا من الآثار أو أعراض أتوزيت التي تختلف عن ترتكز العادة، توقف تناول هذا الدواء وأخبر طبيبك على الفور أو

توجه إلى قسم الطوارئ أو أقرب مستشفى اليك.

نفخات حساسية خطيرة تتسبب في توڑم الوجه واللسان والحلق، مما يتسبب صعوبة كبيرة في التنفس.

مرض زهري مصروف بتقرير أو تقرير شديد للجلد، وظهور بثور على الجلد والغشاء المخاطي والعينين والحنين، يتحول إليها إلى تبور

دفع زهري تعلق بالجلد أو الورن الأحمر خاصة في باطن البطن أو العضلات، مما يؤدي إلى تقرير شحصي على علاج جيد.

ضعف العصب المحيي، أيلام، الم أو تعرق أو بول Leone أحمر مثل البني، خاصة إذا شعرت في نفس الوقت بعياء أو بحمى شديدة، فهي

اعراض تتمحّل بجهلها تماماً في ذلك المقطع العدلي، الاضطرابات في الفاصل والتغيرات على خلايا الدم.

متلازمة شبه بالذنبية (ما يدعى علاج المهدى، الاضطرابات في الفاصل والتغيرات على خلايا الدم)

عليك استشارة طبيبك في أقرب وقت ممكن في حال التعرض لمشاكل مع تزف أو تكميم غير متوقع أو غير اعتيادي؛ لأن تلك الأعراض قد

تثير إلى مشكلة في الكبد.

تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية (قد تصيب حتى 1 من كل 10 أشخاص):

• إسهال

• ام بالغضارات

تم التبلغ عن الآثار الجانبية التالية (قد تصيب ما يبلغ من 1 من كل 100 شخص):

• الإلتهاب

• اكتئاب؛

• دوخة؛ صداع، احساس بالغثيان

• تباطؤ ضربات القلب

• هشاشة ساقية

• ضيق نفهي

• الم في البطن، انتفاخ؛ إمساك؛ عسر هضم؛ غازات؛ تمعط مثكر؛ التهاب المعدة؛ غثيان؛ ازدحام بالمعدة

• جب شباب، ترقى

• الم بالغقول، إيلام، الم أو تعرق أو بول Leone أحمر مثل البني، خاصة إذا شعرت في نفس الوقت بعياء أو بحمى شديدة، فهي

ارتفاع تناول بعض تحاليل الدم التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

ارتفاع تناول بعض تحاليل الماء التي تقيس وظائف الكبد

<p