

فولتارين®

١٢ إيمجل ١٢ ساعة

دايكلوفيناك داي ايثايل أمين



إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، فأخبر طبيبك أو الصيدلي.

١. كيف يتم تخزين فولتارين إيمجل 12 ساعة؟

- يُحفظ عند درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.
- احتفظ بهذا الدواء بعيدًا عن متناول ونظر الأطفال.
- لا تستعمل فولتارين إيمجل 12 ساعة بعد انتهاء مدة الصلاحية المبينة على الصندوق والعبوة.

التحذيرات والاحتياطات:

- يجب لا يتم وضع فولتارين إيمجل 12 ساعة على الجروح المفتوحة (مثل الخدوش والشقوق) أو على البشرة المتضررة (المصابة بالأكريما أو الطفح الجلدي).
- توقف العلاج فورًا إذا ظهر طفح جلدي بعد استخدام المنتج.
- لا يستخدم أكثر من الجرعة المحددة أطول.
- يمكن استخدام الدعامة أو الأغطية المستخدمة بشكل شائع للإصابات مثل الآلتاء، ولكن لا تستخدمه تحت الضمادات المحكمة (البلاستيكية).
- تجنب الامتناع للعين والأغشية المخاطية.
- إذا ابتلع إيمجل عن طريق الخطأ أو إذا ابتلع طفل، فبلغ طبيبك فورًا.
- يمكن لبعض المرضى أن يعانون من تهيج موضعي طفيف في الجلد بسبب احتواء فولتارين إيمجل على البروبيلين غليكول أو بنزوات البنزيل.
- أبلغ طبيبك أو الصيدلي إذا إذا واجهت أي تفاعلات تحسسية بعد استخدام أي منتجات مماثلة (مراهم مضادة للالتهاب، أو عานيت من مرض آخر أو حساسية، أو في حال كنت تستخدم أو تتناول أدوية للاستعمال الداخلي أو الخارجية) (مافي ذلك أدوية العلاج الدائري).
- تجنب الامتناع للعين والأغشية المخاطية في حالة دخول المنتج في عينك، اشطف العين جيدًا بالماء الجاري. أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من اضطرابات مستمرة.

للأشخاص، إسأل الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال فولتارين إيمجل 12 ساعة.

استعمال الأدوية الأخرى مع فولتارين إيمجل 12 ساعة:

ينبغي إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل أو استعملت أي دوائية أخرى مؤخرًا، بما في ذلك الأدوية التي تستعمل دون وصفة طبية.

الحمل والرضاعة الطبيعية:

يجب عدم استخدام فولتارين إيمجل 12 ساعة أثناء الأشهر الثلاثة الأولى أو الثانية من الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعية، إلا بوصفة طبية رسمية من الطبيب. يجب عدم استخدام فولتارين إيمجل 12 ساعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، فقد يضر بالجنين أو يسبب مشاكل عند الولادة.

يجب استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء إذا كنت تخطفين للحمل.

في حالة دواعي الاستعمال القاهرة، لا ينبغي استخدام فولتارين إيمجل على الصدر أو على مساحات كبيرة من الجلد لفترة طويلة.

تأثير العناصر الأخرى (المسواغات):

- يحتوي فولتارين إيمجل 12 ساعة على:
- بروبيلين غليكول وهو قد يؤدي إلى بعض تهيج الجلد الموضعي لبعض المرضى.
- بيوتايل هيدروكسى تولوين الذي قد يؤدي إلى تفاعلات موضعية في الجلد (التهاب الجلد التماسي) أو تهيج العينين والعشاء المخاطي.

٦. ماذا يوجد في العبوة وما هي المعلومات الإضافية؟

يحتوي فولتارين إيمجل 12 ساعة على المادة الفعالة هي دايكلوفيناك داي اتيل أمين. وكل جرام من الجل يحتوي

على 23.2 ملجم من دايكلوفيناك داي اتيل أمين والعناصر الأخرى (المسواغات) هي بيوتايل هيدروكسى تولوين، وكربومير، وكوكوكيل كاربوليوكابريليت، داي اتيل أمين، وكحول إيسوبروبيل، وبرافين سائل، وإيث سيتيريل ماكرو-غول، وكحول أوليل، وغليكول بروبيلين، وعطر ايوكاليفوس استنق، ومياه نقية.

ماذا يشبه فولتارين إيمجل 12 ساعة ومتىويات العبوة؟

فولتارين إيمجل 12 ساعة أبيض اللون أو يميل إلى البنيان، وهو عبارة عن جل شبيه بالكريم وغير دهنی وغير ماطخ. يأتي المستحضر في عبوات مختلفة الحجم؛ 50 و 100 و 150 جم، وقد لا تتوفر بعض أحجام العبوات في بعض الأسواق.

صنف من قبل:

جي اس كي كونسيومر هيلث كير اس ايه ار، نيون، سويسرا. الشركة المالكة لحق التسويق: جي اس كي كونسيومر هيلث كير شوايز ايه جي، سويسرا.

العلامات التجارية مملوكة / مرخصة لصالح مجموعة شركات جي اس كي تمت مراجعة هذه النشرة في يونيو 2021 GDSV3-2021 بناءً على النشرة المعتمدة في بلد المنشأ بتاريخ أبريل 2019

(هذا المستحضر دواء)

أ. الدواء متوج يُؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتوجيهات يعرضك للخطر.

ب. اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرف الدواء لك.

ج. الطبيب والصيدلي هما الخبريان بهذا الدواء ونفعه ومخاطرها.

د. لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تقاء نفسك.

هـ. لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب، اتحاد الصيادلة العرب

اقرأ هذه النشرة بالكامل وبمعنوي لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

دائماً استعمل فولتارين إيمجل 12 ساعة تماماً كما هو موضوع في

النشرة، أو حسب تعليمات الصيدلي. ويجب المتابعة مع الطبيب أو

الصيدلي إذا كنت غير متراكك من مرتقاً من طفولة الاستعمال.

• هذا الدواء متوفّر بدون وصفة، ولكن ما زالت هناك حاجة لأن تستخد

فولتارين إيمجل 12 ساعة بدقة لتقليل افضل النتائج. وحسب ما هو

خطّط يتم تحديث هذه النشرة بشكل منتظم بأحدث المعلومات عن الدواء.

نأمل الرجوع إلى التاريخية حيث إنك قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• احتفظ بهذه النشرة حيث إنك قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• للمزيد من المعلومات أو النصائح، اشتُر الصيدلي.

• لا بد من مراجعة الطبيب إذا عانيت أعراض المرض أو لم تحسن بعد

7 أيام من الاستعمال.

• إذا عانيت لأعراض جانبية مزعجة حتى لو لم تكن مدرجة في هذه

النشرة، فبلغ الطبيب أو الصيدلي.

تحتوي هذه النشرة على المعلومات التالية:

١. ما هو فولتارين إيمجل 12 ساعة وما دواعي استعمال؟

٢. ماذا يجب أن تعرف عن فولتارين إيمجل 12 ساعة وما دواعي استعمال؟

٣. كيف يتم استخدام فولتارين إيمجل 12 ساعة؟

٤. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

٥. كيف يتم تخزين فولتارين إيمجل 12 ساعة؟

٦. ماذا يوجد في العبوة وما هي المعلومات الإضافية؟

٧. ما هو فولتارين إيمجل 12 ساعة وما دواعي استعمال؟

يحتوي فولتارين إيمجل 12 ساعة على المادة الفعالة دايكلوفيناك والتي تتبع إلى مجموعة الأدوية غير الستيرويدية والمضادة للالتهابات (NSAIDs). وقد تم تصديره بشكل خاص ليسمح على الجلد ب penetration المفترض له على النهاية غير الجلد.

يُستخدم فولتارين إيمجل 12 ساعة لتسكين الألم وتخفيف التهاب والتورم في العديد من الحالات التي تؤثر على المفاصل والعضلات.

يمكن استعمال فولتارين إيمجل 12 ساعة في علاج:

• إصابات الأوتار والأربطة والغضارات والمفاصل، مثل الآلتاءات.

والخدمات والإجهاد أو الالم الظاهر نتيجة ممارسة الرياضة أو الحوادث.

• أشكال موضعية من الروماتيزم لا تتشكل المفاصل، مثل التهاب الأوتار (مرفق النسخ) أو تقلازمة الكتف واليد أو التهاب الكيس الزالالي أو

التهاب حوانن المفصل.

• ولعلاج أعراض هشاشة العظام للمفاصل الصغيرة والمتوسطة الحجم

القريبة من الجلد مثل مفاصل الصاعب أو الركبتين.

• فولتارين إيمجل 12 ساعة مخصوص للاستخدام مع البالغين والمرأهقين

الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاماً وما فوق.

٢. ماذا يجب أن تعرف عن فولتارين إيمجل 12 ساعة؟

لا تستخدم فولتارين إيمجل 12 ساعة إذا:

• كنت تعاني من حساسية فقطن المحسنة (دايكلوفيناك أو كنت تتناول دواء آخر للألم أو العصارة أو الالتهاب كالآسيبوروفين وإسيتيل سالسييليك أسيد) (تشتخدم أيضًا كمادة تقي من تجلط الدم) أو أي من مكونات هذا الدواء. أسلال الطبيب أو الصيدلياتي في حال عدم التأكد.

قد تتضمن أعراض المفعول المعاكس ما يلي:

• صفير عند التنفس أو ضيق في الصدر (ربو) صعوبات في التنفس

• طفح جلدي متراقص بحذوب أو بثور

• انفاس الوجه أو اللسان

• سيلان الأنف

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض فلا تستخدم فولتارين إيمجل 12 ساعة. إذا لم تتحسن أعراض الألم والتورم في غضون 7 أيام، أو

إذا كانت تزداد سوءاً، فأخبر طبيبك.

• يجب عدم استخدام فولتارين إيمجل 12 ساعة خلال الأشهر الثلاثة

أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية".

ماذا تفعل عند استعمال كمية من فولتارين إيمجل 12 ساعة أكثر مما

ينبغى

في حال نسيت استعمال فولتارين إيمجل 12 ساعة عن الوقت المقرر، قم

باستخدامه عند تذكره ثم استمر حسب المعتاد، ولا ينبغى استعمال كمية

الมากة بغير التوعير عن العادة الفعلية.

للمزدوج من الاستفسارات عن كيفية استخدام المنتج، اشتُر الطبيب أو

الصيدلي.

٣. كيف يتم استخدام فولتارين إيمجل 12 ساعة؟

استخدم هذا الدواء دائمًا كما هو موضح في هذه النشرة بالضبط أو كما

أوصى الصيدلي. ويجب مراجعة طبيبك أو الصيدلي في حالة وجود أي شك.

جرعة فولتارين إيمجل 12 ساعة بالنسبة للبالغين

والمراهقين فوق 12 عاماً.

ضع فولتارين إيمجل 12 ساعة مرتين يومياً (صباحاً ومساءً) على المنطقة

التي تؤلمك، وسيستمر تأثيره في تخفيف الألم لمدة تصل إلى 12 ساعة.

لم يثبت أن استخدام فولتارين إيمجل 12 ساعة في الأطفال دون سن 12 عاماً آمن. لذلك، لا ينصح باستخدامه في هذه الفئة العمرية.

كيفية العلاج باستخدام فولتارين إيمجل 12 ساعة

1. لإزالة الغطاء الداخلي المحكم قبل أول استخدام، قم بفك الغطاء وفصله.

ثم استخدم الجانب الآخر من الغطاء لتفصيل الغطاء الداخلي المحكم

وفصله عن الآسيبور.

2. اضغط برق المحصل على كمية صغيرة من الجل من الأنثروب وقم

بالدهن بلف على المنطقة المصابة. تعمد الكمية المطلوبة على حجم

المنطقة المولدة: 2 إلى 4 جرامات (كمية تراوح في حجم جهة الكرز أو

الجوز) من الجل تكفي لعلاج مساحة حوالي 400-800 سم².

3. أغلب بيتك بعد التدليك بالجل، ما لم تكون الإصابة في يديك، لتجنب

لامساتك بشكل غير مقصود للجسم والعنق.

فولتارين إيمجل 12 ساعة هو جل للاستخدام الخارجي فقط.

فترقة العلاج باستخدام فولتارين إيمجل 12 ساعة

لا تستخدم فولتارين إيمجل 12 ساعة لأكثر من 14 يوماً بالنسبة لإصابات

الأنسجة الرخوة واللينة أو الروماتيزم. لا ينبغى استخدام فولتارين إيمجل

12 ساعة على مساحات كبيرة من الجلد لفترة طويلة، ما لم يوصي الطبيب بذلك. قد يوصي الطبيب بالعلاج لمدة أطول.

٤. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

يمكن أن ينبع استخدام فولتارين إيمجل 12 ساعة في الآثار الجانبية

التالية: في حالات نادرة إلى نادرة جدًا، قد تكون الآثار الجانبية خطيرة.

توقف عن استخدام فولتارين إيمجل 12 ساعة وأخبر طبيبك على الفور

في الحالات التالية:

• حدوث طفح جلدي مع ظهور بثور أو شرى

• صفير عند التنفس أو ضيق في الصدر (ربو)

• تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

• الآثار الجانبية التالية تكون عادةً خطيرة ومؤقتة:

• شائعة: طفح جلدي، حكة، احرار، حرقان في الجلد.

• في حالات نادرة جدًا، قد يكون الجلد أكثر حساسية لل الشمس. أعراض هذه

الحساسية المتزايدة للجلد هي حرائق الشمس مع الحكة والتورم والتقرح.