

Dupixent® 300 ملغم

محلول للحقن في محلقة معبة مسبقة

دوبيكسنت

دوبيكسنت دوبيوكسنت

ماذا تحتوي هذه النشرة

1. ما هو دوبيكسنت وما هي دواعي استعماله

2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل استعمال دوبيكسنت

3. كيف يُستعمل دوبيكسنت

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

5. كيف يحفظ دوبيكسنت

6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى



دوبيوكسنت

1. ما هو دوبيكسنت وما هي دواعي استعماله

2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل استعمال دوبيوكسنت

3. كيف يُستعمل دوبيكسنت

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

5. كيف يحفظ دوبيكسنت

6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

ما هو دوبيوكسنت

يحتوي دوبيوكسنت على المادة الفاعلة دوبيلومام.

دوبيلومام هو جسم مضاد أحادي المنشأ (نوع من البروتين المتخصص) يحصر

عمل بروتين يُسمى 4-1A و 13-1A

ويلعب دورًا رئيسيًا في التسبيب بالتهاب

والتهاب الجذور المزمن مع داء السلاط

الأفني.

ما هي دواعي استعمال دوبيوكسنت

يُستخدم دوبيوكسنت لعلاج البالغين

والراهقين في عمر 12 سنة وما فوق

المصابين بالتهاب الجلد التأتبي المعتمد

إثر تأثيرات جانبية خطيرة تتضمن

ارتفاعات حرارة جسمية (فرط حساسية) ورَدَ

فعل تآكل وذمة وعائية. يمكن أن تحدث

هذه الفعاليات خلال دقائق وحتى سعة

أيام بعد استعمال دوبيوكسنت. يجب علىك

أن تتبعه إلى إشارات هذه الحالات (أي

مشاكل في التنسق، توسم الوجه أو

الشفيقين أو الفم أو الحلق أو اللسان،

أغماء، دوران، الشعور بدوخة (انخفاض

ضغط الدم)، حمى، شعور عام بالتواء،

تورم الغدد الليمفاوية، شرى، حكة، الم

في المفاصل، طفح جارجي) وانت تأخذ

دوبيوكسنت. هذه الإشارات مذكورة في

فقرة «تأثيرات الجانبية الخطيرة» في

يمكن استعماله لوحدة.

يُستخدم دوبيوكسنت أيضًا مع دواعي

أخرى لعلاج الصياغة للريو الحاد لدى

البالغين والمراهقين (12 سنة وما فوق)

إذا لاحظت أي إشارات ارتقاس تحسسي.

دوبيوكسنت لا يُصاحب المرضي الذين يأخذون

دواء الريو بالتهاب في الأوعية الدموية

أو الرئتين بسبب ارتفاع عدد بعض كريات الدم البيضاء.

أيضاً يُسبب ارتفاع عدد الحمضيات.

دوبيوكسنت يُستخدم أيضًا مع دواعي ريو

المرمز مع داء السلاط الأفني الذين لا يكون مرضهم متحكمًا به

بالتهاب الجذور المزمن مع داء السلاط

الأفني الحالية التي يأخذونها.

دوبيوكسنت يُستخدم أيضًا مع داعي ريو

الجرحية والجراحة إلى الاستعمال الجهازي

الستيرويدات القشرية.

يف يعلم دوبيوكسنت

إن استعمال دوبيوكسنت للتهاب الجلد

الأتافي (الأكيرما) التأثبي أو الصيدلي أو المرضية.

إذا كان لديك أي سلطة إضافية،

حامل رخصة التسويق
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris
France

المصئ
SANOFI WINTHROP
INDUSTRIE
1051 Boulevard Industriel,
76580 LE TRAIT,
FRANCE

تمت مراجعة هذه النشرة للمرة
الأخيرة في شهر كانون الثاني/يناير
2021

ان هذا الدواء
متضمن بروتوبوليوماب
وهي مادة فعالة ومحبطة لل鐸.
الدواء يزيد من انتشار المرض.
الدواء يزيد من انتشار المرض.
لا يترك الماء دون غسله.
لا يترك الماء في مشكلاته.

THIS MEDICAMENT
is a product which affects your health, and its consumption
contrary to instructions is dangerous for you.
Follow the doctor's prescription, the method of
use and the instructions given by the pharmacist who sold the
medicament.
The doctor and the pharmacist are the experts
in medicine; their benefits and risks.
Do not by yourself interrupt the period of
treatment prescribed.
Do not change your same prescription without
consulting your doctor.
Keep all medications out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers,
Union of Arab Pharmacists.**5. كيف يحفظ دوبيوكسنت**احتظم هذا الدواء بعيدًا عن نظر الأطفال
ومتناولهم.لا تستعمل هذا الدواء بعد انقضاء تاريخ
الصلاحية المذكور على الصاقفة وعلبة
الكتون بعد كلمة EXP. يشير تاريخ
انقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من
شهر المذكور.احفظ الدواء في البراد (بين درجتين
من 0 إلى 8 درجات مئوية). عند
الضرورة، يمكن حفظ الماقيف العلبة
مسيقاً في حرارة الغرفة لغاية 25 درجة
مئوية لمدة 14 يوماً كحد أقصى.تتحققه في درجة حرارة تتجاوز 25 درجة
مئوية. إذا كنت تحتاج إلى إخراج
الدواء من العلبة، دعوه يأخذ
دوبيوكسنت في غضون 14 يومًا.احفظ الدواء في علبة الكتون الأصلية
لما يحمله من التأثيرات الجانبية.

احفظ الدواء من التأثيرات الجانبية

عند حرارة مئوية متسقة.

إذا أتيحت لك مقدمة دوبيوكسنت
مع داء السلاط الأفني.

دوبيوكسنت

أنت من شخص من أصل 10 أشخاص

في التهاب الجلد التأتبي فقط.

دوبيوكسنت

أنت من شخص من أصل 10 أشخاص

في التهاب الجلد التأتبي.

دوبيوكسنت

أنت من شخص من أصل 10 أشخاص

في التهاب الجلد التأتبي.

دوبيوكسنت

أنت من شخص من أصل 10 أشخاص

في التهاب الجلد التأتبي.

دوبيوكسنت

أنت من شخص من أصل 10 أشخاص

في التهاب الجلد التأتبي.

دوبيوكسنت

أنت من شخص من أصل 10 أشخاص

في التهاب الجلد التأتبي.

دوبيوكسنت

أنت من شخص من أصل 10 أشخاص

في التهاب الجلد التأتبي.

دوبيوكسنت

أنت من شخص من أصل 10 أشخاص

في التهاب الجلد التأتبي.

دوبيوكسنت

أنت من شخص من أصل 10 أشخاص

في التهاب الجلد التأتبي.

دوبيوكسنت

أنت من شخص من أصل 10 أشخاص

في التهاب الجلد التأتبي.

دوبيوكسنت

أنت من شخص من أصل 10 أشخاص

في التهاب الجلد التأتبي.

دوبيوكسنت

4. التأثيرات الجانبية المحتملةمثل الأدوية كلها، يمكن أن يسبب هذا
الدواء تأثيرات جانبية لا تسبب المرض
كلهم. يمكن أن يسبب دوبيوكسنت تأثيرات جانبية
خطيرة تتضمن ارتكاسات حساسية نادرة
الأفني المصاصب الشديد، تبلغ الجرعة
عالية مئوية بها من دوبيوكسنت:جرعة أولية من 600 ملغم (على حقنتين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 400 ملغم (على حقنتين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)جرعة أولية من 200 ملغم (على حقننين
الطبيب أو الصيدلي تمامًا. تحفظ مع
دوبيوكسنت في الثلاجة)

الخطوة 4، الانتظار 45 دقيقة




الخطوة 3، المعاينة



الخطوة 2، التحضير

- تأكد من أن لديك ما يلي:
- محقنة دوبىكست المعبأة مسبقاً
- منديل مبلل بالكحول*
- كرة قطنية واحدة أو شاش*
- حاوية مقاومة للثقب* (راجع الخطوة 12)
- * أغراض لا تتضمنها علبة الكرتون

الخطوة 1، الإخراج



أخرج المحقنة من علبة الكرتون عبر إمساك وسط بدن المحقنة.

⚠️ لا تستعمل المحقنة إذا
أنتهى إلى الصلاحيّة.

⚠️ لا تستخدم المحقنة إذا
تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية.


⚠️ لا تضع المحقنة تحت أشعة
الشمس المباشرة.

⚠️ لا تحفظ دوبىكست في حرارة
الغرفة لأكثر من 14 يوماً.

كيف يحفظ دوبىكست

- إحفظ المحقنة (الم الحقن) بعيداً عن متناول الأطفال.
- إحفظ المحقنة غير المستعملة في علبة الكرتون الأصلية وضعاً في البراد في حرارة تتراوح بين درجتين مترين و 8 درجات مئوية.
- لا تحفظ دوبىكست في حرارة الغرفة (ما دون 25 درجة مئوية) لأكثر من 14 يوماً. إذا كنت تحتاج إلى إخراج علبة الكرتون بشكل دائم من البراد، دون تاريخ الإخراج في المكان المخصص لذلك على علبة الكرتون الخارجية واستعمل دوبىكست في غضون 14 يوماً.
- لا تضع المحقنة إذا وقعت على سطح صلب أو إذا تضررت.
- لا تضع المحقنة في أي وقت.
- لا تقم بتسخين المحقنة.
- لا تقم بتجفيف المحقنة.
- لا تضع المحقنة تحت أشعة الشمس المباشرة.

تظهر في هذه الصورة أجزاء المحقنة المعبأة مسبقاً دوبىكست مع حجاب واق للأبرة.



تعليمات الاستعمال

دوبىكست® 300 مل Dupixent®

محلول لحقن في محقنة معبأة مسبقاً دوبىكست مع حجاب واق للأبرة

دوبيلوماب

SANOFI

معلومات مهمة

هذا الجهاز هو محقنة معبأة مسبقاً لاستعمال واحد. يحتوي على 300 مل من دوبىكست للحقن تحت الجلد (حقن تحت الجلد).

لا ينبغي لك أن تحاول حقن نفسك أو حقن أحد آخر إلا إذا كنت قد تلقيت التدريب اللازم من أخصائي الرعاية الصحية الذي يتبعك. لدى المراهقين في الـ 12 سنة من العمر وأكثر، يوصي بأن يتم حقن دوبىكست من قبل شخص بالغ أو تحت إشرافه. لدى الأطفال ما دون 12 سنة من العمر، يجب أن يُعطي مقدم رعاية دوبىكست.

• إقرأ كل التعليمات بدقة قبل استعمال المحقنة.

الخطوة 12 ، الرمي



قم برمي المحقنة وغضاء الإبرة في حاوية مقاومة للثقب.

⚠️ لا تدَّع وضع غطاء الإبرة.

احفظ الحاوية دائماً بعيداً عن متناول الأطفال.

الخطوة 11 ، الإفلات والنزع



إرفع إبهامك لإفلات قصيب المكبس حتى تصبح الإبرة مفطأة بغضاب الإبرة ومن ثم اسحب المحقنة من موقع الحقن.

إدفع قصيب المكبس نحو الأسفل ببطء وبثبات إلى بعد حد ممكِّن إلى أن تصبح المحقنة فارغة.

ملاحظة: سوف تشعر ببعض المقاومة.

هذا طبيعي.

الخطوة 10 ، دفع المكبس




أدخل الإبرة بشكل كامل في ثنية الجلد.

إدفع قصيب المكبس نحو الأسفل ببطء وبثبات إلى بعد حد ممكِّن إلى أن تصبح المحقنة فارغة.

ملاحظة: سوف تشعر ببعض المقاومة.

الخطوة 9 ، إدخال الإبرة




أدخل الإبرة بشكل كامل في ثنية الجلد عند زاوية 45 درجة تقريباً.

الخطوة 8 ، القرص



أمسك المحقنة في وسط بدن المحقنة الحقن، على النحو الظاهر في الصورة.

الخطوة 7 ، نزع غطاء الإبرة



اغسل يديك.

نَظُفْ موقع الحقن بواسطة منديل مبلل بالكحول.

دع جلدك يجف قبل الحقن.

⚠️ لا تدَّع وضع غطاء الإبرة.

⚠️ لا تمس الإبرة.

تنفس عليه قبل الحقن.

احفن دواعك بعد نزع غطاء الإبرة مباشرة.

الخطوة 6 ، التنظيف



قف باختيار موقع الحقن.

يمكنك أن تحقن في فخذك أو بطنك (المعدة)، باستخدام ضمن 5 سنت من سرة البطن.

إذا كان أحد آخر يعطيك الحقن، يمكنك أيضاً استخدام أعلى الذراع.

غير موقع الحقن لكل عملية حقن.

الخطوة 5 ، الاختيار



الحقن الذاتي أو من قبل مقدم رعاية

الحقن من قبل مقدم رعاية فقط