

أنها قد تكون حاملاً أو تُخطط للإجانب، فاستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

القيادة واستخدام الآلات

قد يكون لأوجمنتين آثار جانبية وأعراض قد تجعلك غير مؤهل للقيادة.

تجنب قيادة السيارات أو تشغيل الآلات إلا إذا كنت على ما يرام.

يحتوي أوجمنتين على الأسبرينام، كحول البنزيل ومالتوديكسترين:

- يحتوي أوجمنتين على الأسبرينام (E951) وهو مصدر للفينيل ألانين. وقد يضر هذا بالأطفال الذين يُولَدون مصابين بمرض يُطلق عليه "بيلة الفينيل الكيتونية". بيلة الفينيل كيتون (PKU)، وهو اضطراب وراثي نادر يظهر فيه الفينيل ألانين بتركيز عالٍ في الجسم لا يستطيع إزالته بشكل صحيح.
- يحتوي أوجمنتين على آثار من كحول البنزيل. قد يسبب كحول البنزيل ردود الفعل التحسسية.
- تم ربط كحول البنزيل بخطر الآثار الجانبية الشديدة بما في ذلك مشاكل في التنفس (تسمى "متلازمة اللهاث") عند الأطفال لصغار. لا تعطيه لطفلك حديث الولادة (حتى عمر ٤ أسابيع)، إلا إذا كان أوصى به طبيبك.
- لا يستخدم لأكثر من أسبوع عند الأطفال الصغار (أقل من ٣ سنوات) إلا إذا نصحك طبيبك أو الصيدلي.
- يحتوي أوجمنتين على مالتوديكسترين (جلوكوز). وإذا كان الطبيب قد أخبر الوالدين أن الطفل يعاني من عدم تحمل بعض السكريات، يجب استشارة الطبيب قبل تناول هذا المنتج الدوائي.

٣ طريقة إعطاء أوجمنتين

قم بإصباح هذا الدواء دائماً بالطريقة التي يوصي بها الطبيب أو الصيدلي بالضبط. وينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة عدم التأكد من طريقة الاستعمال.

البالغون والأطفال ممن وزنه ٤٠ كيلوجراماً أو أكثر

- لا يوصى الأطفال عادة بهذا المعلق للبالغين والأطفال ممن وزنه ٤٠ كيلوجراماً أو أكثر. استشر الطبيب أو الصيدلي بخصوص هذا الأمر.

الأطفال الأقل من ٤٠ كيلوجراماً

- حسب جميع الجرعات على أساس وزن الطفل بالكيلوجرامات.
- سوف يوضح الطبيب جرعة الأوجمنتين التي يجب إعطاؤها للرضع أو الطفل.
- كما قد تتوفر لمقعة أو كوب لقياس الجرعة أو حقنة. وينبغي استخدامها لإعطاء الرضيع أو الطفل الجرعة الصحيحة.

الجرعة الموصى بها:

- أوجمنتين ١٥٦ مجم/مل — ٢٠ مجم/٥ مجم/كجم/يوم (٠,٨ مل من المعلق/كجم/يوم) إلى ٦٠ مجم / ١٥ مجم / كجم / يوم (٢,٤ مل من المعلق / كجم / يوم) تعطى على ثلاث مقسمة جرعات.
- أوجمنتين ٢١٢ مجم/مل — ٢٠ مجم/٥ مجم/كجم/يوم (٠,٩ مل من المعلق/كجم/يوم)
- أوجمنتين ٢٢٨ مجم/مل — ٢٥ مجم/٣,٦ مجم/كجم/يوم (٠,٦ مل من معلق / كجم / يوم) إلى ٤٥ مجم / ٦,٤ مجم / كجم / يوم (١,٢ مل من المعلق / كجم / يوم) تعطى على جرعتين مقسمتين.
- الجرعة الأعلى — أوجمنتين ٢٢٨ مجم/مل: حتى ٧٠ مجم/١٠ مجم/كجم/يوم (١,٨ مل من المعلق/كجم/يوم) تعطى على جرعتين مقسمتين.

المرضى الذين يعانون من مشكلات الكلى والكبد

- قد يقلل الطبيب الجرعة إذا كان الطفل يعاني من مشكلات بالكلى. ويمكن أن يختار الطبيب تركيزاً مختلفاً أو دواء آخر.

إذا كان الطفل يعاني من مشكلات بالكبد فقد يوضع لإجراء تحاليل الدم بشكل أكثر تكراراً للكشف على وظائف الكبد.

طريقة إعطاء أوجمنتين

- يجب دائماً رُخ الزجاجه جيداً قبل كل جرعة
- يُعطى الدواء مع الوجبات
- يجب تناول الجرعات في فترات زمنية متساوية خلال اليوم، مع مراعاة أن يكون بين كل جرعة والأخرى ٤ ساعات على الأقل. يجب عدم تناول جرعتين خلال ساعة واحدة.

• يجب عدم إعطاء الطفل أوجمنتين لأكثر من أسبوعين. وإذا ظل الطفل مريضاً، يجب مراجعة الطبيب مرة أخرى لفحصه.

في حالة إعطاء جرعة زائدة من أوجمنتين

في حالة إعطاء جرعة زائدة من أوجمنتين، قد تتضمن العلامات التي تظهر عليه اضطراب في المعدة (شعور بالغثاين أو التعب أو الإسهال) أو تشنجات. يجب استشارة الطبيب في أسرع وقت. كما يجب أخذ زجاجة الدواء لعرضها على الطبيب.

في حالة نسيان إعطاء أوجمنتين

في حالة نسيان إعطاء الطفل جرعة أوجمنتين يجب إعطاؤها له فور التذكر. يجب ألا تعطى طفلك الجرعة التالية بعد ذلك مباشرة، بل انتظر حوالي ٤ ساعات قبل إعطائه الجرعة التالية. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة الفائتة.

إذا توقفت الطفل عن تناول أوجمنتين

يجب مواصلة إعطاء الطفل أوجمنتين حتى استكمال العلاج، حتى في حالة الشعور بالتحسن. فاطفل يحتاج إلى كل جرعة لمساعدته على مقاومة العدوى. إذا نجحت بعض البكتيريا قد تتسبب في عودة العدوى مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول تناول هذا الدواء، فاسأل الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة.

٤ الآثار الجانبية المحتملة

مثلته مثل جميع الأدوية، يمكن أن يتسبب هذا الدواء في حدوث آثار جانبية، لكن ليس بالضرورة أن يصاب بها جميع الأشخاص. ويمكن أن تحدث الآثار الجانبية التالية عند تناول هذا الدواء.

حالات ينبغي الانتباه لها

تفاعلات الحساسية:

- الطفح الجلدي
- التهاب الأغشية المخاطية (الالتهاب العائلي) الذي يمكن أن يظهر على هيئة بقع بارزة حمراء أو أرجوانية على الجلد، كما يمكن أن تصيب الأجزاء الأخرى من الجسم.
- الحمى أو ألم المفاصل أو تورم الخد بالرقبة أو الإبط أو الأربية
- التورم الذي يصيب الوجه أو الحلق أحياناً (الوذمة العائلية) مما يؤدي إلى صعوبة التنفس
- إغماء
- ألم في الصدر يمكن أن يكون علامة على رد فعل تحسسي خطير محتمل تسمى متلازمة كوينس

← **يجب الاتصال بالطبيب على الفور** إذا أصيب الطفل بأي من هذه الأعراض. **وتوقف عن تناول أوجمنتين.**

نشرة العبوة: معلومات للمستخدم

أوجمنتين بتركيز ٣١٢ مجم/٥ مل و ١٥٦ مجم/٥ مل و ٢٢٨ مجم/٥ مل معلق

كو أموكسيسلاف (ثلاثي هيدرات الأموكسيسيلين + كلافيولينات البوتاسيوم)

يجب قراءة هذه النشرة بالكامل بعناية قبل بدء إعطاء الطفل هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة.

- احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي استفسارات أخرى، يجب سؤال الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة.
- يصف الطبيب هذا الدواء عادة للرضع أو الطفل المعني فقط. فلا يجوز إعطاؤه للآخرين. فقد يؤذيهم، حتى لو كانت لديهم العلامات المرضية نفسها الموجودة عند طفلك.
- يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة إذا تعرض الطفل لأي آثار جانبية. ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير واردة في هذه النشرة. انظر القسم ٤.

محتويات هذه النشرة

- ١ معلومات عن أوجمنتين ودواعي استعماله
- ٢ المعلومات الواجب الإطلاع عليها قبل إعطاء أوجمنتين
- ٣ طريقة إعطاء أوجمنتين
- ٤ الآثار الجانبية المحتملة
- ٥ كيفية تخزين أوجمنتين
- ٦ محتويات العبوة ومعلومات أخرى

١ معلومات عن أوجمنتين ودواعي استعماله

إن أوجمنتين هو أحد المضادات الحيوية الذي يقضي على البكتيريا التي تسبب العدوى. ويحتوي على دوائين مختلفين هما الأموكسيسيلين وحضن الكلافولانيك. وينتمي الأموكسيسيلين إلى مجموعة الأدوية التي تسمى "البنسلينات" والتي يمكن إيقاف تأثيرها في بعض الأحيان (إيقاف نشاطها). بينما يعمل المكون النشط الآخر (حضن الكلافولانيك) على منع إيقاف تأثير الأموكسيسيلين.

ويستخدم أوجمنتين لعلاج الرضع والأطفال من أنواع العدوى التالية:

- عدوى الأنف الوسطى والعدوى الجيبية
- عدوى الجهاز التنفسي
- عدوى المسالك البولية
- عدوى البشرة والأغشية المخاطية بما في ذلك التهابات الأسنان
- التهابات العظام والمفاصل

٢ المعلومات الواجب الإطلاع عليها قبل إعطاء أوجمنتين

لا يجوز إعطاء الطفل أوجمنتين في الحالات التالية:

- إذا كان الطفل يعاني من الحساسية تجاه أموكسيسيلين أو حمض الكلافولانيك أو البنسلين أو غير ذلك من مكونات الدواء (المذكورة في القسم ٦).
- إذا أصيب الطفل سابقاً بتفاعلات حساسية حادة تجاه أي مضادات حيوية أخرى.
- ويمكن أن تتضمن هذه التفاعلات الطفح الجلدي أو تورم الوجه أو الحلق.
- إذا عانى الطفل من قبل من مشكلات بالكبد أو اليرقان (اصفرار الجلد) عند تناول المضادات الحيوية.

← **لا يجوز إعطاء أوجمنتين للطفل إذا انطبقت عليه أي حالة من الحالات المذكورة أعلاه.** وإذا كنت غير متأكد، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء أوجمنتين للطفل.

تحذيرات واحتياطات

ينبغي مراجعة الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة قبل إعطاء أوجمنتين للطفل، في الحالات التالية:

- إذا كان يعاني من الحمى العقيدة
- إذا كان يُعالج من مشكلات في الكبد أو الكلى
- إذا كان لا يتبول بانتظام

إذا كنت غير متأكد من مدى انطباق أي مما سبق على الطفل، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي، قبل إعطائه أوجمنتين.

في بعض الحالات، قد يفحص الطبيب نوع البكتيريا التي تسبب العدوى لدى الطفل. وبناءً على النتيجة، يمكن أن يعطي الطبيب الطفل أوجمنتين بتركيز مختلف أو قد يعطيه دواء آخر.

حالات ينبغي الانتباه لها

قد يزيد أوجمنتين من تفاقم بعض الحالات المرضية الحالية أو قد يسبب آثاراً جانبية خطيرة. وتتضمن هذه الأعراض تفاعلات الحساسية والتشنجات (النوبات)، ألم في الصدر والتهاب الأمعاء الغليظة. ولذلك يجب ترقب بعض الأعراض المحددة أثناء تناول الطفل لأوجمنتين لتقليل خطورة تعرضه لأي مشكلات. انظر "حالات ينبغي الانتباه لها" في القسم ٤.

تحاليل الدم والبول

إذا كان الطفل يجري تحاليل الدم (مثل تحاليل حالة خلايا الدم الحمراء أو وظائف الكبد) أو تحاليل البول (لفحص الجلوكوز)، يجب إخبار الطبيب أو الممرضة أنه يتناول أوجمنتين. لأن أوجمنتين قد يؤثر على نتائج هذه الأنواع من التحاليل.

أوجمنتين والأدوية الأخرى

أخبر الطبيب أو الصيدلي ما إذا كان طفلك يتناول أي أدوية أخرى أو تناولها مؤخراً أو قد تناولها.

إذا كان الطفل يتناول اليبوريونول (المستخدم لعلاج الفرس) مع أوجمنتين، فإنه يكون أكثر عرضة للإصابة بتفاعلات حساسية البشرة.

إذا كان الطفل يتناول برينيسين (لعلاج الفرس) قد يقرر الطبيب تعديل جرعة أوجمنتين. في حالة تناول الأدوية التي تساعد على إيقاف الجلطات الدموية (مثل الوارفارين) مع أوجمنتين، فقد يتطلب الأمر إجراء المزيد من تحاليل الدم.

كما يمكن أن يؤثر أوجمنتين على طريقة تأثير الميتوتركسيت (دواء يُستخدم لعلاج السرطان أو الأمراض الروماتيزية).

يمكن كذلك أن يؤثر أوجمنتين على طريقة تأثير ميكوفينولات موفيتيل (دواء يُستخدم لمنع رفض الأعضاء المزروعة).

الحمل والرضاعة الطبيعية والحساسية

إذا كانت المريضة التي تتوّن إعطائها هذا الدواء حاملاً أو ترضع رضاعة طبيعية أو تعتقد

التهاب الأمعاء الغليظة

يتسبب التهاب الأمعاء الغليظة في الإصابة بالإسهال المائي مصحوبًا بوجود دم ومخاط عادةً والأم بالمعدة وآو حمى.

يجب الاتصال بالطبيب على الفور لاستشارته إذا أصيب الطفل بهذه الأعراض.

يمكن أن تصيب أكثر من شخص واحد من كل ١٠ أشخاص (إسبال (لدى البالغين).

الآثار الجانبية الشائعة

- يمكن أن تصيب حتى شخص واحد من كل ١٠ أشخاص
- القيء (القيء) - عدوى فطرية تصيب المهبل أو الفم أو ثثيا (الجلد)
- شعور بالإعياء (الغثاين)، لا سيما عند تناول جرعات مرتفعة

في حالة حدوث هذه الحالات، يجب تناول أوجمنتين مع الوجبات

فيء

إسبال (لدى الأطفال)

الآثار الجانبية غير الشائعة

يمكن أن تصيب حتى شخص واحد من كل ١٠٠ شخص

- طفح جلدي وحكة
- طفح جلدي بارز مصحوب بحكة (شرى)
- عسر هضم
- دوار
- صداع

الآثار الجانبية غير الشائعة التي يمكن أن تظهر في تحاليل الدم:

- زيادة بعض المواد (الإنزيمات) التي ينتجها الكبد.

آثار جانبية نادرة

يمكن أن تصيب حتى شخص واحد من كل ١٠٠٠ شخص

- طفح جلدي، يمكن أن يتحول إلى ثور ويندو مثل الثتوات الصغيرة (يقع متوسطة داكنة محاطة بمساحة أكثر شحوبًا وحلقة داكنة عند الأطراف - حمامي عديدة الأشكال)

يجب الاتصال بالطبيب على الفور عند ملاحظة أي من هذه الأعراض.

الآثار الجانبية النادرة التي يمكن أن تظهر في تحاليل الدم:

- انخفاض عدد الخلايا المسببة في تجلط الدم
- انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء

معدل التكرار غير معروف

يتم تقدير معدل التكرار من البيانات المتوفرة.

- تفاعلات الحساسية (انظر ما سبق)
- التهاب الأمعاء الغليظة (انظر ما سبق)
- التهاب الغشاء الوائي المحيط بالأدماع (التهاب السحايا اللاإتتائي)
- التهابات الخطيرة بالجلد:
- طفح منتشر بثثور وتقرن الجلد، لا سيما حول الفم والأياف والعينين والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنز جونسون)، وشكل آخر أشد خطورة يتسبب في فرط تقرن الجلد (أكثر من ٣٠٪ من سطح الجسم - تقرن الأسجة الممتوثة البشرية التسسمى).
- طفح جلدي أحمر منتشر بثثور صغيرة تحتوي على الصديد (التهاب الجلد التقريري القفاعي)
- طفح جلدي أحمر تقريري ينتوء أسفل الجلد ويثور (التثاير الطفحي).
- أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا يصاحبها طفح جلدي وحمى وتورم الغدد ونتائج فحوصات دم غير طبيعية (تتضمن زيادة في عدد خلايا الدم البيضاء (فرط البوزينيات) وإنزيمات الكبد) (التفاعل الدوائي مع فرط البوزينيات والأعراض الجهازية (DRESS)).

يجب الاتصال بالطبيب على الفور إذا أصيب الطفل بأي من هذه الأعراض.

- التهاب الكبد (الوبائي)
- البرقان الذي يحدث بسبب زيادة بيليروبين الدم (مادة تنتج في الكبد) الذي يمكن أن يجعل لون بشرة الطفل وبياض عينيه إلى اللون الأصفر
- التهاب الأنابيب الكلوية
- استفراق الدم وقتًا أطول من المعتاد لكي يتجلط
- فرط النشاط
- التشنجات (لدى الأشخاص الذين يتناولون جرعات مرتفعة من أوجمنتين أو يعانون من مشكلات بالكلى)
- لسان أسود مشعر
- نؤن الأسنان (لدى الأطفال)، يمكن عادةً إزالة اللون بالفرشاة
- الآثار الجانبية التي يمكن أن تظهر في تحاليل البول أو الدم:
- انخفاض حاد في عدد خلايا الدم البيضاء
- انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم الانحلالي)
- بلورات البول

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا تعرضت لأي آثار جانبية. ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير واردة في هذه النشرة.

فمن خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

من أجل تسجيل شكوي بخصوص الدواء أو أعراض جانبية مرتبطة باستخدام دواء شركة GSK برجاء التواصل عبر: gulf.safety@gsk.com

٥ كيفية تخزين أوجمنتين

يجب حفظ الدواء بعيدًا عن مرأى ومتناول الأطفال.

يجب تخزينه في مكان جاف في درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية أو أقل.

قبل المزج، حافظ على بقائه محكم الغلق وخزنه في مكان جاف في درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية أو أقل.

بعد المزج، خزّنه في الثلاجة واستخدمه خلال ٧ أيام.

تجنب تجميد الدواء.

لا تستخدم الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدوّن على العبوة الكرتونية. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم من الشهر المذكور.

لا تتخلص من أي أدوية بآلقائها في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. استشر الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعملها. فهذه الإجراءات تساعد على حماية البيئة.

٦ محتويات العبوة ومعلومات أخرى

محتويات أوجمنتين

أوجمنتين ١٥٦ مجم/٥ مل: المواد الفعالة هي أموكسيسيلين وحمض الكلافولانيك. يحتوي

كل مل من المعلق على أموكسيسيلين ثلاثي الهيدرات ما يعادل ٢٥ ملغ من أموكسيسيلين وكلافوليئات البوتاسيوم ما يعادل ٦,٢٥ ملغ من حمض الكلافولانيك.

أوجمنتين ٣١٢ مجم/٥ مل: المواد الفعالة هي أموكسيسيلين وحمض الكلافولانيك. يحتوي كل مل من المعلق على أموكسيسيلين ثلاثي الهيدرات ما يعادل ٥٠ ملغ من أموكسيسيلين وكلافوليئات البوتاسيوم ما يعادل ١٢,٥ ملغ من حمض الكلافولانيك.

أوجمنتين ٢٢٨ مجم/٥ مل: المواد الفعالة هي أموكسيسيلين وحمض الكلافولانيك. يحتوي كل مل من المعلق على أموكسيسيلين ثلاثي الهيدرات ما يعادل ٤٠ ملغ من أموكسيسيلين وكلافوليئات البوتاسيوم ما يعادل ٥,٧ ملغ من حمض الكلافولانيك.

المكونات الأخرى هي الأسبارتام (E951)، صمغ الزانثان، ثاني أكسيد السيليكون، السيليكا الغروية الألامائية، حمض السكسينيك، هيدروكسي بروبيل، نكهة البرتقال الجافة *١ (بما في ذلك كحول البنزيل)، نكهة البرتقال الجافة *٢، نكهة الفوت الجافة* و٣، نكهة جافة للشراب الذهبي* (تشمل أيضًا المالتوديكسترين) والماء.

• انظر القسم ٢ لمزيد من المعلومات الهامة حول الأسبارتام و البنزيل الكحول والمالتوديكسترين في أوجمنتين.

شكل عبوة أوجمنتين ومحتوياتها

يتوفر معلق أوجمنتين على هيئة مسحوق أبيض مائل إلى الأصفر في عبوة زجاجية شفافة. ويمجدر أن يتم التركيب، تحتوي الزجاجة على ١٠٠ مل من الخليط السائل الأبيض المائل إلى الأصفر الذي يسمى معلق.

الشركة المصنعة

Glaxo Wellcome Production, 53100

MAYENNE, France

تمت الموافقة على هذه النشرة في ١٦ مايو ٢٠٢٣.

العلامات التجارية ملوكة لمجموعة شركات GSK أو مرخصة لها.

حقوق النشر © لعام ٢٠٢٤ محفوظة لمجموعة شركات GSK أو مناح الترخيص الخاص بها.

نصيحة/تنبيه طبي

ستُستعمل المضادات الحيوية لعلاج العدوى التي تسببها البكتيريا. ولا تؤثر على العدوى التي تنشأ بسبب الفيروسات.

في بعض الأحيان قد لا تستجيب العدوى البكتيرية للمضادات الحيوية. أحد أشهر الأسباب وراء حدوث عدم الاستجابة يتمثل في أن البكتيريا المسببة للعدوى تصبح مقاومة لنوع المضاد الحيوي الذي يستخدمه المريض. وهذا يعني أن هذه البكتيريا يمكن أن تعيش بل وتتكاثر بالرغم من تناول المضاد الحيوي.

يمكن أن تصبح البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية لعدة أسباب. ولكن تناول المضادات الحيوية بحرص يساعد على تقليل احتمالية اكتساب البكتيريا مقاومة تجاهها.

عندما يصف الطبيب علاجًا يتضمن مضادًا حيويًا، فهو مخصص فقط لعلاج المرض الحالي الذي أصابك، كما أن مراعاة النصيحة التالية من شأنه أن يساعد على الوقاية من حدوث مقاومة البكتيريا التي قد توقف عمل المضادات الحيوية.

١. من الضروري تناول المضاد الحيوي بالجرعة الصحيحة وفي الأوقات المناسبة وعدد الأيام المحدد. كما يجب قراءة التعليمات المذكورة على الملصقات التوعيفية، وإذا تمزح استئجاب أي معلومة، ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي طلبًا لتوضيحها.

٢. يجب عدم تناول أي مضاد حيوي إلا إذا وصفه الطبيب خصيصًا لعلاجك، ويجب أن يقتصر تناوله على علاج العدوى التي وُصف لعلاجها فحسب.

٣. يجب عدم تناول المضادات الحيوية التي وصفها الأطباء لعلاج مرضى آخرين ولو كانوا يعانون من العدوى نفسها التي تعاني منها.

٤. يجب عدم إعطاء المضادات الحيوية التي وصفها الأطباء لعلاجك إلى مرضى آخرين.

٥. إذا تبقّت كمية من المضاد الحيوي بعد انتهاء الفترة العلاجية وفق إرشادات الطبيب، ينبغي إعطاء المقدار المتبقي من المضاد الحيوي للصيدلي ليخلص منه بالطريقة الملائمة.

تعليمات المزج

ينبغي التحقق من سلامة سادة الغطاء قبل الاستخدام. قم برج الزجاجة لتحرير المسحوق. أضف كمية الماء (كما هو موضح أدناه)، ثم أقلب الزجاجة ورخها جيدًا.

ويمكن بدلاً من ذلك رج الزجاجة لتحرير المسحوق، ثم املا الزجاجة بالماء حتى يصل إلى أسفل الخط الموجود على الزجاجة أو المصطب بالضبط. أقلب الزجاجة ورخها جيدًا، ثم املاها بالماء حتى يصل إلى الخط المحدد بالضبط. أقلب الزجاجة ورخها جيدًا مرة أخرى.

التركيز	حجم الماء المطلوب إضافته عند التحضير (مل)	الحجم النهائي للمعلق القوي المعاد تكوينه (مل)
أوجمنتين ١٥٦ مجم/٥ مل	٩٢	١٠٠
أوجمنتين ٣١٢ مجم/٥ مل	٩٠	١٠٠
أوجمنتين ٢٢٨ مجم/٥ مل	٦٤	٧٠

يجب رج الزجاجة جيدًا قبل كل جرعة.

هذا المستحضر هو دواء

الدواء منتج بثر على صحته واستهلاكه خلافًا للتعليمات يعرضك للخطر. اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي صرفه لك.

- فاطبيب والصيدلي هما الخيران بالأدوية وفوائدها ومخاطرها.
- لا تقطع دم العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تترك صرف الدواء دون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب، اتحاد الصيدانة العرب.