

بافينسيو 20 مغ / مل

مركز لمحلول التسريب

أفلوماب

المعلومات التالية مخصصة لمقدمي الرعاية الصحية المختصين فقط:

تعليمات الاستعمال

التحضير والإعطاء

يجب استخدام تinctures معقمة لاداد المحلول للتسريب.

• يجب فحص القارورة بالعين بحثاً عن وجود جسيمات وتغير في اللون. يمثل بافينسيو محلول رائق عديم اللون إلى أصفر فاتح.

يجب التخلص من القارورة في حال كان المحلول عكراً أو متغير اللون أو يحتوي على جسيمات.

• يجب استخدام كيس تسريب بحجم مناسب (يفضل 250 مل)

يحتوي إما على محلول كلوريد الصوديوم 9 مل / مل (0.9%) للتسريب. يجب تحسب الجهم المطلوب من بافينسيو من القارورة (القارير) ونقله إلى كيس التسريب. يجب التخلص من أي قوارير مستخدمة جزئياً أو فارغة.

يجب خلط المحلول المخفف عن طريق قلب الكيس برفق لتجنب تشكيل رغوة أو الفلك المفترط للمحلول.

يجب فحص المحلول للتتأكد من أنه رائق وعديم اللون وخال من الجزيئات المرئية. يجب استخدام المحلول المخفف فور تحضيره.

• لا تقم بإعطاء أدوية أخرى في نفس الوقت عبر نفس الخط الوريدي. قد يتقطيع التسريب الوريدي باستدام مرشح داخلي أو مضاد معقم وغير مولد للحمى ومنخفض البروتين بعطر 0.2 ميكروجرام.

يجب، بعد إعطاء بافينسيو، غسل الخط إما بمحلول كلوريد الصوديوم 9 مل / مل (0.9%) للتسريب أو بمحلول كلوريد الصوديوم 4.5 مل / مل (0.45%) للتسريب. لا تتم تجميد أو رج المحلول المخفف. في حال تم تبريد المحلول الناري، اتركه في الأكياس الوريدية حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة (20 درجة سيلزيوس إلى 25 درجة سيلزيوس) قبل الاستخدام.

يجب التخلص من أي منتج طبي غير مستخدم أو نفايات وفقاً للمطالبات المحلية.

شائعة (قد تصيب ما يصل إلى شخص من أصل كل 10 أشخاص)

انخفاض في عدد أحد أنواع خلايا الدم البيضاء (الملغافويات)

انخفاض في عدد الصفائح الدموية في الدم

ارتفاع ضغط الدم

انخفاض مستوى الصوديوم

صداع ودوار

الشعور بالبرد

طفاف في الدم

ارتفاع مستوى آنزيمات الكبد في الدم

ارتفاع مستوى آنزيمات البنكرياس في الدم

طفاف جدي وحكة

اللام عصبية

داء يشبه الأنفلونزا (يشمل الشعور بالحمى والألم العضلي)

خرد ووخز وضغط وحس حرق في الذراعين أو الساقين

غير شائعة (قد تصيب ما يصل إلى شخص من أصل كل 100 شخص)

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع مستوى آنزيمات العضلات في الدم

زيادة في عدد أحد أنواع خلايا الدم البيضاء (المحمضات)

التهاب المفاصل (التهاب المفاصل الرئوي)

الوهن العضلي الوخيم ومتلازمة الوهن العضلي، وهو مرض يمكن أن يسبب ضعف العضلات

نادرة (قد تصيب ما يصل إلى شخص من أصل كل 1000 شخص)

التهاب المثانة. قد تشمل العلامات والأعراض التبول المتكرر أو / أو المولم والالحاح البولي وجود دم في البول و الشعور بالألم أو الضغط في أسفل البطن.

تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية في التجارب السريرية باستخدام أفلوماب بالاشتراك مع أكتينيب:

شائعة جداً (قد تصيب أكثر من شخص من أصل كل 10 أشخاص)

براز رخو وغثيان وإمساك وإقياء

ارتفاع ضغط الدم

الشعور بالتبغ أو الضغط

رحة في الصوت وسعال وضيق في التنفس

تراجع الأحسان بالجوع وفقدان الوزن

صداع ودوار

اللام المفاصل والألم الظهر وألام البطن وألام العضلات

ارتفاع مستوى آنزيمات الكبد في الدم

الشعور بالبرد

طفاف جدي وحكة

حرى

غير شائعة (قد تصيب ما يصل إلى شخص من أصل كل 10 أشخاص)

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم