

Donépézil arrow génériques®



Adulte

5 mg

10 mg

comprimé pelliculé

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé ?
3. COMMENT PRENDRE DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament appartient à la classe des anti-cholinestérasiques (médicaments contre la démence). Ce médicament est utilisé pour le traitement symptomatique des formes légères à modérément sévères de la maladie d'Alzheimer.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à l'un des composants du produit ou aux dérivés de la pipéridine.
- En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Faites attention avec DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé :

Mises en garde spéciales

Ce médicament n'est pas destiné à l'enfant.

Ce médicament nécessite un bilan avant sa prescription et une évaluation régulière de l'amélioration apportée par le traitement. Il est important qu'un de vos proches soit au courant du traitement que vous prenez.

L'association à d'autres médicaments passant par le même mécanisme d'action est à éviter.

Si vous devez avoir une anesthésie générale, informez votre médecin que vous prenez ce médicament.

Précautions d'emploi

Prévenez votre médecin en cas de :

- antécédents de maladie du rythme du cœur,
- antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum,
- maladie du foie (hépatite),
- difficultés à uriner,

- antécédents de convulsion,
- asthme ou certaines maladies pulmonaires chroniques.

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladies héréditaires rares).

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prise d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance et notamment les traitements anti-douleur, anti-arthrose, antibiotique, anti-fongique, relaxant musculaire, anti-dépresseur, anti-convulsivant ou cardiaque.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Les femmes traitées par ce médicament ne doivent pas allaiter.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

La maladie d'Alzheimer peut être responsable de difficultés lors de la conduite de véhicule ou lors de l'utilisation d'une machine. En cas de maladie d'Alzheimer, ces activités sont à éviter sauf avis contraire de votre médecin. Des crampes musculaires, de la fatigue et des vertiges ont été rapportés qui peuvent perturber la conduite de véhicule ou l'utilisation de machines.

Liste des excipients à effet notoire : lactose.

3. COMMENT PRENDRE DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé ?

Le dosage des comprimés que vous allez prendre et la durée de votre traitement peuvent varier en fonction des recommandations de votre médecin. En règle générale, le traitement débutera comme suit : un comprimé à 5 mg, tous les soirs avant le coucher. Après un mois de traitement, votre médecin peut juger utile d'augmenter cette posologie à 10 mg, tous les soirs avant le coucher. La posologie maximale recommandée est de 10 mg/j.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À LA PRESCRIPTION MÉDICALE.

Voie orale. Le comprimé doit être placé sous la langue pour permettre sa désintégration avant de l'avaler, avec ou sans eau, pendant ou après le repas.

Ce médicament doit être pris le soir avant le coucher.

Respecter attentivement la prescription de votre médecin et les conseils de votre pharmacien quant au moment et à la fréquence de la prise du médicament. Ne pas modifier la dose sans l'avis de votre médecin.

Ne pas utiliser plus de DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

NE PAS prendre plus de la dose prescrite. Téléphoner immédiatement à votre médecin en cas de dépassement de la dose prescrite. En cas d'impossibilité à joindre un médecin, se rendre aussitôt au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Si vous oubliez de prendre DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé :

En cas d'oubli de prise d'un comprimé, prendre un seul comprimé le lendemain à l'heure habituelle. En cas d'oubli de prise pendant plus de 1 semaine, consulter votre médecin avant toute reprise du traitement.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Des diarrhées, des nausées, des vomissements, des crampes musculaires, de la fatigue, de la difficulté à trouver le sommeil, ont été rapportés le plus souvent lors de l'utilisation de ce médicament. Dans la plupart des cas, ces effets disparaissent sans l'arrêt du traitement.

Signaler les à votre médecin et en particulier si vous ne les supportez pas.

Il a été aussi rapporté fréquemment pendant le traitement des cas de diminution de l'appétit, d'hallucinations, d'agitation, de l'agressivité, de convulsions, de vertiges, de syncopes, des douleurs abdominales, éruption cutanée, démangeaisons, incontinence urinaire, maux de tête, douleur, accident, rhume.

Dans des cas peu fréquents : ralentissement du rythme cardiaque, ulcères gastriques ou duodénaux, saignement du tube digestif, élévation des enzymes musculaires.

Rarement : rigidité et difficulté à réaliser des mouvements, tremblement des membres, troubles du rythme cardiaque, (qui peuvent être à l'origine des vertiges et d'étourdissements), dysfonctionnement du foie incluant des hépatites.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ce médicament vous a été prescrit personnellement. Ce médicament ne peut être obtenu que sur ordonnance.

Ne donner ce médicament à personne d'autre. Ce traitement peut être dangereux pour quelqu'un d'autre, même si cette personne a les mêmes symptômes que vous.

Si votre médecin vous demande d'interrompre le traitement, rapporter les produits non utilisés à votre pharmacien.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé ?

DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES 5 mg, comprimé pelliculé

La substance active est :

Chlorhydrate de donépézil : 5 mg (correspondant à 4,56 mg de donépézil base), pour un comprimé pelliculé.

DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES 10 mg, comprimé pelliculé

La substance active est :

Chlorhydrate de donépézil : 10 mg (correspondant à 9,12 mg de donépézil base), pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, amidon de maïs, cellulose microcristalline, hydroxypropylcellulose, stéarate de magnésium.

Pelliculage : OPADRY blanc 02H28525 [hypromellose, dioxyde de titane (E171) propylène glycol, talc].

Qu'est ce que DONÉPÉZIL ARROW GÉNÉRIQUES, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé.

Boîte de 28 comprimés.

Titulaire

LABORATOIRES GERDA

6, rue Childebert

69 002 LYON

Exploitant

ARROW GÉNÉRIQUES

26, avenue Tony Garnier

69 007 LYON

Fabricant

SPECIFAR S.A.

1,28 Octrovriou Str.

123 51 Ag. Varvara

ATHENES

GRECE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Novembre 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France), www.afssaps.fr

Cette notice est également disponible gratuitement en braille et en caractères agrandis, auprès de Handicap Zéro sur simple demande au 0800.39.39.51 ou sur www.pharmabraille.fr.

