

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 20/09/2022

## Dénomination du médicament

**EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé**  
Évérolimus

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé ?
3. Comment prendre EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : agents anti-néoplasiques, inhibiteur de la kinase cible de la rapamycine chez les mammifères (mTOR), inhibiteurs de protéine kinase - code ATC : L01EG02

EVEROLIMUS ARROW est un médicament anticancéreux qui contient une substance active appelée évérolimus. L'évérolimus réduit l'apport de sang à la tumeur et ralentit la croissance et l'extension des cellules cancéreuses.

EVEROLIMUS ARROW est utilisé chez les patients adultes pour traiter :

- le cancer du sein avancé avec récepteurs hormonaux positifs chez les femmes ménopausées chez qui d'autres traitements (appelés « inhibiteurs non-stéroïdiens de l'aromatase ») ne permettent plus de contrôler la maladie. Il est administré avec un médicament appelé exémestane, un inhibiteur stéroïdien de l'aromatase, qui est utilisé dans le traitement hormonal du cancer du sein ;
- des tumeurs avancées appelées tumeurs neuroendocrines d'origine pancréatique. Il est administré si les tumeurs sont inopérables et si elles ne produisent pas en excès d'hormones spécifiques ou d'autres substances naturelles apparentées.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé ?

EVEROLIMUS ARROW ne vous sera prescrit que par un médecin ayant l'expérience des traitements anticancéreux. Respectez attentivement les instructions du médecin. Elles peuvent être différentes des informations générales présentées dans cette notice. Si vous avez des questions sur EVEROLIMUS ARROW ou concernant la raison pour laquelle ce médicament vous a été prescrit, veuillez consulter votre médecin.

**Ne prenez jamais EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé**

- **si vous êtes allergique** à l'évérolimus, à des substances apparentées telles que le sirolimus ou le temsirolimus ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Si vous pensez que vous pouvez être allergique, demandez conseil à votre médecin.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé :

- si vous avez des problèmes de foie ou si vous avez eu dans le passé une maladie qui aurait pu atteindre votre foie. Dans ce cas, il sera peut-être nécessaire de vous prescrire une dose différente d'EVEROLIMUS ARROW ;
- si vous êtes diabétique (taux élevé de sucre dans le sang). EVEROLIMUS ARROW peut augmenter le taux sanguin de glucose et aggraver le diabète. Cela peut nécessiter un traitement par insuline ou par antidiabétiques oraux. Parlez-en à votre médecin si vous constatez que vous avez une sensation de soif excessive ou que vous urinez de façon plus fréquente ;
- si vous devez être vacciné(e) pendant le traitement par EVEROLIMUS ARROW ;
- si vous avez un taux élevé de cholestérol. EVEROLIMUS ARROW peut augmenter le cholestérol et/ou les autres graisses dans le sang ;
- si vous avez eu récemment une opération chirurgicale majeure ou si la plaie n'est pas encore cicatrisée après la chirurgie. EVEROLIMUS ARROW peut augmenter le risque de problèmes liés à la cicatrisation des plaies ;
- si vous avez une infection, cela peut nécessiter le traitement de l'infection avant l'instauration du traitement par EVEROLIMUS ARROW ;
- si vous avez eu précédemment une hépatite B, car cette infection peut se réactiver au cours d'un traitement par EVEROLIMUS ARROW (voir la rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ») ;
- si vous avez reçu ou allez recevoir une radiothérapie.

EVEROLIMUS ARROW peut également :

- affaiblir votre système immunitaire. Ainsi, vous pouvez vous trouver exposé(e) au risque de contracter une infection pendant que vous prenez votre traitement par EVEROLIMUS ARROW ;
- avoir un effet sur votre fonction rénale. En conséquence, votre médecin surveillera votre fonction rénale au cours de votre traitement par EVEROLIMUS ARROW. Si vous avez de la fièvre, ou tout autre signe d'infection, vous devez consulter votre médecin. Certaines infections peuvent être graves et peuvent avoir des conséquences fatales ;
- provoquer essoufflement, toux et fièvre ;
- provoquer des ulcérations buccales et des lésions buccales. Votre médecin devra peut-être arrêter ou suspendre votre traitement par EVEROLIMUS ARROW. Vous pourriez avoir besoin d'un traitement à base de bains de bouche, de gels ou d'autres produits. Certains bains de bouche et gels peuvent aggraver les ulcérations, aussi, n'essayez aucun traitement sans avoir au préalable consulté votre médecin. Votre médecin pourrait prescrire à nouveau le traitement par EVEROLIMUS ARROW à la même dose ou à une dose plus faible ;
- provoquer des complications de la radiothérapie. Des complications sévères de la radiothérapie (telles que essoufflement, nausée, diarrhée, éruptions cutanées et douleur dans la bouche, les gencives et la gorge), y compris des cas mortels, ont été observés chez certains patients qui prenaient de l'évérolimus en même temps que la radiothérapie ou qui prenaient de l'évérolimus peu de temps après avoir reçu une radiothérapie. De plus, des phénomènes de rappel (comprenant rougeur cutanée ou inflammation pulmonaire au niveau d'un site précédemment irradié) ont été rapportés chez des patients ayant préalablement reçu une radiothérapie.

Informez votre médecin si vous prévoyez de recevoir une radiothérapie prochainement, ou si vous avez déjà reçu une radiothérapie.

Si vous ressentez ces symptômes, veuillez-en informer votre médecin.

Vous aurez régulièrement des contrôles sanguins pendant le traitement. Ils permettront de contrôler le taux de cellules sanguines (globules blancs, globules rouges et plaquettes) dans votre organisme pour savoir si EVEROLIMUS ARROW a des effets indésirables sur ces cellules. Des contrôles sanguins seront également pratiqués pour surveiller vos fonctions rénale (taux de créatinine) et hépatique (taux de transaminases) et votre taux de sucre dans le sang (glycémie) et de cholestérol parce qu'ils peuvent eux aussi être modifiés par EVEROLIMUS ARROW.

### Enfants et adolescents

EVEROLIMUS ARROW ne doit pas être utilisé chez l'enfant ou l'adolescent (en dessous de 18 ans).

### Autres médicaments et EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé

EVEROLIMUS ARROW peut interférer avec certains autres médicaments. Si vous prenez d'autres médicaments en même temps qu'EVEROLIMUS ARROW, il sera peut-être nécessaire que votre médecin modifie la dose d'EVEROLIMUS ARROW ou des autres médicaments.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Les médicaments suivants peuvent augmenter le risque d'effets indésirables avec EVEROLIMUS ARROW :

- le kétoconazole, l'itraconazole, le voriconazole ou le fluconazole et les autres antifongiques utilisés pour traiter les infections fongiques ;
- la clarithromycine, la télichromycine ou l'érythromycine, antibiotiques utilisés pour traiter certains types d'infections bactériennes ;
- le ritonavir et d'autres médicaments utilisés dans le traitement du SIDA (infection VIH) ;
- le vérapamil ou le diltiazem utilisés pour traiter les affections cardiaques ou l'hypertension ;
- la dronédarone, un médicament utilisé pour aider à réguler les battements de votre cœur ;
- la ciclosporine, un médicament utilisé pour empêcher l'organisme de rejeter les organes transplantés ;
- l'imatinib, utilisé pour inhiber la croissance de cellules anormales ;
- les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) (tel que ramipril) utilisés pour traiter une tension élevée du sang ou pour d'autres problèmes cardiovasculaires ;
- la néfazodone, utilisée pour traiter la dépression ;
- le cannabidiol, utilisé notamment pour le traitement des convulsions.

Les médicaments suivants peuvent réduire l'efficacité d'EVEROLIMUS ARROW :

- la rifampicine, utilisée pour traiter la tuberculose ;
- l'éfavirenz ou la névirapine, utilisés dans le traitement de l'infection VIH/SIDA ;
- le millepertuis (*Hypericum perforatum*), un produit à base de plante utilisé pour traiter la dépression et d'autres affections ;
- la dexaméthasone, un corticoïde utilisé pour traiter de nombreux types d'affections, incluant les troubles inflammatoires ou immunitaires ;
- la phénytoïne, la carbamazépine ou le phénobarbital et les autres anti-épileptiques utilisés pour faire cesser les convulsions ou les crises d'épilepsie.

Ces médicaments doivent être évités pendant le traitement par EVEROLIMUS ARROW. Si vous prenez l'un de ces médicaments, votre médecin le remplacera peut-être par un autre ou pourra modifier la dose d'EVEROLIMUS ARROW.

### **EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé avec des aliments et boissons**

Évitez de consommer du pamplemousse (ou également du jus de pamplemousse) pendant le traitement par EVEROLIMUS ARROW. Cela peut augmenter la quantité d'EVEROLIMUS ARROW dans le sang, potentiellement à un niveau dangereux.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

#### **Grossesse**

EVEROLIMUS ARROW peut nuire à votre fœtus et son utilisation pendant la grossesse n'est pas recommandée. Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, informez votre médecin qui vous expliquera quels sont les risques possibles si ce médicament est pris pendant la grossesse.

Les femmes qui peuvent débuter une grossesse doivent utiliser une méthode contraceptive hautement efficace pendant le traitement et jusqu'à 8 semaines après l'arrêt du traitement. Si malgré ces mesures, vous pensez que vous pouvez être enceinte, demandez conseil à votre médecin **avant** de reprendre EVEROLIMUS ARROW.

#### **Allaitement**

EVEROLIMUS ARROW peut nuire à votre nourrisson qui est nourri par le lait maternel. Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement et pendant les 2 semaines qui suivent la prise de la dernière dose d'EVEROLIMUS ARROW. Si vous allaitez, informez votre médecin.

#### **Fertilité féminine**

Une absence des règles (aménorrhée) a été observée chez certaines patientes recevant EVEROLIMUS ARROW. EVEROLIMUS ARROW peut avoir un effet sur la fertilité féminine. Prévenez votre médecin si vous souhaitez avoir un enfant.

#### **Fertilité masculine**

EVEROLIMUS ARROW peut avoir un effet sur la fertilité masculine. Prévenez votre médecin si vous souhaitez être le père d'un enfant.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Si vous vous sentez fatigué(e) de façon inhabituelle (la fatigue est un effet indésirable très fréquent), faites attention quand vous conduisez des véhicules et utilisez des machines.

#### **EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé contient du lactose**

EVEROLIMUS ARROW contient du lactose (sucre présent dans le lait). Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### **3. COMMENT PRENDRE EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 10 mg en une prise par jour. Votre médecin vous dira combien de comprimés d'EVEROLIMUS ARROW vous devez prendre.

Si vous avez des problèmes au foie, votre médecin pourra vous faire débuter le traitement à une dose plus faible d'EVEROLIMUS ARROW (2,5 mg, 5 mg ou 7,5 mg par jour).

Si vous présentez certains de ces effets indésirables au cours de votre traitement par EVEROLIMUS ARROW (voir rubrique 4), votre médecin pourra réduire la dose de votre traitement ou arrêter votre traitement pendant une courte durée ou définitivement.

Prenez EVEROLIMUS ARROW une fois par jour, au même moment de la journée tous les jours avec ou sans aliment de façon constante.

Avalez-le(s) comprimé(s) entier(s) avec un verre d'eau. Ils ne doivent pas être mâchés ou écrasés.

#### **Si vous avez pris plus d'EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé que vous n'auriez dû**

Si vous avez pris trop d'EVEROLIMUS ARROW, ou si une autre personne a pris accidentellement vos comprimés, consultez immédiatement votre médecin ou un hôpital. Un traitement médical d'urgence pourra être nécessaire.

Montrez la boîte de comprimés et cette notice pour que le médecin sache ce que vous avez pris.

#### **Si vous oubliez de prendre EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé**

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez la dose suivante comme prévu. Ne prenez pas de dose double pour compenser les comprimés que vous avez oublié de prendre.

#### **Si vous arrêtez de prendre EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé**

Vous ne devez pas arrêter de prendre EVEROLIMUS ARROW sans l'avis de votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

ARRETEZ de prendre EVEROLIMUS ARROW et demandez immédiatement l'aide d'un médecin si vous présentez l'un des signes de réaction allergique suivants :

- difficulté à respirer ou à avaler ;
- gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge ;
- démangeaisons sévères de la peau, avec une éruption rouge ou bosse rouge.

#### **Les effets indésirables graves d'EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé incluent :**

##### **Très fréquents (pouvant affecter plus de 1 patient sur 10)**

- augmentation de la température, frissons (signe d'une infection) ;
- fièvre, toux, difficulté à respirer, respiration sifflante (signes d'une inflammation des poumons, également connue sous le nom de pneumonie).

##### **Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10)**

- soif excessive, émission d'urine importante, augmentation de l'appétit avec une perte de poids (signes d'un diabète) ;
- saignement (hémorragie), par exemple dans la paroi intestinale ;
- diminution importante de l'émission d'urine (signe d'une défaillance rénale).

##### **Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100)**

- fièvre, éruption cutanée, douleur et inflammation des articulations, ainsi que fatigue, perte d'appétit, nausée, jaunisse (jaunissement de la peau), douleur dans la partie haute de l'abdomen du côté droit, selles pâles, urine foncée (peuvent être des signes de réactivation d'une hépatite B) ;
- essoufflement, difficulté à respirer en position allongée, gonflement des pieds ou des jambes (signes d'une défaillance cardiaque) ;
- gonflement et/ou douleur dans une des jambes, souvent dans le mollet, une rougeur ou une peau chaude dans la zone affectée (signes d'un blocage d'un vaisseau sanguin (veine) dans les jambes dû à un caillot de sang) ;
- survenue soudaine d'un essoufflement, douleur de la poitrine ou crachat de sang (signes potentiels d'une embolie pulmonaire, une maladie qui survient lorsqu'une ou plusieurs artères de vos poumons sont bloquées) ;
- diminution importante de l'émission d'urine, gonflement des jambes, sensation de confusion, douleur dans le dos (signes d'une défaillance soudaine de vos reins) ;
- éruption, démangeaison, urticaire, difficulté à respirer ou à avaler, étourdissement (signes d'une réaction allergique grave, également connue sous le nom d'hypersensibilité).

**Rares** (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000)

- essoufflement ou respiration rapide (signes d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë).

Si vous présentez l'un de ces effets indésirables, prévenez immédiatement votre médecin car ils peuvent avoir des conséquences sur votre survie.

**Les autres effets indésirables possibles d'EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé incluent :**

**Très fréquents** (pouvant affecter plus d'1 patient sur 10)

- taux élevé de sucre dans le sang (hyperglycémie) ;
- perte d'appétit ;
- sens du goût perturbé (dysgueusie) ;
- maux de tête ;
- saignement du nez (épistaxis) ;
- toux ;
- ulcérations de la bouche ;
- estomac dérangé incluant une sensation de mal au cœur (nausées) ou diarrhée ;
- éruption cutanée ;
- démangeaisons (prurit) ;
- sensation de faiblesse ou fatigue ;
- fatigue, essoufflement, étourdissement, pâleur cutanée, signes d'un taux faible de globules rouges (anémie) ;
- gonflement des bras, mains, pieds, chevilles ou d'une autre partie du corps (signes d'un œdème) ;
- perte de poids ;
- taux élevé de lipides (graisses) dans le sang (hypercholestérolémie).

**Fréquents** (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10)

- saignements spontanés ou bleus (signes d'un taux faible de plaquettes, également connu sous le nom de thrombopénie) ;
- essoufflement (dyspnée) ;
- soif, faible émission d'urine, urine foncée, peau rouge et sèche, irritabilité (signes de déshydratation) ;
- troubles du sommeil (insomnies) ;

- maux de tête, étourdissement (signe d'une tension artérielle élevée, également connue sous le nom d'hypertension) ;
- gonflement d'une partie ou de la totalité de votre bras (y compris les doigts) ou de votre jambe (y compris les orteils), sensation de lourdeur, mouvements restreints, inconfort (symptômes possibles d'un lymphœdème) ;
- fièvre, mal de gorge ou ulcération de la bouche dû à des infections (signes d'un taux faible de globules blancs, leucopénie, lymphopénie et/ou neutropénie) ;
- fièvre ;
- inflammation de la paroi intérieure de la bouche, de l'estomac, de l'intestin ;
- sécheresse buccale ;
- brûlure à l'estomac (dyspepsie) ;
- avoir mal au cœur (vomissements) ;
- difficulté à avaler (dysphagie) ;
- douleur abdominale ;
- acné ;
- éruption et douleur sur les paumes des mains et les plantes des pieds (syndrome mains-pieds) ;
- rougeur de la peau (érythème) ;
- douleur articulaire ;
- douleur buccale ;
- troubles menstruels tels que règles irrégulières ;
- taux élevé de lipides (graisses) dans le sang (hyperlipémie, triglycérides augmentés) ;
- taux faible de potassium dans le sang (hypokaliémie) ;
- taux faible de phosphate dans le sang (hypophosphatémie) ;
- taux faible de calcium dans le sang (hypocalcémie) ;
- sécheresse cutanée, desquamation, lésions cutanées ;
- troubles des ongles, ongles cassants ;
- légère perte des cheveux ;
- résultats anormaux des tests de la fonction hépatique dans le sang (augmentation de l'alanine et aspartate aminotransférase) ;
- résultats anormaux des tests de la fonction rénale dans le sang (augmentation de la créatinine) ;
- gonflement de la paupière ;
- protéines dans les urines.

**Peu fréquents** (*pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100*)

- faiblesse, saignements spontanés ou bleus et infections fréquentes avec des signes tels que fièvre, frissons, mal de gorge ou ulcérations dans la bouche (signes d'un taux faible de cellules dans le sang, également connu sous le nom de pancytopenie) ;
- perte des sensations du gout (agueusie) ;
- crachat de sang (hémoptysie) ;
- troubles menstruels tels qu'absence de règles (aménorrhée) ;
- émission d'urine plus fréquente pendant la journée ;

- douleur dans la poitrine ;
- cicatrisation des plaies anormale ;
- bouffées de chaleur ;
- écoulement oculaire avec démangeaisons et rougeurs, yeux roses ou rouges (conjonctivites).

**Rares** (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000)

- fatigue, essoufflement, étourdissements, pâleur cutanée (signes d'un taux faible de globules rouges dans le sang, éventuellement dû à un type d'anémie appelée érythroblastopénie) ;
- gonflement du visage, autour des yeux, de la bouche et à l'intérieur de la bouche et/ou de la gorge, ainsi que de la langue et difficulté à respirer ou avaler (également connu sous le nom d'œdème de Quincke), peuvent être des signes d'une réaction allergique.

**Fréquence indéterminée** (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- réaction au niveau d'un site précédemment irradié, par exemple rougeur cutanée ou inflammation pulmonaire (phénomène de rappel) ;
- aggravation des effets secondaires de la radiothérapie.

Si ces effets indésirables deviennent sérieux, informez votre médecin et/ou pharmacien. La plupart des effets indésirables sont légers à modérés et disparaissent généralement si votre traitement est interrompu pendant quelques jours.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :

[www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**5. COMMENT CONSERVER EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière.

Ouvrir la plaquette juste avant de prendre les comprimés.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez que l'emballage est endommagé ou a été ouvert.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

**6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

**Ce que contient EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé**

- La substance active est :

Everolimus.....2,5 mg  
Pour un comprimé

- Les autres composants sont : butylhydroxytoluène (E321), hypromellose, lactose monohydraté, crospovidone, lactose et stéarate de magnésium.

**Qu'est-ce que EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg, comprimé et contenu de l'emballage extérieur**

Comprimés oblongs de couleur blanche à blanc cassé mesurant 9.6 x 4.5 mm. Les comprimés portent la mention « 2.5 » sur une face et « E » sur l'autre face.

EVEROLIMUS ARROW 2,5 mg est présenté en boîtes de 30 ou 90 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

**EUGIA PHARMA (MALTA) LTD**

VAULT 14, LEVEL 2  
VALLETTA WATERFRONT  
FLORIANA, FRN 1914  
MALTE

**Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché****ARROW GENERIQUES**

26 AVENUE TONY GARNIER  
69007 LYON

**Fabricant****ETHYPHARM**

CHEMIN DE LA POUDRIERE  
76120 LE GRAND QUEVILLY

ou

**ETHYPHARM**

Z.I. DE SAINT ARNOULT  
28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

**Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants : Conformément à la réglementation en vigueur.**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM.