XXXXX/XX-X

**نشرة العبوة: معلومات للمستخدم**

أركوكسيا® ٣٠ ملجم - أقراص مغلّفة
أركوكسيا® ٦٠ ملجم - أقراص مغلّفة
أركوكسيا® ٩٠ ملجم - أقراص مغلّفة
أركوكسيا® ١٢٠ ملجم - أقراص مغلّفة

**إتوريكوكسيب**

**يُرجى قراءة هذه النشرة بأكملها بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك.**

- يُرجى الاحتفاظ بهذه النشرة. قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، فينبغي أن تسأل الطبيب أو الصيدلي.
- هذا الدواء موصوف لك على وجه الخصوص. لا تعطه للآخرين. قد يضر هذا الدواء الآخرين حتى لو كانوا يعانون من أعراض مثل التي تعاني منها.
- إذا أصبت بأي آثار جانبية، فينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي. يشمل هذا أي آثار جانبية ممكنة ليست مسرودة في هذه النشرة.

**محتويات هذه النشرة**


١- ما هو أركوكسيا وما دواعي استخدامه؟
٢- ما الذي ينبغي أن تعرفه قبل استخدام أركوكسيا؟
٣- كيفية تناول الدواء أركوكسيا
٤- الآثار الجانبية الممكنة
٥- كيفية تخزين الدواء أركوكسيا
٦- محتويات العبوة ومعلومات أخرى


## ١- ما هو أركوكسيا ؟ وما دواعي استخدامه؟

- ينتمي الدواء أركوكسيا إلى فئة من الأدوية تُسمى مثبطات كوكس-2 الانتقائية. وتنتمي هذه الفئة من الأدوية إلى فئة أخرى يُطلق عليها مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
- يساعد الدواء أركوكوسيا على تقليل الشعور بالألم والتورم (الالتهاب) في المفاصل والعضلات في مرضى الفصال العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الفقار المُقسِّط والنقرس.
- يُستخدم الدواء أركوكسيا أيضًا للعلاج قصير الأمد للألم المتوسط بعد جراحة الأسنان.

**ما المقصود بمرض الفصال العظمي؟**

الفصال العظمي مرض يُصيب المفاصل. ينتج هذا المرض عن التحلل التدريجي للغضروف الذي يغطي أطراف العظام. ويسبب هذا تورمًا (التهابًا) وألمًا وتيبسًا وعدم القدرة على الحركة.

**ما المقصود بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي؟**

التهاب المفاصل الروماتويدي عبارة عن مرض التهاب طويل الأمد يصيب المفاصل. يسبب هذا المرض الشعور بالألم والتيبس والتورم فقدان الحركة في المفاصل التي يصيبها. ويمكن أن يسبب أيضًا التهابًا في مناطق أخرى من الجسم.

**ما المقصود بمرض النقرس؟**

النقرس عبارة عن نوبات مفاجئة متكررة من الالتهاب المؤلم والاحمرار في المفاصل. تحدث هذه الحالة بسبب ترسب بلورات المعادن على المفاصل.

**ما المقصود بمرض التهاب الفقار المُقسِّط؟**

التهاب الفقار المقسط عبارة عن مرض التهابي يصيب العمود الفقري والمفاصل الكبيرة

## ٢- ما الذي ينبغي أن تعرفه قبل استخدام الدواء أركوكسيا؟

**موانع استخدام الدواء أركوكسيا:**

- في حالة فرط الحساسية تجاه مادة إتوريكوكسيب أو أي مكون آخر في الدواء أركوكسيا (انظر القسم 6 - معلومات إضافية)
- في حالة فرط الحساسية لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية بما فيها الأسبرين ومثبطات كوكس-2 (انظر القسم 4 - الآثار الجانبية الممكنة)
- في حالة الإصابة بقرحة معدية أو نزيف في المعدة أو الأمعاء
- في حالة الإصابة بمرض خطير في الكبد
- في حالة الإصابة بمرض خطير في الكلى
- في حالة الحمل أو احتمال حدوث حمل أو الرضاعة الطبيعية بالنسبة إلى النساء (انظر القسم "الحمل والرضاعة الطبيعية)
- إذا كان عمر المريض أقل من ١٦ سنة
- في حالة الإصابة بمرض التهاب الأمعاء مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي أو التهاب القولون
- إذا كان الطبيب قد شخَّص لديك مشاكل في القلب بما فيها فشل القلب (متوسط أو خطير) أو ذبحة صدرية (ألم شديد في الصدر) أو إذا قد أصبت بأزمة قلبية أو أجريت لك جراحة تحويلية، أو إذا كنت مصابًا بمرض في الشرايين المحيطية (ضعف الدورة الدموية في الأرجل أو الأقدام بسبب ضيق أو انسداد الشرايين) أو أي نوع من السكتة (بما في ذلك السكتة الدماغية الصغيرة أو نوبة إقفارية عابرة (نوبة عدم التروية العابرة)). قد تؤدي مادة إتوريكوكسيب إلى زيادة طفيفة في التعرض لنوبات قلبية وسكتة دماغية ، ولذا ينبغي عدم استخدامها من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشكل في القلب أو سكتات. دماغية
- إذا كنت تعاني من فرط ضغط الدم الذي لم يتم السيطرة عليه بالعلاج (راجع الطبيب أو الممرضة لمعرفة فعالية السيطرة على ضغط الدم لديك)

إذا كنت تظن أن أيًا من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، فلا تأخذ هذه الأقراص حتى تستشير الطبيب.

**التحذيرات والاحتياطات**

ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أركوكسيا في الحالات التالية:

- في حالة الاصابة السابقة بنزيف أو قرحات في المعدة.
- في حالة الجفاف بسبب القيء أو السهال لمدة طويلة.
- في حالة الإصابة بتورم بسبب احتباس السوائل في الجسم.
- وجود اصابة سابقة بفشل القلب أو أي مرض آخر من أمراض القلب.
- وجود اصابة سابقة بضغط الدم المرتفع. يمكن أن يؤدي أركوكسيا إلى رفع ضغط الدم في بعض الأشخاص، خصوصًا عند تناول جرعات عالية منه، وينبغي أن يقوم الطبيب بفحص ضغط الدم لديك من وقت لآخر.
- وجود تاريخ بمرض كبدي أو كلوي.
- في حالة العلاج من عدوى. يمكن أن يخفي أركوكسيا الحمى التي تُعد علامة على وجود عدوى.
- في حالة الرغبة في الحمل بالنسبة إلى الإناث.
- الشيخوخة (فوق ٦٥ سنة).
- الإصابة بمرض السكري أو زيادة الكوليسترول أو التدخين. يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة احتمال التعرض لمرض القلب.

في حالة عدم التأكد من وجود أي من الحالات المذكورة أعلاه لديك، **ينبغي استشارة الطبيب قبل استخدام أركوكسيا** للتأكد منّ ملاءمة هذا الدواء لحالتك.

يعمل الدواء أركوكسيا بشكل جيد في كبار السن وفي الشباب على حد سواء. إذا كنت كبيرًا في السن (أي فوق ٦٥ سنة)؛ فينبغي للطبيب مراقبة حالتك باستمرار قدر المستطاع. لا حاجة إلى تعديل الجرعة للمرضى كبار السن.

**الأطفال والمراهقون**

لا يُعط هذا الدواء للأطفال والمراهقين تحت ١٦ سنة.

**التفاعلات مع أدوية اخرى**

يُرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول حاليًا - أو تناولت مؤخرًا - أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تحصل عليها دون وصفة طبية.

في حالة استخدام أي من الأدوية التالية تحديدًا؛ ينبغي للطبيب مراقبة حالتك للتأكد من فعالية الأدوية التي تستخدمها عند البدء في استخدام الدواء أركوكسيا:

- الأدوية التي ترقق الدم (مضادات التخثر) مثل وارفارين
- ريفاميبسين (مضاد حيوي)
- ميثوتريكسات (دواء يُستخدم لتثبيط الجهاز المناعي، ويُستخدم غالبًا في حالة التهاب المفاصل الروماتويدي)
- الأدوية المستخدمة للسيطرة على ضغط الدم المرتفع وفشل القلب وتسمى مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسن وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسن، مثل إنالابريل وراميبريل ولوزارتان وفالسارتان.
- الليثيوم (دواء يُستخدم لعلاج بعض أنواع الاكتئاب)
- مدرات البول
- سيكلوسبورين أو تاكروليموس (أدوية تُستخدم لتثبيط جهاز المناعة)
- ديجوكسين (دواء لعلاج فشل القلب واضطراب ضربات القلب)
- ميفوكسيديل (دواء لعلاج ضغط الدم المرتفع)
- سالبوتامول أقراص أو محلول فموي (دواء لعلاج الربو)
- حبوب منع الحمل
- العلاج التعويضي بالهرمونات
- الأسبرين، علمًا بأن احتمال التعرض لقرحات المعدة يزداد مع استخدام أركوكسيا مع الأسبرين.
  - يمكن استخدام أركوكسيا مع جرعات منخفضة من الأسبرين. إذا كنت تستخدم جرعة منخفضة من الأسبرين حاليًا للوقاية من النوبات القلبية أو السكتة، فينبغي عدم التوقف عن تناول الأسبرين إلا بعد استشارة الطبيب في ذلك.
  - لا تأخذ جرعة عالية من الأسبرين أو مضادات الالتهابات الأخرى أثناء استخدام أركوكسيا.

**الحمل والرضاعة الطبيعية**

يجب عدم استخدام أقراص أركوكسيا أثناء الحمل. إذا كانت المريضة حاملاً أو تظن أنها حامل، أو إذا كانت تخطط للحمل؛ فينبغي ألا تأخذ هذه الأقراص. في حالة حدوث حمل، يجب التوقف عن استخدام هذه الأقراص واستشارة الطبيب. يجب استشارة الطبيب في حالة عدم التأكد من أو حدوث الحمل الحاجة إلى مزيد من النصائح والمعلومات.

افراز اركوكسيا في حليب الثدي غير مؤكد. ينبغي استشارة الطبيب في حالة الرضاعة الطبيعية أو التخطيط للرضاعة الطبيعية قبل استخدام أركوكسيا. في حالة استخدام أركوكسيا؛ يجب التوقف عن الرضاعة الطبيعية.

**تناول أركوكسيا مع الطعام والشراب**

قد يتسارع مفعول أركوكسيا عند تناوله من دون طعام.

**قيادة المركبات واستخدام الآلات**

تم الإبلاغ عن حدوث دوار ونعاس في بعض المرضى الذين يستخدمون أركوكسيا.
يجب عدم القيادة إذا كان المريض يُصاب بدوار أو نعاس.
يجب عدم استخدام أي أدوات أو آلات إذا كان المريض يُصاب بدوار أو نعاس.

**يحتوي أركوكسيا على اللاكتوز**

إذا كان الطبيب قد أخبرك أنك لا تتحمل بعض أنواع السكر، فاتصل بالطبيب قبل تناول هذا الدواء.

## ٣- كيفية تناول الدواء أركوكسيا

ينبغي استخدام هذا الدواء حسب إرشادات الطبيب دائمًا. ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة عدم التأكد من كيفية الاستخدام.

يجب عدم استخدام أركوكسيا في الأطفال أو المراهقين تحت ١٦ سنة.

تؤخذ أقراص أركوكسيا عن طريق الفم مرة واحدة في اليوم. يمكن تناول أقراص أركوكسيا مع الطعام أو بدون الطعام.

لا تأخذ أكثر من الجرعة الموصى بها لحالتك. ينبغي للطبيب أن يناقش معك نظام العلاج من وقت لآخر. من المهم استخدام أقل جرعة تحقق السيطرة على الألم وعدم استخدام أقراص أركوكسيا لمدة أطول من اللازم. وذلك لأن احتمال الإصابة بنوبات قلبية أو سكتات دماغية قد يزيد بعد استخدام العلاج لفترة طويلة، خصوصًا مع الجرعات العالية.

الفصال العظمي
الجرعة الموصى بها هي ٣٠ ملجم مرة واحدة في اليوم، وتزيد إلى ٦٠ ملجم كحد أقصى مرة واحدة في اليوم عند اللزوم.

التهاب المفاصل الروماتويدي
الجرعة الموصى بها هي ٩٠ ملجم مرة واحدة يوميًا.

التهاب الفقار المقسط
الجرعة الموصى بها هي ٩٠ ملجم مرة واحدة يوميًا.

حالات الألم الحاد
ينبغي استخدام مادة إتوريكوكسيب خلال فترة الألم الحاد فقط.

النقرس
الجرعة الموصى بها هي ١٢٠ ملجم مرة واحدة في اليوم في حالة الألم الحاد فقط وتقتصر على ٨ أيام كحد أقصى للعلاج.

الألم بعد جراحة الأسنان
الجرعة الموصى بها هي ٩٠ ملجم مرة واحدة في اليوم وتقتصر على ٣ أيام كحد أقصى للعلاج.

**المرضى المصابون بأمراض في الكبد**

- في حالة الإصابة بمرض كبدي بسيط، ينبغي ألا تزيد الجرعة عن ٦٠ ملجم في اليوم.
- في حالة الإصابة بمرض كبدي **متوسط**، ينبغي ألا تزيد الجرعة عن **٣٠ ملجم في اليوم**.

**في حالة تناول جرعة زائدة من أركوكسيا**

ينبغي عدم تناول أقراص زائدة عن الجرعة التي أوصى بها الطبيب. وفي حالة تناول جرعة زائدة عن التي أوصى بها الطبيب
من أقراص أركوكسيا، ينبغي طلب العناية الطبية الفورية.

**في حالة نسيان جرعة أركوكسيا**

من المهم تناول أقراص أركوكسيا حسب تعليمات الطبيب. ولكن إذا نسيت جرعة، فكل ما عليك أن تواصل تناول الجرعة حسب الجدول المعتاد في اليوم التالي. لا تتناول جرعة مزدوجة لتعويض الجرعة الفائتة.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى بشأن استخدام هذا الدواء، فينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

## ٤.الآثار الجانبية الممكنة

مثل كل الأدوية، يمكن أن يسبب أركوكسيا آثارًا جانبية، وإن كانت لا تحدث في جميع الأشخاص الذين يستخدمونه.

**في حالة الإصابة بأيٍ من هذه الأعراض؛ يجب التوقف عن تناول أركوكسيا واستشارة الطبيب على الفور:**

- حدوث ضيق التنفس أو ألم في الصدر أو تورم الكاحل، أو تفاقم هذه الحالات
- اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان) - علامات على مشاكل في الكبد
- ألم شديد أو مستمر في المعدة أو إخراج براز أسود اللون
- أعراض رد الفعل التحسسي التي قد تشمل مشكلات جلدية مثل القرحات أو التنفط، أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق مما قد يسبب صعوبة في التنفس

يعتمد مدى تكرار الآثار الجانبية الممكنة المسرودة أدناه على استخدام القاعدة التالية:
آثار شائعة جدًا (تؤثر في أكثر من شخص واحد من كل ١٠ أشخاص)
آثار شائعة (تؤثر في شخص واحد حتى ١٠ أشخاص من كل ١٠٠ شخص)
آثار غير شائعة (تؤثر في شخص واحد حتى ١٠ أشخاص من كل ١٠٠٠ شخص)
آثار نادرة (تؤثر في شخص واحد حتى ١٠ أشخاص من كل ١٠٠٠٠ شخص)
آثار نادرة جدًا (تؤثر في أقل من شخص واحد من كل ١٠٠٠٠ شخص)
يمكن أن تحدث الآثار الجانبية التالية أثناء العلاج بأقراص أركوكسيا:

**شائعة جدًا**

- ألم في المعدة

**شائعة**

- (التهاب وألم بعد خلع أسنان)
- تورم القدمين و/أو الرجلين بسبب احتباس السوائل (وذمة)
- دوار، صداع
- خفقان (سرعة نبض القلب أو عدم انتظامه)،
- ارتفاع ضغط الدم.
- صفير أو ضيق في التنفس (تشنج قصبي)
- إمساك، نفخة (غازات مفرطة)، التهاب المعدة (التهاب بطانة المعدة)، حرقة المعدة، إسهال، عسر هضم، غثيان، قيء، التهاب في المريء، وقرحة الفم
- تغيرات في نتائج فحوص الدم المرتبطة بالكبد
- كدمات
- ضعف وتعب وأعراض مشابهة للأنفلونزا

**غير شائعة**

- التهاب المعدة والأمعاء (التهاب القناة الهضمية التي تشمل المعدة والأمعاء الدقيقة)، وعدوى الجهاز التنفسي العلوي، وعدوى المسالك البولية
- نقص عدد خلايا الدم الحمراء، نقص عدد خلايا الدم البيضاء، نقص الصفيحات
- فرط الحساسية (رد فعل تحسسي يشمل الشرى الذي قد يكون خطيرًا لدرجة تستدعي العناية الطبية الفورية)
- قوة الشهية أو ضعفها، زيادة الوزن
- قلق، اكتئاب، ضعف القوة الذهنية، رؤية أو سماع أو شعور بأشياء غير موجودة في الحقيقة (هلوسة)
- تغير في المذاق، عدم القدرة على النوم، خدر أو وخز، نعاس
- عدم وضوح الرؤية، تهيج العين واحمرارها
- طنين في الأذن، دوار
- اضطراب نظم القلب (رجفان أذيني)، سرعة نبض القلب، فشل القلب، شعور بالضيق، ضغط أو ثقل في الصدر (ذبحة صدرية)، نوبة قلبية
- هبات حرارة، سكتة، سكتة صغيرة (نوبة عدم تروية عابرة)، ارتفاع حاد في ضغط الدم. التهاب الأوعية الدموية
- سعال، انقطاع التنفس، نزيف من الأنف
- نفخة المعدة أو الأمعاء، تغيرات في عادة الإخراج، جفاف الفم، قرحة المعدة، التهاب بطانة المعدة الذي قد يصبح خطيرًا وقد يؤدي إلى نزيف ومتلازمة القولون المتهيج، التهاب البنكرياس
- تورم الوجه، طفح جلدي أو حكة في الجلد، احمرار الجلد
- تقلصات/تشنجات عضلية، ألم/تيبس العضلات
- ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم، تغيرات في نتائج فحوص الدم أو البول المرتبطة بالكلى، مشكلات كلوية خطيرة
- ألم في الصدر

**نادرة**

- وذمة وعائية (رد فعل تحسسي مع تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان و/ أو الحلق مما قد يسبب صعوبة في التنفس أو البلع، وقد تكون خطيرة لدرجة تستدعي العناية الطبية الفورية) تفاعلات تأقية/ شبه تحسسية بما في ذلك صدمة (رد فعل تحسسي خطير يستدعي عناية طبية فورية)
- ارتباك، عدم ارتياح
- مشكلات كبدية (التهاب الكبد)
- انخفاض مستويات الصوديوم
- فشل الكبد، اصفرار الجلد و/أو العينين (يرقان)
- ردود فعل جلدية تحسسية شديدة

إذا أُصبت بأي من الآثار الجانبية، فينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي. يشمل هذا أي آثار جانبية ممكنة ليست مسرودة في هذه النشرة.

## ٥- كيفية تخزين الدواء أركوكسيا

يُخزن في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية.

يجب حفظ هذا الدواء بعيدًا عن متناول الأطفال ونظرهم.

لا تستخدم أقراص أركوكسيا بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المكتوب على العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر المكتوب.

الشرائط: تُخزَّن في العبوة الأصلية لحمايتها من الرطوبة.

لا تتخلص من أي أدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لا تحتاج إليها. ستساعد هذه التدابير على حماية البيئة.

## ٦- محتويات العبوة ومعلومات أخرى

**محتويات الدواء أركوكسيا**

- المادة الفعالة هي إتوريكوكسيب. يحتوي كل قرص مغلف على مادة إتوريكوكسيب بتركيزات ٣٠ ملجم او ٦٠ ملجم أو ٩٠ ملجم أو ١٢٠ ملجم.
- المكونات الأخرى هي:

القرص: فوسفات هيدروجين الكالسيوم (لا مائي)، صوديوم كروس كارميلوز، ستيرات ماغنيسيوم، سيلولوز دقيق البلورات.
غلاف القرص: شمع كرنوبا، أحادي هيدرات اللاكتوز، هيبروميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم (إي١٧١)، ترايكتين. تحتوي الأقراص بتراكيز ٣٠ و ٦٠ و١٢٠ ملجم على أكسيد حديد أصفر (إي١٧٢، عامل تلوين) ومادة انديجو كارمين ليك (إي١٣٢، عامل تلوين).

**أشكال أقراص أركوكسيا ومحتويات العبوة**

تتوفر أقراص أركوكسيا في ثلاثة تركيزات:

٣٠ ملجم: قرص على شكل تفاحة مغطى بطبقة رقيقة خضراء اللون، محدب من الجانبين، و ومنقوش على أحد جانبي القرص عبارة "ACX 30 " وعلى الجانب الآخر الرقم "101".

٦٠ ملجم: قرص على شكل تفاحة مغطى بطبقة رقيقة خضراء اللون محدب من الجانبين، ومنقوش على أحد جانبي القرص عبارة "ARCOXIA 60" وعلى الجانب الآخر الرقم "200".

٩٠ ملجم: قرص على شكل تفاحة مغطى بطبقة رقيقة بيضاء اللون محدب من الجانبين ، ومنقوش على أحد جانبي القرص عبارة "ARCOXIA 90" وعلى الجانب الآخر الرقم "202".

١٢٠ ملجم: قرص على شكل تفاحة مغطى بطبقة رقيقة بلون أخضر فاتح محدب من الجانبين، ومنقوش على أحد جانبي القرص عبارة "ARCOXIA 120" وعلى الجانب الآخر الرقم "204".

أحجام العبوة:
٣٠ ملجم:
توجد عبوات تحتوي على قرصين، ٧أقراص، ١٤قرصًا، ٢٠قرصًا، ٢٨قرصًا، ٤٩ قرصًا أوعبوات متعددة تحتوي على ٩٨ قرصًا (محتوى كل منها ٤٩قرصًا) في شرائط .
٦٠،٩٠، ١٢٠ملجم:
توجد عبوات تحتوي على قرصين، ٥أقراص، ٧أقراص، ١٠أقراص، ١٤قرصًا، ٢٠قرصًا، ٢٨قرصًا، ٣٠ قرصًا، ٥٠ قرصًا، ٨٤قرصًا، ١٠٠ قرصًا، أوعبوات متعددة تحتوي على ٩٨ قرصًا (محتوى كل منها ٤٩قرصًا) في شرائط منفطة، أو ٣٠ و٩٠ قرصًا في زجاجات بها أكياس مجففة. تُستخدم الأكياس المجففة (كيس أو كيسان) الموجودة في الزجاجة للمحافظة على جفاف الأقراص؛ ويجب عدم بلع محتوى تلك الأكياس المجففة.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

**الشركة المالكة لحقوق التسويق**
ميرك شارب و دوم المحدودة،
طريق هيرتفورد، هوديسدون،
هيرتفوردشاير، إي إن ١١ ٩ بي يو،
المملكة المتحدة

**الشركة المصنعة:**
فروست أيبريكا أس أيه
عبر طريق جامعة كمبلوتنسي ١٤٠
٢٨٨٠٥ الكالا دي إيناريس
مدريد، إسبانيا

**يتم اصدار التشغيلة من قبل:**
ميرك شارب و دوم بي. في.،
واردرويج ٣٩،
بي ان هارلم،٢٠٣١
هولندا

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في مارس ٢٠١٣.

(هذا المنتج مستحضر دوائي)

- المستحضر الدوائي هو منتج يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافًا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب، وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلاني الذي باع لك هذا المستحضر الدوائي.
- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران في مجال الأدوية، وهما على دراية بفوائدها ومضارها.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر نفس الوصفة دون استشارة الطبيب.

احفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيادلة العرب

ARCOXIA PIL.ACX.13.UK/IRL.3849 (II-057_IA-170/G_IA-206/G)

MSD