

**نشرة العبوة: معلومات المُستخدِم**

- أر كوكسيا ٦٠ مجم أقراص مُغلّفة
- أر كوكسيا ٩٠ مجم أقراص مُغلّفة
- أر كوكسيا ١٢٠ مجم أقراص مُغلّفة
- إيتوريكوكسيب

**يرجى قراءة هذه النشرة كاملة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء؛ لأنها تحتوي على معلومات هامة بالبنسبة لك.**

- احتفظ بهذه النشرة؛ فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك المزيد من الأسئلة، فاستشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.
- تم وصف هذا الدواء لك وحده، فلا تُعطه لآخرين؛ فقد يضر بهم، حتى إذا كانوا يُعانون من نفس علامات المرض التي تعانى أنت منها.
- إذا ظهرت لديك أية آثار جانبية، فتحدّث إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك؛ بما في ذلك أية آثار جانبية مُحتملة غير المدرجة في هذه النشرة - انظر قسم ٤.

**ما هي محتويات هذه النشرة؟**

1. ما هو عقار أر كوكسيا؟ وقيم يُستخدَم؟
2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار أر كوكسيا؟
3. كيفية تناول عقار أر كوكسيا.
4. الآثار الجانبية المُحتملة.
5. كيفية تخزين عقار أر كوكسيا.
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى.

**1. ما هو عقار أر كوكسيا؟ وقيم يُستخدَم؟**

- ما هو عقار أر كوكسيا؟**
- يحتوي عقار أر كوكسيا على المادة الفعّالة إيتوريكوكسيب. عقار أر كوكسيا هو واحد من مجموعة أدوية تُسمى مثبّطات إنزيم الأكسدة الحلقية-2 (سيكلوأكسجيناز) الانتقائية (COX-2). تنتمي هذه الأدوية إلى فئة تُسمى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

**قيم يُستخدَم عقار أر كوكسيا؟**

- يُساعد عقار أر كوكسيا على الحد من الألم والتورّم (الالتهاب) في مفاصل وعضلات الأشخاص الذين يبلغون من العُمُر ١٦ عامًا فأكثر، والمصابين بالتهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الفقار اللاصق ومرض الفرس.
- يُستخدَم أيضًا عقار أر كوكسيا لعلاج قصير الأمد للألم المتوسط بعد جراحة الأسنان في الأشخاص الذين يبلغون من العُمُر ١٦ عامًا فأكثر.

**ما هو مرض التهاب المفاصل؟**

مرض التهاب المفاصل هو مرض بالمفاصل، ينتج عن التخلُّل التدريجي للغضروف المسنول عن تخفيف الاحتكاك بين نهايات العظام، وهذا يُسبب تورُّمًا (التهابًا)، الماء، أوجاعًا، تصلبًا وإعاقة.

**ما هو التهاب المفاصل الروماتويدي؟**

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي طويل الأمد بالمفاصل، يُسبب هذا المرض: الألم، تصلبًا، تورُّمًا، وفقدانًا مزمانيًا للحركة في المفاصل التي يصيبها المرض، قد يُسبب أيضًا التهابًا في مناطق أخرى بالجسم.

**ما هو مرض الفرس؟**

الفرس هو مرض يحدث في هيئة نوبات مفاجئة ومتكررة من الالتهاب المؤلم للغاية والأحمرار في المفاصل، ينجم عن ترسبات بلورات معدنية في المفصل.

**ما هو التهاب الفقار اللاصق؟**

التهاب الفقار اللاصق هو مرض التهابي بالعمود الفقري والمفاصل الكبيرة.

**2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار أر كوكسيا؟**

- لا تتناول عقار أر كوكسيا في الحالات الآتية:**
- إذا كنت تعاني من الحساسية (فرط الحساسية) تجاه إيتوريكوكسيب، أو أيّ من مكونات هذا الدواء (المُدرجة في قسم 6).
- إذا كنت مصابًا بحساسية تجاه مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، بما في ذلك الأسبرين ومثبّطات الأكسدة الحلقية-2 (انظر "الآثار الجانبية المُحتملة"، قسم ٤).
- إذا كنت مصابًا حاليًا بقرحة في المعدة أو نزيف في المعدة أو الأمعاء.
- إذا كان لديك مرض شديد بالكبد.
- إذا كنت مصابًا بمرض شديد بالكلى.
- إذا كنت حاملًا أو قد تصابين حاملًا أو كنت ترضعين (انظر "الحمل والرضاعة الطبيعية والخصوبة").
- إذا كنت بعمر أقل من ١٦ عامًا.
- إذا كنت مصابًا بمرض التهابي بالأمعاء، مثل: مرض كرون، أو التهاب القولون التَّوحي، أو التهاب القولون.
- إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم الذي لم يتم التحكم به عن طريق العلاج (راجع مع الطبيب أو الممرض/ة الخاص بك، إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان ضغط الدم لديك يتم المُتحكم به بشكل كافٍ لا).
- إذا قام طبيبك بتخصيص إصابتك بمشاكل في القلب بما في ذلك فشل القلب (من النوع المعتدل أو الشديد)، أو نبضة صدرية (آلم بالصدر).
- إذا كنت قد أصيبت بنوبة قلبية، أو خضعت لجراحة مجازة للشرايين التاجية، أو مرض بشريان طرقي (ضعف الدورة الدموية في الشفتين أو القدمين نتيجة تضيق أو انسداد الشرايين).
- إذا كنت قد أصيبت بأي من أنواع السكتة الدماغية (بما في ذلك السكتة الدماغية الصغرى أو نوبة إقفارية عابرة).

قد يُزيد إيتوريكوكسيب بشكل طفيف من نسبة خطورة الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية؛ ولذا يجب عدم استخدامه في أولئك الذين أصيبوا بالفعل بمشاكل بالقلب أو سكتة دماغية. إذا اعتقدت أن أيًا من هذه الحالات ذو صلة بك، فلا تتناول الأقراص حتى تستشير طبيبك.

**تحذيرات واحتياطات**

- تحدّث إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول عقار أر كوكسيا في الحالات الآتية:
- إذا كان لديك تاريخ مرضي من الإصابة بنزيف المعدة أو تقرحات المعدة.
- إذا كنت مصابًا بحمى، على سبيل المثال: نوبة طويلة من القيء أو الإسهال.
- إذا كنت مصابًا بتورُّم نتيجة احتباس السوائل.
- إذا كان لديك تاريخ مرضي من فشل القلب، أو أي شكل آخر من أمراض القلب.
- إذا كان لديك تاريخ مرضي من الإصابة بارتفاع ضغط الدم. يُمكن أن يرفع عقار أر كوكسيا ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، لا سيما عند تناوله بجرعات مرتفعة، وسيرغب طبيبك في فحص ضغط الدم لديك من حين لآخر.
- إذا كان لديك أيّ تاريخ مرضي من الإصابة بمرض بالكبد أو الكلى.
- إذا كان يتم علاجك من عدوى، يُمكن أن يحجب عقار أر كوكسيا أو يخفي إصابتك بحمى، والتي تُعدّ إحدى علامات العدوى.
- إذا كنت مصابًا بمرض الشَّكْرِي أو ارتفاع نسبة الكوليسترول أو كنت مدخنًا، يُمكن أن تزيد هذه الحالات من نسبة خطورة إصابتك بمرض بالقلب.
- إذا كنت سيده تحاول أن تصحب حاملًا.
- إذا كنت أكبر من ٦٥ عامًا.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان ينطبق عليك أيّ ما سبق، **فِرْجِي التحدّث إلى طبيبك قبل تناول عقار أر كوكسيا** لمعرفة ما إذا كان هذا الدواء مناسبًا لك أم لا.

يتمل عقار أر كوكسيا بشكل جيد في المرضى من البالغين من كبار السن والأصغر سنًا على قدم المساواة؛ إذا كان عمرك يزيد على ٦٥ عامًا، فقد يحتاج طبيبك إلى إجراء فحوصات مُنتظمة لك. لا يستلزم الأمر تعديل الجرعة للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عامًا.

**الأطفال والمراهقون**

لا يعطى هذا الدواء للأطفال والمراهقين الأقل من ١٦ عامًا.

**تناول عقار أر كوكسيا مع أدوية أخرى**

- يُرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أية أدوية أخرى، بما في ذلك أية أدوية أخرى حصلّنت عليها دون وصفة طبية.
- بمجرد بدء تناولك لعقار أر كوكسيا، فقد يرغب طبيبك في مراقبتك؛ إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية الآتية على وجه الخصوص لتلك من عمل تلك الأدوية بشكل صحيح، وهي كالتالي:
- أدوية سيولة الدم (مضادات التجلُّط)، مثل: وارفارين.
- ريفامبين (مضاد حيوي).
- ميثوتريكسات (عقار يُستخدَم لتثبيط الجهاز المناعي، وغالبًا يُستخدَم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي).
- سيكلوسبورين أو تاكلروليموس (أدوية تُستخدَم لتثبيط الجهاز المناعي).
- التيوم (دواء يُستخدَم لعلاج بعض أنواع من الالتهاب).
- الأدوية التي تُستخدَم للمساعدة على ضبط ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، والتي تُدعى مثبّطات إنزيم تحوّل الأحيوتستين (ACE) وحاصرات مستقبلات الأحيوتستين، تشمل الأمثلة: الإلزابريل ورامبيريل ولوسارتان وفالسارتان.
- مدرات البول (أقراص الماء).
- ديجوكسين (دواء لعلاج فشل القلب وعدم انتظام النَظْم القلبي).
- مينوكسيديل (يُستخدَم لعلاج ارتفاع ضغط الدم).
- ساليواتمول أقراص أو محلول للتنازل عن طريق الفم (دواء لعلاج الربو).
- حلاب منع الحمل (قد يُزيد التناول المتزامن من نسبة خطورة إصابتك بآثار جانبية).
- جواب بالهرمونات الستيرويدية (قد تُزيد التركيبة من نسبة خطورة إصابتك بآثار جانبية).

الأسبرين، تكون نسبة خطورة الإصابة بقرح في المعدة أكبر إذا تناولت عقار أر كوكسيا مع الأسبرين.

- الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية؛
- يُمكن تناول عقار أر كوكسيا مع **جرعة منخفضة** من الأسبرين، إذا كنت تتناول حاليًا جرعة منخفضة من الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية، فيجب ألا تتوقف عن تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي تتحدّث إلى طبيبك.
- الأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى:

لا تتناول **جرعة مرتفعة** من الأسبرين أو الأدوية الأخرى المضادة للالتهاب أثناء تناول عقار أر كوكسيا.

**تناول عقار أر كوكسيا مع الأطعمة والمشروبات**

قد يكون ظهور تأثير عقار أر كوكسيا أسرع عند تناوله دون طعام.

**الحمل والرضاعة الطبيعية والخصوبة****الحمل**

يجب عدم تناول عقار أر كوكسيا أثناء فترة الحمل. إذا كنت حاملًا أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملًا، أو إذا كنت تخططين للحمل، فلا تتناولي الأقراص، إذا أصبحت حاملًا، فتوقفي عن تناول العقار واستشري طبيبك. استشري طبيبك إذا كنت غير متأكدة أو تحتاجين إلى المزيد من المشورة.

**الرضاعة الطبيعية**

من غير المعروف ما إذا كان يتم إفراز عقار أر كوكسيا في لبن الأم أم لا. يجب عليك استشارة طبيبك قبل تناول عقار أر كوكسيا إذا كنت ترضعين أو تتوين الرضاعة الطبيعية. إذا كنت تستخدمين عقار أر كوكسيا، فيجب ألا تمارسي الرضاعة الطبيعية.

**الخصوبة**

لا يُوصى باستخدام عقار أر كوكسيا في السيدات اللاتي يحاولن الحمل.

**القيادة واستخدام الآلات**

تم الإبلاغ عن حدوث دوخة وعدماس لدى بعض المرضى الذين يتناولون عقار أر كوكسيا.

لا تمارس القيادة إذا تعرّضت لدوخة أو غُماس.

لا تستخدم أي أدوات أو الآلات إذا تعرّضت لدوخة أو غُماس.

**يحتوي عقار أر كوكسيا على سكر اللاكتوز.**

إذا كان طبيبك قد أخبرك بأنك لا تتحمل بعض أنواع السكريات، فاقصّل به قبل تناول هذا المنتج التواني.

**3. كيفية تناول عقار أر كوكسيا**

تناول دائمًا هذا الدواء كما أخبرك طبيبك بالضبط؛ يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تناولك.

لا تتناول أكثر من الجرعة الموصى بها اليك. سيرغب طبيبك في مناقشة علاجك من حين إلى آخر؛ فمن الهام استخدام أدنى جرعة تضبط الألم لديك، ويجب عدم استخدام عقار أر كوكسيا لوقت أطول من اللازم؛ هذا لأن نسبة خطورة الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية قد تترفع بعد العلاج لفترة طويلة، خاصة إذا كان العلاج بجرعات مرتفعة. هناك تركيزات مختلفة متاحة لهذا المنتج التواني ووفقًا لمرضك سيوصف لك طبيبك تركيز الفرص المناسب لك.

**الجرعة الموصى بها هي كالتالي:****الالتهاب العظمي المفصلي**

الجرعة الموصى بها هي ٣٠ إلى ٦٠ ملغ مرة في اليوم.

**التهاب المفاصل الروماتويدي**

الجرعة الموصى بها هي ٦٠ مجم مرة واحدة في اليوم، ويتم زيادتها إلى ٩٠ مجم مرة واحدة في اليوم بحد أقصى إذا اقتضى الأمر.

**التهاب الفقار اللاصق**

الجرعة الموصى بها هي ٦٠ مجم مرة واحدة في اليوم، ويتم زيادتها إلى ٩٠ مجم مرة واحدة في اليوم بحد أقصى إذا اقتضى الأمر.

**حالات الألم الحاد**

يجب أن يُستخدَم عقار إيتوريكوكسيب للعلاج في فترة الألم الحاد فقط.

**مرض الفرس**

الجرعة الموصى بها هي ١٢٠ مجم مرة واحدة في اليوم، ويجب استخدامها فقط خلال فترة الألم الحاد، وتقتصر على حد أقصى ٨ أيام من العلاج.

**الألم التالي للخضوع لعملية جراحية في الأسنان**

الجرعة الموصى بها هي ٩٠ مجم مرة واحدة يوميًا، وتقتصر على حد أقصى ٣ أيام من العلاج.

**الأشخاص المصابون بمشاكل في الكبد**

إذا أصيبت بمرض خفيف في الكبد، فيجب ألا تتناول أكثر من ٦٠ مجم في اليوم. إذا أصيبت بمرض معتدل في الكبد، يجب ألا تتناول أكثر من ٦٠ ملغ كل يومين أو 30 ملغ كل يوم.

**الاستعمال في الأطفال والمراهقين**

يجب ألا يتم إعطاء عقار أر كوكسيا للأطفال والمراهقين الأقل من ١٦ عامًا.

**المرضى من كبار السن**

لا يستلزم الأمر تعديل الجرعة في المرضى من كبار السن، كما هو الحال مع الأدوية الأخرى، يجب توخي الحذر في المرضى من كبار السن.

**طريقة التنازل**

عقار أر كوكسيا معد للتنازل عن طريق الفم فقط. تناول الأقراص مرة واحدة في اليوم، يمكن تنازل عقار أر كوكسيا مع الطعام أو بدونه.

**إذا تناولت كمية أكثر مما يجب من عقار أر كوكسيا**

يجب ألا تتناول كمية أقراص أكثر من التي أوصاك بها طبيبك. إذا تناولت بالفعل كمية كبيرة للغاية من عقار أر كوكسيا أقراص، فيجب أن تلجأ إلى العناية الطبية فورًا.

**إذا أغلقت تناول عقار أر كوكسيا**

من الهام تناول عقار أر كوكسيا على النحو الذي وصفه لك طبيبك، إذا أغلقت تناول جرعة، عليك فقط أن تتأكد من تناول جرعة المتأخر في اليوم التالي، لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض جرعة أغلقتها.

إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية حول استخدام هذا الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

**4. التأثيرات الجانبية المُحتملة**

مثل كافة الأدوية، قد يُسبب هذا الدواء آثارًا جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع. إذا أصيبت بأي من هذه العلامات فيجب أن تتوقف عن تناول عقار أر كوكسيا، وتتحدّث إلى طبيبك فورًا (انظر "ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار أر كوكسيا؟" في القسم ٢):

- ضيق النَفس، آلام في الصدر، أو ظهور تورُّم في الكاحل أو إذا ساعات الحالة.
- اصفرار الجلد والعينين (يرقان) - تُعدّ هذه علامة على وجود مشاكل بالكبد.
- آلم شديد، أو مستمر في المعدة، أو براز أسود.
- تفاعل حساسية- يُمكن أن يشمل مشاكل بالجلد مثل: قرح أو نطفات، أو تورُّم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق وما قد يُسبب صعوبة في النَفس.
- يُعرف معتلُّ تكرار الآثار الجانبية المُحتملة المُدرجة أذناه باستخدام الاصطلاحات الآتية: شائعة جدًا (تؤثر على أكثر من مستخدم واحد من بين كل ١٠ مستخدم).
- شائعة (تؤثر على مستخدم واحد إلى ١٠ من بين كل ١٠٠ مستخدم).
- غير شائعة (تؤثر على مستخدم واحد إلى ١٠ من بين كل ١٠٠٠ مستخدم).
- نادرة (تؤثر على مستخدم واحد إلى ١٠ من بين كل ١٠٠٠٠ مستخدم).
- نادرة جدًا (تؤثر على أقل من مستخدم واحد من بين كل ١٠٠٠٠ مستخدم).
- يُمكن أن تحدث الآثار الجانبية الآتية أثناء العلاج بعقار أر كوكسيا:

**شائعة جدًا**

- آلم بالمعدة.

**شائعة**

- التجفيف الجاف (التهاب) وآلم بعد خلع (الأسنان).
- تورُّم الساقين وآل القدمين بسبب احتباس السوائل (وذمة).
- دوخة، صداع.
- خفقان (سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب)، عدم انتظام النَظْم القلبي (اضطرابات النَظْم القلبي).
- ارتفاع ضغط الدم.
- أزيز بالصدر أو ضيق النَفس (تشنُّج قضيئي).
- إسهال، ريح (غازات مفرطة)، التهاب المعدة (التهاب بطانة المعدة)، حموضة، إسهال، عسر الهضم/ شعور غير مريح بالمعدة، غثيان، إعياء (قيء)، التهاب المريء، قرح بالمف.
- تغيّرات في نتائج اختبارات الدم المتعلقة بالكبد.
- تكتّم.
- ضعف وإرهاق، مرض شبيه بالإنفلونزا.

**غير شائعة**

- التهاب المعدة والأمعاء (التهاب الجهاز الهضمي الذي يشمل المعدة والأمعاء الدقيقة/ نزلة برد بالمعدة)، عدوى الجهاز التنفسي العلوي، عدوى المسالك البولية.
- تغيّرات في القيم المعملية (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، انخفاض الصفائح التَّموية).
- فرط الحساسية (تفاعل حساسية يشمل شرى [إرتكاريا] قد يكون خطيرًا لدرجة تتطلب عناية طبية فورية).
- زيادة أو قلة الشهية، زيادة الوزن.
- القلق، الاكتئاب، قلة التركيز، رغبة أو سماع أو الإحساس بأشياء غير موجودة (هلاوس).
- تغيّر مذاق، عدم القدرة على التَّوَم، تميّل أو وخز، غُماس.
- عدم وضوح الرؤية، تبيّح العين واحمرارها.
- طنين بالأذن، دوام (إحساس بالدوار أثناء السكون).
- اضطراب النَظْم القلبي (الرجفان الأذيني)، تسارع معتل ضربات القلب، فشل القلب، الشعور بضيق أو ضغط أو تقل بالصدر (نبضة صدرية)، نوبة قلبية.
- احمرار الجلد، سكتة دماغية، سكتة دماغية صغرى (نوبة إقفارية عابرة)، ارتفاع شديد في ضغط الدم، التهاب الكبد (التهاب الأوعية التَّموية).
- سعال، غثُر النَفس، نزيف من الأنف.
- انتفاخ المعدة أو الأمعاء، تغيّرات في طبيعة عمل الأمعاء، جفاف الفم، قرحة بالمعدة، التهاب بطانة المعدة الذي قد يصبح خطيرًا، وقد يؤدي إلى التَّزَيّف، متلازمة القولون التَّوحيّج، التهاب البنكرياس.
- تورُّم الوجه، طفح جلدي أو حكة بالجلد، احمرار الجلد.
- تقلص/ تشنُّج عضلي، آلم/ تصلب عضلي.
- ارتفاع مستويات اليوبيتوم في دمك، تغيّرات في نتائج اختبارات الدم أو البول المتعلقة بالكلى، مشاكل خطيرة بالكلى.
- آلم بالصدر.

**نادرة**

- وذمة وعناية (تفاعل حساسية مصحوب بتورُّم الوجه، الشفتين، اللسان وآل الحلق قد يُسبب صعوبة في النَفس وآل البلع، مما قد يكون خطيرًا بما يكفي ليستلزم العناية الطبية الفورية) تفاعلات تحسّسية/تأقية/تأقية تشمل الصدمة (تفاعل حساسية خطير يتطلب العناية الطبية الفورية).
- ارتباك، تملط.
- مشاكل الكبد (التهاب الكبد).
- انخفاض مستويات الصوديوم في الدم.
- فشل كبدي، اصفرار الجلد وآل العينين (يرقان).
- التفاعلات الجينية الشديدة.

**الإبلاغ عن الآثار الجانبية**

إذا ظهرت لديك أية آثار جانبية، فتحدّث إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك؛ يشمل ذلك أية آثار جانبية مُحتملة، غير المدرجة في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يُمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول أمان هذا الدواء.

**5. كيفية تخزين عقار أر كوكسيا**

يُحفظ هذا الدواء بعيدًا عن رطوبة ومتنازل الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة الكرتونية، يُشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يرجى تخزينه في مكان لا تتعدى فيه الحرارة ٣٠ درجة مئوية.

الشرائط: يجب التخزين داخل العبوة الأصلية للحماية من الرطوبة.

لا تتخلص من الأدوية عن طريق إلقائها في مياه الصرف أو مع المخلفات المنزلية، استشر الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تُعدّ تستخدمها. سوف تُساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على البيئة.

**6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى****محتويات عقار أر كوكسيا**

- المادة الفعّالة هي إيتوريكوكسيب، يحتوي كل قرص مُغلّف على ٦٠ أو ٩٠ أو ١٢٠ مجم من إيتوريكوكسيب.
- المكونات الأخرى هي:

المحتوى الداخلي: فوسفات هيدروجين الكالسيوم (٤ ملاتي)، كروسكارمبولز الصوديوم، ستيرات الماغيسيوم، سيلوز دقيق التَّوَلور.

الغلاف الخارجي للقرص: شمع كبريتات، لاكتور أحادي الهيدرات، هيبرميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، ثنائي الأستين. تحتوي أيضًا الأقراص التي تحوي جرعة قدرها ٦٠ مجم على أكسيد الحديد الأصفر (E172)، مادة مُلَوّنة وإنديجو كارمين ليك (E132)، مادة مُلَوّنة.

**ما هو شكل عقار أر كوكسيا؟ وما هي محتويات العبوة؟**

يتوافر عقار أر كوكسيا بثلاثة تركيزات:

أقراص مُغلّفة ٦٠ مجم، محببة الوجيه، ذات لون أخضر غامق، على شكل تقاحة، على أحد جانبيها العلامة "ARCOXIA 60" وعلى الجانب الأخر "200".

أقراص مُغلّفة ٩٠ مجم، محببة الوجيه، ذات لون أبيض، على شكل تقاحة، على أحد جانبيها العلامة "ARCOXIA 90" وعلى الجانب الأخر "202".

أقراص ١٢٠ مجم: أقراص باللون الأخضر الشاحب، بشكل تقاحة ثنائية التحبب مغلفة بـ شريط، ومكتوب على الوجه الأمامي "الوكسيا 120" وعلى الشاتية "204".

أحجام العبوات: ٦، ٩٠، ١٢٠ مجم

تشمل العلب المختلفة ١٢، ٥٧، ١٠٧، ١٤٤، ٢٠٨، ٢٤٠، ٣٠٠، ٤٥٠، ٨٤٤ أو ١٠٠٠ قرص، أو مجموعة علب تحتوي على ٩٨ قرص (عطيني تحتوي كل منهما ٤٩ قرص) في أشرطة.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

**مالك حق التسويق وجهة التصنيع الشركة الصالطة ويتم إصدار التشغيلية من قبل:**

ميرك شارب ودوم المحدودة، طريق هيرتورد، هويدسون، هيرتوردشاير

أي أن ٩١١ بي يو، المملكة المتّحدة

**الشركة الصالطة:**

فروس تيبيرا أس أي

فيا كومبوتلانسيه ١٤

٢٨٨٠٥ أكلالا دي هيناريس

مدريد، إسبانيا

**يتم توزيعها من قبل:**

ميرك شارب ودوم بي، في،

واردروج ١٢٩، ٢٠٢١ بي إن هارلم، هولندا

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في أبريل ٢٠١٦.

هذا الدواء

- متحضر يؤثّر على صحتك واستهلاكه خلافًا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي باعك الدواء.
- الطبيب والصيدلي هما الفنيان في الدواء ومنافع ومخاطره.
- لا توقف العلاج من تلقا نفسك.
- لا تكثر وصف الدواء بلا استشارة الطبيب.

لا تتراك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب.