

نشرة العبوة: معلومات المُستخدم

- أر كوكسيا ٦٠ مجم أقراص مُغلّفة
- أر كوكسيا ٩٠ مجم أقراص مُغلّفة
- أر كوكسيا ١٢٠ مجم أقراص مُغلّفة
- إيتوريكوسيب

يرجى قراءة هذه النشرة كاملة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء؛ لأنها تحتوي على معلومات هامة بالإنجليزية لك.

- احتفظ بهذه النشرة؛ فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك المزيد من الأسئلة، فاستشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.
- تم وصف هذا الدواء لك وحك، فلا تُعطه لأخرين؛ فقد يضر بهم، حتى إذا كانوا يُعانون من نفس علامات المرض التي تعانى أنت منها.
- إذا ظهرت لديك أية آثار جانبية، فتحدث إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك؛ بما في ذلك أية آثار جانبية مُحتملة غير المُدرجة في هذه النشرة - انظر قسم ٤ .

ما هي محتويات هذه النشرة؟

- ما هو عقار أر كوكسيا؟ وقيم يُستخدم؟
- ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار أر كوكسيا؟
- كيفية تناول عقار أر كوكسيا.
- الآثار الجانبية المُحتملة.
- الكيفية تُخزّن عقار أر كوكسيا.
- محتويات العبوة ومعلومات أخرى.

1. ما هو عقار أر كوكسيا؟ وقيم يُستخدم؟

- ما هو عقار أر كوكسيا؟**
- يحتوي عقار أر كوكسيا على المادة الفعّالة إيتوريكوسيب. عقار أر كوكسيا هو واحد من مجموعة أدوية تُسمى مثبّطات إنزيم الأكسدة الحلقية-2(سيكلو أوكسي جيناز) الانتقائية (COX-2). تنتمي هذه الأدوية إلى فئة تُسمى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

قيم يُستخدم عقار أر كوكسيا؟

- يُساعد عقار أر كوكسيا على الحد من الألم والتورم (الالتهاب) في المفاصل وعضلات الأشخاص الذين يبلغون من العُمُر ١٦ عامًا فأكثر، والمصابين بالتهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الفقار اللاصق ومرض التقرس.
- يُستخدم أيضًا عقار أر كوكسيا لعلاج قصير الأمد للألم المتوسط بعد جراحة الأسنان في الأشخاص الذين يبلغون من العُمُر ١٦ عامًا فأكثر.

ما هو مرض التهاب المفاصل؟

مرض التهاب المفاصل هو مرض بالمفاصل، ينتج عن التخلُّل التدريجي للغضروف المسنول عن تخفيف الاحتكاك بين نهايات العظام، وهذا يُسبب تورُّمًا (التهابًا)، الماء، أوجاعًا، تصلبًا وإعاقَة.

ما هو التهاب المفاصل الروماتويدي؟

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي طويل الأمد بالمفاصل، يُسبب هذا المرض: الألم، تصلبًا، تورُّمًا، وفتحًا منذرًا لحدوث الحركة في المفاصل التي يصيبها المرض، قد يُسبب أيضًا التهابًا في مناطق أخرى للجسم.

ما هو مرض التقرس؟

التقرس هو مرض يحدث في هيئة توبات مفاجئة ومتكررة من الالتهاب المؤلم للغاية والأحمرار في المفاصل، ينجم عن ترسبات بلورات معدنية في المفصل.

ما هو التهاب الفقار اللاصق؟

التهاب الفقار اللاصق هو مرض التهابي بالعمود الفقري والمفاصل الكبيرة.

2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار أر كوكسيا؟

- لا تتناول عقار أر كوكسيا في الحالات الآتية:**
- إذا كنت تعاني من الحساسية (فرط الحساسية) تجاه إيتوريكوسيب، أو أيّ من مكونات هذا الدواء (المُدرجة في قسم ٦).
- إذا كنت مصابًا بحساسية تجاه مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، بما في ذلك الأسبرين ومثبّطات الأكسدة الحلقية -2 (انظر "الآثار الجانبية المُحتملة"، قسم ٤).
- إذا كنت مُصابًا حاليًا بقرحة في المعدة أو نزيف في المعدة أو الأمعاء.
- إذا كان لديك مرض شديد بالكبد.
- إذا كنت مصابًا بمرض شديد بالكلى.
- إذا كنت حاملًا أو قد تصابين حاملًا أو كنت تُرضعين (انظر "الحمل والرضاعة الطبيعية والخصوبة").
- إذا كنت بعمر أقل من ١٦ عامًا.
- إذا كنت مصابًا بمرض التهابي بالأمعاء، مثل: مرض كرون، أو التهاب القولون التَّوحي، أو التهاب القولون.
- إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم الذي لم يتم التحكم به عن طريق العلاج (راجع مع الطبيب أو الممرض/ة الخاص بك، إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان ضغط الدم لديك يتم المُتحكم به بشكل كافٍ لا).
- إذا قام طبيبك بتشخيص إصابتك بمشاكل في القلب بما في ذلك فشل القلب (من النوع المعتدل أو الشديد)، أو نبضة صدرية (بالم الصدر).
- إذا كنت قد أصيبت بنوبة قلبية، أو خضعت لجراحة مجازة للشرايين التاجية، أو مرض بشريان طرفي (ضعف الدورة الدموية في الشفتين أو القدمين نتيجة تضيق أو انسداد الشرايين).
- إذا كنت قد أصيبت بأي من أنواع السكتة الدماغية (بما في ذلك السكتة الدماغية الصغرى أو نوبة إقفارية عابرة).
- قد يزيد إيتوريكوسيب بشكل طفيف من نسبة خطورة الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية؛ ولذا يجب عدم استخدامه في أولئك الذين أُصيبوا بالفعل بمشاكل بالقلب أو سكتة دماغية. إذا اعتقدت أن أيًا من هذه الحالات دول صلة بك، فلا تتناول الأقراص حتى تستشير طبيبك.

تحذيرات واحتياطات

تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول عقار أر كوكسيا في الحالات الآتية:

- إذا كان لديك تاريخ مرضي من الإصابة بنزيف المعدة أو تقرحات المعدة.
- إذا كنت مصابًا بضغط دم، على سبيل المثال: نوبة طويلة من القيء أو الإسهال.
- إذا كنت مصابًا بتورُّم نتيجة احتباس السوائل.
- إذا كان لديك تاريخ مرضي من فشل القلب، أو أي شكل آخر من أمراض القلب.
- إذا كان لديك تاريخ مرضي من الإصابة بارتفاع ضغط الدم. يُمكن أن يرفع عقار أر كوكسيا ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، لا سيما عند تناوله بجرعات مرتفعة، وسيرغب طبيبك في فحص ضغط الدم لديك من حين لآخر.
- إذا كان لديك أيّ تاريخ مرضي من الإصابة بمرض بالكبد أو الكلى.
- إذا كان يتم علاّجك من عدوى، يُمكن أن يحجب عقار أر كوكسيا أو يخفي إصابتك بخمى، والتي تُعدّ إحدى علامات العدوى.
- إذا كنت مصابًا بمرض الشَّكْرِي أو ارتفاع نسبة الكوليسترول أو كنت مدخنًا، يُمكن أن تزيد هذه الحالات من نسبة خطورة إصابتك بمرض بالقلب.
- إذا كنت سيّدة تحاول أن تصحب حملًا.
- إذا كنت أكبر من ٦٥ عامًا.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان ينطبق عليك أيّ مما سبق، **فِرْجِي التحدُّث إلى طبيبك قبل تناول عقار أر كوكسيا** لمعرفة ما إذا كان هذا الدواء مناسبًا لك لا.

يعمل عقار أر كوكسيا بشكل جيد في المرضى من البالغين من كبار السن والأصغر سنًا على قدم المساواة، إذا كان عمرك يزيد على ٦٥ عامًا، فقد يحتاج طبيبك إلى إجراء فحوصات مُنتظمة لك. لا يستلزم الأمر تعديل الجرعة للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عامًا.

الأطفال والمراهقون

لا يعطى هذا الدواء للأطفال والمراهقين الأقل من ١٦ عامًا.

تناول عقار أر كوكسيا مع أدوية أخرى

يُرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أيّة أدوية أخرى، بما في ذلك أية أدوية أخرى خضعت عليها دون وصفة طبية. بمجرد بدء تناولك لعقار أر كوكسيا، فقد يرغب طبيبك في مراقبتك، إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية الآتية على وجه الخصوص (لأنك من عمل تلك الأدوية بشكل صحيح، وهي كالتالي:

- أدوية سيولة الدم (مضادات التخثُّط)، مثل: وارفارين.
- ريفامبين (مضاد حيوي).
- ميثوتريكسات (عقار يُستخدم لتثبيط الجهاز المناعي، وغالبًا يُستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي).
- سيكلوسبورين أو تاكروليموس (أدوية تُستخدم لتثبيط الجهاز المناعي).
- الثيوم (دواء يُستخدم لعلاج بعض أنواع من الاكتئاب).
- الأدوية التي تُستخدم للمساعدة على ضبط ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، والتي تُدعى مثبّطات إنزيم تحوّل الأحماض تنستين (ACE) وحاصرات مستقبلات الأحجيوستين، تشمل الأمثلة: اللانابوليل ورامبيريدل ولوسارتان وفالسارتان.
- مدرات البول (أقراص الماء).
- ديجوكسين (دواء لعلاج فشل القلب وعدم انتظام النُظم القلبي).
- ميناكسيديل (يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم).
- ساليواتومول أقراص أو محلول للتنازل عن طريق الفم (دواء لعلاج الربو).
- حلاب منع الحمل (قد تزيد تناول الترامتران من نسبة خطورة إصابتك بآثار جانبية).
- جراح بالمهرونات الترموضية (قد تزيد التركيبة من نسبة خطورة إصابتك بآثار جانبية).
- الأسبرين، تكون نسبة خطورة الإصابة بقرح في المعدة أكبر إذا تناولت عقار أر كوكسيا مع الأسبرين.

- الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية؛

يُمكن تناول عقار أر كوكسيا مع **جرعة منخفضة** من الأسبرين، إذا كنت تتناول حاليًا جرعة منخفضة من الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية، فيجب ألا تتوقف عن تناول الأسبرين حتى تتحدث إلى طبيبك.

- الأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى:

لا تتناول **جرعة مرتفعة** من الأسبرين أو الأدوية الأخرى المضادة للالتهاب أثناء تناول عقار أر كوكسيا.

تناول عقار أر كوكسيا مع الأطعمة والمشروبات

قد يكون ظهور تأثير عقار أر كوكسيا أسرع عند تناوله دون طعام.

الحمل والرضاعة الطبيعية والخصوبة

الحمل

يجب عدم تناول عقار أر كوكسيا أثناء فترة الحمل. إذا كنت حاملًا أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملًا، أو إذا كنت تخططين للحمل، فلا تتناولي الأقراص، إذا أصبحت حاملًا، فتوقّي عن تناول الدواء واستشيري طبيبك. استشيري طبيبك إذا كنت غير متأكدة أو تحتاجين إلى المزيد من المشورة.

الرضاعة الطبيعية

من غير المعروف ما إذا كان يتم إفراز عقار أر كوكسيا في لبن الأم لا. لا يجب عليك استشارة طبيبك قبل تناول عقار أر كوكسيا إذا كنت تُرضعين أو توينين الرضاعة الطبيعية. إذا كنت تستخدمين عقار أر كوكسيا، فيجب ألا تمارسي الرضاعة الطبيعية.

الخصوبة

لا يُوصى باستخدام عقار أر كوكسيا في السيدات اللاتي تحاولن الحمل.

القيادة واستخدام الآلات

تم الإبلاغ عن حدوث دوخة وتعب لدى بعض المرضى الذين يتناولون عقار أر كوكسيا.

لا تمارس القيادة إذا تعرّضت لدوخة أو تعب.

لا تستخدم أي أدوات أو الآلات إذا تعرّضت لدوخة أو تعب.

يحتوي عقار أر كوكسيا على سكر اللاكتوز.

إذا كان طبيبك قد أخبرك بأنك لا تتحمل بعض أنواع السكريات، فاقصل به قبل تناول هذا المنتج التواني.

3. كيفية تناول عقار أر كوكسيا

تناول دائمًا هذا الدواء كما أخبرك طبيبك بالضبط؛ يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تناولك.

لا تتناول أكثر من الجرعة الموصى بها اليوميًا. سيرغب طبيبك في مناقشة علاجك من حين إلى آخر؛ فمن الهام استخدام أدنى جرعة تضبط الألم لديك، ويجب عدم استخدام عقار أر كوكسيا لوقت أطول من اللازم؛ هذا لأن نسبة خطورة الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية قد تزداد بعد العلاج لفترة طويلة، خاصةً إذا كان العلاج بجرعات مرتفعة.

هناك تركيزات مختلفة متاحة لهذا المُنتج التواني ووفقًا لمرضك سيوصف لك طبيبك تركيز الفرض المناسب لك.

الجرعة الموصى بها هي كالتالي:

الالتهاب العظمي المفصلي

الجرعة الموصى بها هي ٣٠ إلى ٦٠ ملغ مرة في اليوم.

التهاب المفاصل الروماتويدي

الجرعة الموصى بها هي ٦٠ مجم مرة واحدة في اليوم، ويتم زيادتها إلى ٩٠ مجم مرة واحدة في اليوم بحد أقصى إذا اقتضى الأمر.

التهاب الفقار اللاصق

الجرعة الموصى بها هي ٦٠ مجم مرة واحدة في اليوم، ويتم زيادتها إلى ٩٠ مجم مرة واحدة في اليوم بحد أقصى إذا اقتضى الأمر.

حالات الألم الحاد

يجب أن يُستخدم عقار إيتوريكوسيب للعلاج في فترة الألم الحاد فقط.

مرض التقرس

الجرعة المُوصى بها هي ١٢٠ مجم مرة واحدة في اليوم، ويجب استخدامها فقط خلال فترة الألم الحاد، وتقتصر على حد أقصى ٨ أيام من العلاج.

الألم التالي للخضوع لعملية جراحية في الأسنان

الجرعة الموصى بها هي ٩٠ مجم مرة واحدة يوميًا، وتقتصر على حد أقصى ٣ أيام من العلاج.

الأشخاص المصابون بمشاكل في الكبد

إذا أصيبت بمرض خفيف في الكبد، فيجب ألا تتناول أكثر من ٦٠ مجم في اليوم.

إذا أصيبت بمرض معتدل في الكبد، يجب ألا تتناول أكثر من ٦٠ ملغ كل يومين أو 30 ملغ كل يوم.

الاستعمال في الأطفال والمراهقين

يجب ألا يتم إعطاء عقار أر كوكسيا للأطفال والمراهقين الأقل من ١٦ عامًا.

المرضى من كبار السن

لا يستلزم الأمر تعديل الجرعة في المرضى من كبار السن، كما هو الحال مع الأدوية الأخرى، يجب توخي الحذر في المرضى من كبار السن.

طريقة تناول

عقار أر كوكسيا معد للتناول عن طريق الفم فقط. تناول الأقراص مرة واحدة في اليوم، يمكن تناول عقار أر كوكسيا مع الطعام أو بدونه.

إذا تناولت كمية أكثر مما يجب من عقار أر كوكسيا

يجب ألا تتناول كمية أقراص أكثر من التي أوصاك بها طبيبك. إذا تناولت بالفعل كمية كبيرة للغاية من عقار أر كوكسيا أقراص، فيجب أن تلجأ إلى العناية الطبية فورًا.

إذا أغلقت تناول عقار أر كوكسيا

من الهام تناول عقار أر كوكسيا على النحو الذي وصفه لك طبيبك، إذا أغلقت تناول جرعة، عليك فقط أن تتأكد جدول تناوله المعتاد في اليوم التالي، لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض جرعة أغفلتها.

إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية حول استخدام هذا الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

4. التأثيرات الجانبية المُحتملة

مثل كافة الأدوية، قد يُسبب هذا الدواء آثارًا جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع. إذا أصيبت بأي من هذه العلامات **فيجب أن تتوقف عن تناول عقار أر كوكسيا**، وتتحدث إلى طبيبك فورًا (**انظر "ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار أر كوكسيا" في القسم ٢**):

- ضيق النَّفس، آلام في الصدر، أو ظهور تورُّم في الكاحل أو إذا ساعات الحالة.
- اصفرار الجلد والعينين (يرقان) - تُعدّ هذه علامة على وجود مشاكل بالكبد.
- آلم شديد، أو مستمر في المعدة، أو براز أسود.
- تفاعل حساسية- يُمكن أن يشمل مشاكل بالجلد مثل: قرح أو نطفات، أو تورُّم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق وما قد يُسبب صعوبة في النَّفَس.
- يُعرف معطلُّ تكرار الآثار الجانبية المُحتملة المُدرجة أذناه باستخدام الاصطلاحات الآتية: شائعة جدًا (تؤثر على أكثر من مستخدم واحد من بين كل ١٠ مستخدم).
- شائعة (تؤثر على مستخدم واحد إلى ١٠ من بين كل ١٠٠ مستخدم).
- غير شائعة (تؤثر على مستخدم واحد إلى ١٠ من بين كل ١٠٠٠ مستخدم).
- نادرة (تؤثر على مستخدم واحد إلى ١٠ من بين كل ١٠٠٠٠ مستخدم).
- نادرة جدًا (تؤثر على أقل من مستخدم واحد من بين كل ١٠٠٠٠ مستخدم).
- يُمكن أن تحدث الآثار الجانبية الآتية أثناء العلاج بعقار أر كوكسيا:

شائعة جدًا

- آلم بالمعدة.

شائعة

- التجفيف الجاف (التهاب) وآلم بعد خلع (الأسنان).
- تورُّم الساقين وآل القدمين بسبب احتباس السوائل (وذمة).
- دوخة، صداع.
- خَفْطان (سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب)، عدم انتظام النُظم القلبي (اضطرابات النُظم القلبي).
- ارتفاع ضغط الدم.
- أزيز بالصدر أو ضيق النَّفس (تشنُّج قضيبي).
- إسهال، ريح (غازات مفرطة)، التهاب المعدة (التهاب بطانة المعدة)، حموضة، إسهال، عسر الهضم/ شعور غير مريح بالمعدة، غثيان، إعياء (قيء)، التهاب المريء، قرح بالمف.
- تعرُّجات في نتائج اختبارات الدم المتعلقة بالكبد.
- تكمُّم.
- ضعف وإرهاق، مرض شبيه بالإنفلونزا.

غير شائعة

- التهاب المعدة والأمعاء (التهاب الجهاز الهضمي الذي يشمل المعدة والأمعاء الدقيقة/نزلة برد بالمعدة)، عدوى الجهاز التنفسي العلوي، عدوى المسالك البولية.
- تعرُّجات في القيم المعملية (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، انخفاض الصفائح التَّموئية).
- فرط الحساسية (تفاعل حساسية يشمل شرى [إرتكاريا] قد يكون خطيرًا لدرجة تتطلب عناية طبية فورية).
- زيادة أو قلة الشهية، زيادة الوزن.
- القلق، الاكتئاب، قلة التركيز، روية أو سماع أو الإحساس بأشياء غير موجودة (هالوس).
- تغير مذاق، عدم القدرة على النوم، تميُّل أو وخز، نَعْاس.
- عدم وضوح الرؤية، تهيج العين واحمرارها.
- طنين بالأذن، دوام (إحساس بالدوار أثناء السكنون).
- اضطراب النُظم القلبي (الرجفان الأذيني)، تسارع معطل ضربات القلب، فشل القلب، الشعور بضيق أو ضغط أو تقل بالصدر (نبضة صدرية)، نوبة قلبية.
- احمرار الجلد، سكتة دماغية، سكتة دماغية صغرى (نوبة إقفارية عابرة)، ارتفاع شديد في ضغط الدم، التهاب الكبد (التهاب الأوعية التَّموئية).
- سعال، غثُر النَّفَس، زرف من الأنف.

- انتفاخ المعدة أو الأمعاء، تعرُّجات في طبيعة عمل الأمعاء، خفاف الفم، قرحة بالمعدة، التهاب بطانة المعدة الذي قد يصبح خطيرًا، وقد يؤدي إلى التَّزْيِف، متلازمة القولون التَّمَوِيْع، التهاب البنكرياس.
- تورُّم الوجه، طفح جلدي أو حكة بالجلد، احمرار الجلد.
- نقص/تشنُّج عضلي، آلم/تصلُّب عضلي.
- ارتفاع مستويات اليوبيتوم في دمك، تعرُّجات في نتائج اختبارات الدم أو البول المتعلقة بالكلى، مشاكل خطيرة بالكلى.
- آلم بالصدر.

نادرة

- وذمة وعناية (تفاعل حساسية مصحوب بتورُّم الوجه، الشفتين، اللسان وآل الحلق قد يُسبب صعوبة في النَّفَس أو البلع، مما قد يكون خطيرًا بما يكفي ليستلزم العناية الطبية الفورية) (تفاعلات تحسُّب/تأقية/تأقية تشمل الصدمة (تفاعل حساسية خطير يتطلب العناية الطبية الفورية).
- ارتباك، تملُّل.
- مشاكل الكبد (تهاب الكبد).
- انخفاض مستويات الصوديوم في الدم.
- فشل كبدي، اصفرار الجلد وآل العينين (يرقان).
- التفاعلات الجذبية الشديدة.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا ظهرت لديك أية آثار جانبية، فتحدث إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك؛ يشمل ذلك أية آثار جانبية مُحتملة، غير المُدرجة في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يُمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول أمان هذا الدواء.

5. كُفَيْية تُخزّن عقار أر كوكسيا

يُحفظ هذا الدواء بعيدًا عن روية ومُتناول الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة الكرتونية، يُشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يرجى تخزينه في مكان لا تتعدى فيه الحرارة ٣٠ درجة مئوية.

الشرائط: يجب التخزين داخل العبوة الأصلية للحماية من الرطوبة.

لا تتخلص من الأدوية عن طريق إلقائها في مياه الصرف أو مع المخلفات المنزلية، استشر الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تُعدّ تستخدمها. سوف تُساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى**محتويات عقار أر كوكسيا**

- المادة الفعّالة هي إيتوريكوسيب، يحتوي كل قرص مُغلّف على ٦٠ أو ٩٠ أو ١٢٠ مجم من إيتوريكوسيب.
- المكونات الأخرى هي:
- المحتوى الداخلي: فسيفات هيدروجين الكالسيوم (٤ ملاتي)، كروسكارمبولز الصوديوم، ستيرات الماغيسيوم، ميلوزر دقيق التُّبور.
- الغلاف الخارجي للقرص: شمع كروتونا، لاكتوز أحادي الهيدرات، هيبوميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، كلثالي الأستين. تحتوي أيضًا الأقراص التي تحوي جرعة قدرها ٦٠ مجم على أكسيد الحديد الأصفر (E172)، مادة مُلَوّنة) وابتنديو كارمين ليك (E132)، مادة مُلَوّنة).

ما هو شكل عقار أر كوكسيا؟ وما هي محتويات العبوة؟

يتوافر عقار أر كوكسيا بثلاثة تركيزات:

أقراص مُغلّفة ٦٠ مجم، محببة الوجين، ذات لون أخضر غامق، على شكل تقاحة، على أحد جانبيها العلامة "ARCOXIA 60" وعلى الجانب الآخر "200".

أقراص مُغلّفة ٩٠ مجم، محببة الوجين، ذات لون أبيض، على شكل تقاحة، على أحد جانبيها العلامة "ARCOXIA 90" وعلى الجانب الآخر "202".

أقراص ١٢٠ مجم: أقراص باللون الأخضر الشاحب، بشكل تقاحة ثنائية التحبب مغلّفة بشرطي، ومكتوب على الوجه الأمامي "الر كوكسيا 120" وعلى الثانية "204".

أحجام العبوات: ٦، ٩٠، ٩٠، ١٢٠ مجم

تشمل العلب المختلفة ١٢، ٥٧، ١٠٧، ١٤٠، ١٤٠، ٢٠٨، ٢٠٨، ٣٠٠، ٥٠٠، ٨٤٠ أو ١٠٠٠ قرص، أو مجموعة علب تحتوي على ٩٨ قرص (تحتوي كل منهما ٤٩ قرص) في أشرطة.

مالك حق التسويق وجهة التصنيع الشركة الصالعة ويتم إصدار التشغيلية من قبل:

ميرك شارب ودوم المحدودة،

طريق هيرتفورد، هويسدون، هيرتفوردشاير

أي أن ٩١١ بي يو، المملكة المُتّحدة

الشركة الصالعة:

فروس تيبيركا أس أمي

فيا كومبوتاتسيو ١٤

٢٨٨٠٥ أكلالا دي هيناريس

مدريد، إسبانيا

يتم تصنيعها في:

ميرك شارب و دوم بي، في،

واردويج ١٢٩، ٢٠٣١ بي إن هارلم، هولندا

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في إبريل ٢٠١٦.

<p>هذا الدواء</p> <ul style="list-style-type: none"> - متحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافًا للتعليمات يعرضك للخطر. - تتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المتصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي باعك الدواء. - الطبيب والصيدلي هما الفنيان في الدواء ومنافعها ومخاطرها. - لا توقف العلاج من تلقاء نفسك. - لا تكثر وصف الدواء بلا استشارة الطبيب. - لا تتراك الأدوية في متناول الأطفال. <p>جلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب.</p>
