

نشرة العيوءة : معلومات المُستخدِم

- أر كوكسيا ٦٠ مجم أقر ارض مُغلّفة
- أر كوكسيا ٩٠ مجم أقر ارض مُغلّفة
- أر كوكسيا ١٢٠ مجم أقر ارض مُغلّفة إيتوريكوكسيب

يرجى قراءة هذه النشرة كاملة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء؛ لأنها تحتوي على معلومات هامة بالمشية لك.

- احتفظ بهذه النشرة؛ فقد تحتاج إى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك المزيد من الأسئلة، فاستشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.
- تم وصف هذا الدواء لك وحذك، فلا تُعْطه لآخرين؛ فقد يضر بهم، حتى إذا كانوا يُعانون من نفس علامات المرض التي تعانى أنت منها.
- إذا ظهرت لديك أية آثار جانبية، فتحدّث إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك؛ بما فى ذلك أية آثار جانبية مُحتملة غير المُدرجة فى هذه النشرة - انظر قسم ٤.

ما هي محتويات هذه النشرة؟

- ما هو عقار أر كوكسيا؟ وقيم يُستخدَم؟
- ما الذى تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار أر كوكسيا؟
- كيفية تناول عقار أر كوكسيا.
- الآثار الجانبية المُحتملة.
- كيفية تخزين عقار أر كوكسيا.
- محتويات العيوءة ومعلومات أخرى.

1. ما هو عقار أر كوكسيا؟ وقيم يُستخدَم؟

- ما هو عقار أر كوكسيا؟**
- يحتوي عقار أر كوكسيا على المادة الفعالة إيتوريكوكسيب. عقار أر كوكسيا هو واحد من مجموعة أدوية تُسمى مثبّطات إيزيم الأكلدة الحلقية-2 (سيكلوأكسجيناز) الانتقائية (COX-2). تنتمى هذه الأدوية إلى فئة تُسمى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

قيم يُستخدَم عقار أر كوكسيا؟

- يُساعد عقار أر كوكسيا على الحد من الألم والتورّم (الالتهاب) في مفاصل وعضلات الأشخاص الذين يبلغون من العُمر ١٦ عامًا فأكثر، والمصابين بالتهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الفقار اللاصق ومرض النقرس.
- يُستخدَم أيضًا عقار أر كوكسيا لعلاج قصير الأمد للألم المتوسط بعد جراحة الأسنان في الأشخاص الذين يبلغون من العُمر ١٦ عامًا فأكثر.

ما هو مرض التهاب المفاصل؟

مرض التهاب المفاصل هو مرض بالمفاصل، ينتج عن التخلّل التدرّجى للغضروف المسنول عن تخفيف الاحتكاك بين نهايات العظام، وهذا يُسبب تورّمًا (التهابًا)، الماء، أوجاعًا، تصلبًا وإعاقةً.

ما هو التهاب المفاصل الروماتويدي؟

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي طويل الأمد بالمفاصل، يُسبب هذا المرض: الألم، تصلبًا، تورّمًا، وفقدانًا مزمًا إيدًا للحركة في المفاصل التي يصيبها المرض، قد يُسبب أيضًا التهابًا في مناطق أخرى للجسم.

ما هو مرض النقرس؟

النقرس هو مرض يحدث في هيئة نوبات مفاجئة ومتكررة من الالتهاب المؤلم للغاية والأحمرار في المفاصل، ينجم عن ترسّبات بلورات معدنية في المفصل.

ما هو التهاب الفقار اللاصق؟

التهاب الفقار اللاصق هو مرض التهابي بالعمود الفقري والمفاصل الكبيرة.

2. ما الذى تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار أر كوكسيا؟

لا تتناول عقار أر كوكسيا في الحالات الآتية:

- إذا كنت تعاني من الحساسية (فرط الحساسية) تجاه إيتوريكوكسيب، أو أيّ من مكونات هذا الدواء (المُدْرَجَة فى قسم ٦).
- إذا كنت مصابًا بحساسية تجاه مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، بما فى ذلك الأسبرين ومثبّطات الأكلدة الحلقية -2 (انظر "الآثار الجانبية المُحتملة"، قسم ٤).
- إذا كنت مصابًا حاليًا بقرحة في المعدة أو نزيف في المعدة أو الأمعاء.
- إذا كان لديك مرض شديد بالكبد.
- إذا كنت مصابًا بمرض شديد بالكلى.
- إذا كنت حاملاً أو قد تصحيحين حاملاً أو كنت ترضعين (انظر "الحمل والرضاعة الطبيعية والخصوبة").
- إذا كنت بعمر أقل من ١٦ عامًا.
- إذا كنت مصابًا بمرض التهابي بالأمعاء، مثل: مرض كرون، أو التهاب القولون التّرجى، أو التهاب القولون.
- إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدّم الذي لم يتم التحكم به عن طريق العلاج (راجع مع الطبيب أو الممرضة/المرضعة/الخاص بك، إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان ضغط الدّم لديك يتم التّحكّم به بشكل كافٍ لا).
- إذا قام طبيبك بتخصيص إصابتك بمشاكل فى القلب بما فى ذلك فشل القلب (من النوع المعتدل أو الشديد)، أو نبضة صدرية (لم بالصندر).
- إذا كنت قد أصببت نبوة قلبية، أو خضعت لجراحة مجازة للشرابيين الثاجية، أو مرض بشريان طرقي (ضعف الدورة الدموية فى الشفابن أو القديمين نتيجة تضيقّ أو انسداد الشرايين).
- إذا كنت قد أصببت باي من أنواع السكتة الدماغية (بما فى ذلك السكتة الدماغية الصغرى أو نبوة إقفارية عابرة).

قد يزيد إيتوريكوكسيب بشكل طفيف من نسبة خطورة الإصابة بنبوة قلبية وسكتة دماغية؛ ولذا يجب عدم استخدامه فى أولئك الذين أصيبوا بالفعل بمشاكل بالقلب أو سكتة دماغية. إذا اعتقدت أنّ أيًا من هذه الحالات دول صولة بك، فلا تتناول الأقر ارض حتى تستشور طبيبك.

تحذيرات واحتياطات

تحدّث إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول عقار أر كوكسيا فى الحالات الآتية:

- إذا كان لديك تاريخ مرضى من الإصابة بنزيف المعدة أو تقرحات المعدة.
- إذا كنت مصابًا بمُضاعف: جفاف، على سبيل المثال: نبوة طويلة من القيء أو الإسهال.
- إذا كنت مصابًا بتورّم نتيجة احتباس السوائل.
- إذا كان لديك تاريخ مرضى من فشل القلب، أو أى شكل آخر من أمراض القلب.
- إذا كان لديك تاريخ مرضى من الإصابة بارتفاع ضغط الدّم. يُمكن أنّ يرتفع عقار أر كوكسيا ضغط الدّم لدى بعض الأشخاص، لا سيما عند تناوله بجرعات مرتفعة، وسيرغب طبيبك فى فحص ضغط الدّم لديك من حين لآخر.
- إذا كان لديك أيّ تاريخ مرضى من الإصابة بمرض بالكبد أو الكلى.
- إذا كان يتم علاّجك من عدوى، يُمكن أنّ يحجب عقار أر كوكسيا أو يخفى إصابتك بـ، والتي تُعدّ إحدى علامات العدوى.
- إذا كنت مصابًا بمرض الشّكرى أو ارتفاع نسبة الكوليسترول أو كنت مدخنًا، يُمكن أنّ تزيد هذه الحالات من نسبة خطورة إصابتك بمرض بالقلب.
- إذا كنت سيءة تحالول أو تصحيح حاملاً.
- إذا كنت أكبر من ٦٥ عامًا.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان ينطبق عليك أيّ ما سبق، **فِرْجى التحدّث إلى طبيبك قبل تناول عقار أر كوكسيا** لمعرفة ما إذا كان هذا الدواء مناسبًا لك أم لا.

يتمل عقار أر كوكسيا بشكل جيد فى المرضى من البالغين من كبار السن والأصغر سنًا على قدم المساواة؛ إذا كان عمرك يزيد على ٦٥ عامًا، فقد يحتاج طبيبك إلى إجراء فحوصات مُنتظمة لك. لا يستلزم الأمر تعديل الجرعة للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عامًا.

الأطفال والمراهقون

لا يعطى هذا الدواء للأطفال والمراهقين الأقل من ١٦ عامًا.

تناول عقار أر كوكسيا مع أدوية أخرى

- يُرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أيّة أدوية أخرى، بما فى ذلك أية أدوية أخرى خصلّنت عليها دون وصفة طبية. بمجرد بدء تناولك لعقار أر كوكسيا، فقد يرغب طبيبك فى مراقبتك؛ إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية الآتية على وجه الخصوص للثّأكد من عمل تلك الأدوية بشكل صحيح، وهي كالتالى:
- أدوية سيولة الدّم (مضادات التجلّط)، مثل: وارفارين.
 - ريفامبين (مضاد حيوى).
 - ميثوتريكسات (عقار يُستخدَم لتنشيط الجهاز المناعى، وغالبًا يُستخدَم فى علاج التهاب المفاصل الروماتويدي).
 - سيكلوسبورين أو تاكروليموس (أدوية تُستخدَم لتنشيط الجهاز المناعى).
 - الليثيوم (دواء يُستخدَم لعلاج بعض أنواع من الاكتئاب).
 - الأدوية التي تُستخدَم للمساعدة على ضبط ارتفاع ضغط الدّم وفشل القلب، والتي تُدعى مثبّطات إيزيم تحويل الأحيوتستين (ACE) وحاصرات مستقبلات الأحيوتستين، تشمل الأمثلة: الإلزابريل ورامبيريل ولوسارتان وفالسارتان.
 - مدرات البول (أقر ارض الماء).
 - ديجوكسين (دواء لعلاج فشل القلب وعدم انتظام النّظْم القلبي).
 - مينوكسيديل (يُستخدَم لعلاج ارتفاع ضغط الدّم).
 - ساليواتمول أقر ارض أو محلول للتناول عن طريق الفم (دواء لعلاج الربو).
 - حجاب منع الحمل (قد يزيد تناول التمر اتمن من نسبة خطورة إصابتك بآثار جانبية).
 - العلاج بالهرمونات التّوخيضية (قد تزيد الترتيبية من نسبة خطورة إصابتك بآثار جانبية).
 - الأسبرين، تكون نسبة خطورة الإصابة بقرح فى المعدة أكبر إذا تناولت عقار أر كوكسيا مع الأسبرين.
 - الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية؛
 - يُمكن تناول عقار أر كوكسيا مع **جرعة منخفضة** من الأسبرين، إذا كنت تتناول حاليًا جرعة منخفضة من الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية، فيجب ألا تتوقف عن تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الطبيكية.
 - الأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى:

لا تتناول **جرعة مرتفعة** من الأسبرين أو الأدوية الأخرى المضادة للالتهاب أثناء تناول عقار أر كوكسيا.

تناول عقار أر كوكسيا مع الأطعمة والمشروبات

قد يكون ظهور تأثير عقار أر كوكسيا أسرع عند تناوله دون طعام.

الحمل والرضاعة الطبيعية والخصوبة

الحمل

يجب عدم تناول عقار أر كوكسيا أثناء فترة الحمل. إذا كنت حاملاً أو تعتقدن أنك قد تكونين حاملاً، أو إذا كنت تحفظين للحمل، فلا تتناولى الأقر ارض، إذا أصبحت حاملاً، فتوقى عن تناول الدواء واستشورى طبيبك. استشورى طبيبك إذا كنت غير متأكدة أو تحتاجين إلى المزيد من المشورة.

الرضاعة الطبيعية

من غير المعروف ما إذا كان يتم إفراز عقار أر كوكسيا فى لبن الأم لا أم لا. يجب عليك استشارة طبيبك قبل تناول عقار أر كوكسيا إذا كنت ترضعين أو تتوين الرضاعة الطبيعية. إذا كنت تستخدمين عقار أر كوكسيا، فيجب ألا تمارسى الرضاعة الطبيعية.

الخصوبة

لا يُوصى باستخدام عقار أر كوكسيا فى السيدات اللاتي تحاولن الحمل.

القيادة واستخدام الآلات

تم الإبلاغ عن حدوث دوخة ونعاس لدى بعض المرضى الذين يتناولون عقار أر كوكسيا.

لا تمارس القيادة إذا تعرّضت لدوخة أو نعاس.

لا تستخدمى أي أدوات أو الآلات إذا تعرّضت لدوخة أو نعاس.

يحتوى عقار أر كوكسيا على سكر اللاكتوز.

إذا كان طبيبك قد أخبرك بذلك لا تتحمل بعض أنواع السكريات، فاقصل به قبل تناول هذا المنتج التوائى.

3. كيفية تناول عقار أر كوكسيا

تناول دائمًا هذا الدواء كما أخبرك طبيبك بالضبط؛ يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تناولك.

لا تتناول أكثر من الجرعة الموصى بها هالك. سيرغب طبيبك فى مناقشة علاّجك من حين إلى آخر؛ فمن الهام استخدام أدنى جرعة تضبط الألم لديك، ويجب عدم استخدام عقار أر كوكسيا لوقت أطول من اللازم؛ هذا لأن نسبة خطورة الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية قد ترتفع بعد العلاج لفترة طويلة، خاصةً إذا كان العلاج بجرعات مرتفعة. هناك تركيزات مختلفة متاحة لهذا المنتج التوائى ووفقًا لمرضك سيصف لك طبيبك تركيز الفرص المناسب لك.

الجرعة الموصى بها هي كالتالى:

الالتهاب العظمى المفصلى

الجرعة الموصى بها هي ٣٠ إلى ٦٠ ملغ مرة فى اليوم.

التهاب المفاصل الروماتويدي

الجرعة الموصى بها هي ٦٠ مجم مرة واحدة فى اليوم، ويتم زيادتها إلى ٩٠ مجم مرة واحدة فى اليوم بحد أقصى إذا اقتضى الأمر.

التهاب الفقار اللاصق

الجرعة الموصى بها هي ٦٠ مجم مرة واحدة فى اليوم، ويتم زيادتها إلى ٩٠ مجم مرة واحدة فى اليوم بحد أقصى إذا اقتضى الأمر.

حالات الألم الحاد

يجب أن يُستخدَم عقار إيتوريكوكسيب للعلاج فى فترة الألم الحاد فقط.

مرض النقرس

الجرعة الموصى بها هي ١٢٠ مجم مرة واحدة فى اليوم، ويجب استخدامها فقط خلال فترة الألم الحاد، وتقتصر على حد أقصى ٨ أيام من العلاج.

الألم التالى للخصوع لعملية جراحية فى الأسنان

الجرعة الموصى بها هي ٩٠ مجم مرة واحدة يوميًا، وتقتصر على حد أقصى ٣ أيام من العلاج.

الأشخاص المصابون بمشاكل فى الكبد

إذا أصببت بمرض خفيف فى الكبد، فيجب ألا تتناول أكثر من ٦٠ مجم فى اليوم. إذا أصببت بمرض معتدل فى الكبد، يجب ألا تتناول أكثر من ٦٠ ملغ كل يومين أو 30 ملغ كل يوم.

الاستعمال فى الأطفال والمراهقين

يجب ألا يتم إعطاء عقار أر كوكسيا للأطفال والمراهقين الأقل من ١٦ عامًا.

المرضى من كبار السن

لا يستلزم الأمر تعديل الجرعة فى المرضى من كبار السن، كما هو الحال مع الأدوية الأخرى، يجب توخى الحذر فى المرضى من كبار السن.

طريقة التناول

عقار أر كوكسيا معد للتناول عن طريق الفم فقط. تناول الأقر ارض مرة واحدة فى اليوم، يمكن تناول عقار أر كوكسيا مع الطعام أو بدونه.

إذا تناولت كمية أكثر مما يجب من عقار أر كوكسيا

يجب ألا تتناول كمية أقر ارض أكثر من التي أوصاك بها طبيبك. إذا تناولت بالفعل كمية كبيرة للغاية من عقار أر كوكسيا أقر ارض، فيجب أنّ تلجأ إلى العناية الطبية فورًا.

إذا أغلقت تناول عقار أر كوكسيا

من الهام تناول عقار أر كوكسيا على النحو الذى وصفه لك طبيبك، إذا أغلقت تناول جرعة، عليك فقط أن تتأكد جدول تناوله المعتاد فى اليوم التالى، لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض جرعة أغلقتها.

إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية حول استخدام هذا الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

4. التآثيرات الجانبية المُحتملة

مثل كافة الأدوية، قد يُسبب هذا الدواء آثارًا جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع. إذا أصببت باي من هذه العلامات فيجب أنّ تتوقف عن تناول عقار أر كوكسيا، وتحدّث إلى طبيبك فورًا (**انظر "ما الذى تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار أر كوكسيا" فى القسم ٢**):

- ضيق النَّفس، آلام فى الصدر، أو ظهور تورّم فى الكاحل أو إذا ساعات الحالة.
- اصفرار الجلد والعينين (يرقان) - تُعدّ هذه علامة على وجود مشاكل بالكبد.
- آلم شديد، أو مستمرّ فى المعدة، أو براز أسود.
- تفاعل حساسية- يُمكن أنّ يشمل مشاكل بالجلد مثل: قرح أو نطفات، أو تورّم الوجه أو الشفان أو السنان أو الحلقّ مما قد يُسبب صعوبة فى التّنفّس.

يُعرف معتلّ تكرار الآثار الجانبية المُحتملة المُدرّجة أدناه باستخدام الاصطلاحات الآتية:

- شائعة جدًا (تؤثر على أكثر من مستخدم واحد من بين كل ١٠ مستخدم).
- شائعة (تؤثر على مستخدم واحد إلى ١٠ من بين كل ١٠٠ مستخدم).
- غير شائعة (تؤثر على مستخدم واحد إلى ١٠ من بين كل ١٠٠٠ مستخدم).
- نادرة (تؤثر على مستخدم واحد إلى ١٠ من بين كل ١٠٠٠٠ مستخدم).
- نادرة جدًا (تؤثر على أقل على مستخدم واحد من بين كل ١٠٠٠٠ مستخدم).
- يُمكن أنّ تحدث الآثار الجانبية الآتية أثناء العلاج بعقار أر كوكسيا:

شائعة جدًا

- آلم بالمعدة.

شائعة

- التجفيف الجاف (التهاب) وآلم بعد خلغ (الأسنان).
- تورّم الساقين وآل القدمين بسبب احتباس السوائل (وذمة).
- دوخة، صداع.
- خفقان (سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب)، عدم انتظام النّظْم القلبي (اضطرابات النّظْم القلبي).
- ارتفاع ضغط الدّم.
- أزيز بالصندر أو ضيق النَّفس (تشنّج قسئى).
- إسهال، ربح (غازات مفرطة)، التهاب المعدة (التهاب بطانة المعدة)، حموضة، إسهال، عسر الهضم/ شعور غير مريح بالمعدة، غثيان، إعياء (قيء)، التهاب المريء، قرح بالمف.
- تضوّرات فى نتائج اختبارات الدّم المتعلقة بالكبد.
- تكتّم.
- ضعف وإرهاق، مرض شبيه بالإنفلونزا.

غير شائعة

- التهاب المعدة والأمعاء (التهاب الجهاز الهضمى الذى يشمل المعدة والأمعاء الدقيقة/نزلة برد بالمعدة)، عدوى الجهاز التّنفسى العلوى، عدوى المسالك البولية.
- تضوّرات فى القيم المعملية (انخفاض عدد خلايا الدّم الحمراء، انخفاض عدد خلايا الدّم البيضاء، انخفاض الصفائح التّموية).
- فرط الحساسية (تفاعل حساسية يشمل شرى [إرتكاريا] قد يكون خطيرًا لدرجة تتطلب عناية طبية فورية).
- زيادة أو قلة الشهية، زيادة الوزن.
- القلق، الاكتئاب، قلة التّركيز، رغبة أو سماع أو الإحساس بأشياء غير موجودة (هلاوس).
- تغيّر مذاق، عدم القدرة على التّوّم، تميّل أو وخز، نُعاس.
- عدم وضوح الرؤية، تهيّج العين واحمرارها.
- طنين بالأذن، دوام (إحساس بالدوار أثناء السكون).
- اضطراب النّظْم القلبي (الرجفان الأذينى)، تسارع معتلّ ضربات القلب، فشل القلب، الشعور بضيق أو ضغط أو تقلّ بالصندر (نبضة صدرية)، نبوة قلبية.
- احمرار الجلد، سكتة دماغية، سكتة دماغية صغرى (نبوة إقفارية عابرة)، ارتفاع شديد فى ضغط الدّم، التهاب الكبد (التهاب الكبدية التّموية).
- سعال، غشّر التّنفّس، نزيف من الأنف.
- انتفاخ المعدة أو الأمعاء، تضوّرات فى طبيعة عمل الأمعاء، جفاف الفم، قرحة بالمعدة، التهاب بطانة المعدة الذى قد يصبح خطيرًا، وقد يؤدي إلى التّزيف، متلازمة القولون التّهيّج، التهاب البنكرياس.
- تورّم الوجه، طفح جلدي أو حكة بالجلد، احمرار الجلد.
- تلفص/ تشنّج عضلى، آلم/ تصلّب عضلى.
- ارتفاع مستويات اليوتسيوم فى دمك، تضوّرات فى نتائج اختبارات الدّم أو البول المتعلقة بالكلى، مشاكل خطيرة بالكلى.
- آلم بالصندر.

نادرة

- وذمة وعناية (تفاعل حساسية مصحوبة بتورّم الوجه، الشفان، اللسان وآل الحلقّ قد يُسبب صعوبة فى التّنفّس أو البلع، مما قد يكون خطيرًا بما يكفي ليستلزم العناية الطبية الفورية) تفاعلات تأقية/تأقية تشمل الصدمة (تفاعل حساسية خطير يتطلب العناية الطبية الفورية).
- ارتباك، تملل.
- مشاكل الكبد (تهاب الكبد).
- انخفاض مستويات الصوديوم فى الدّم.
- فشل كبدي، اصفرار الجلد وآل العينين (يرقان).
- التفاعلات الجذبية الشديدة.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا ظهرت لديك أية آثار جانبية، فتحدّث إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك؛ يشمل ذلك أية آثار جانبية مُحتملة، غير المُدرّجة فى هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يُمكنك المساعدة فى تقديم المزيد من المعلومات حول أمان هذا الدواء.

5. كيفية تخزين عقار أر كوكسيا

يُحفظ هذا الدواء بعيدًا عن روية ومُتناول الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة الكرتونية، يُشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يرجى تخزينه فى مكان لا تتعدى فيه الحرارة ٣٠ درجة مئوية الشرائط؛ يجب التّخزين داخل العبوة الأصلية للحماية من الرطوبة.

لا تتخلص من الأدوية عن طريق إلقائها فى مياه الصرف أو مع المخلفات المنزلية، استشر الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلّص من الأدوية التي لم تُعدّ تستخدمها. سوف تُساعد هذه الإجراءات فى الحفاظ على البيئة.

6. محتويات عبوة ومعلومات أخرى

- المادة الفعالة هي إيتوريكوكسيب، يحتوي كل قرص مُغلّف على ٦٠ أو ٩٠ أو ١٢٠ مجم من إيتوريكوكسيب.
- المكونات الأخرى هي:
- المحتوى الداخلى: فوسفات هيدروجين الكالسيوم (١ ملاتى)، كروسكارمبولز الصوديوم، سترات الماغنسيوم، سليلوز دقيق التّفلور.
- العلاف الخارجى للقرص: شمع كبرونا، لاكتوز أحادي الهيدرات، هيبروميلوز، ثانى أكسيد التيتانيوم (E171)، ثلثى الأستين. تحتوي أيضًا الأقر ارض التي تحوى جرعة قدرها ٦٠ مجم على أكسيد الحديد الأصفر (E172)، مادة ملوّنة) وإندجوكازميين ليك (E132)، مادة ملوّنة).

ما هو شكل عقار أر كوكسيا؟ وما هي محتويات العبوة؟

يتوافر عقار أر كوكسيا بثلاثة تركيزات:

أقر ارض مُغلّفة ٦٠ مجم، محببة الوجيهن، ذات لون أخضر غامق، على شكل تقاحة، على أحد جانبها العلامة "ARCOXIA 60" وعلى الجانب الأخر "200".

أقر ارض مُغلّفة ٩٠ مجم، محببة الوجيهن، ذات لون أبيض، على شكل تقاحة، على أحد جانبها العلامة "ARCOXIA 90"

على الجانب الأخر "202"

أقر ارض ١٢٠ مجم: أقر ارض باللون الأخضر الشاحب، بشكل تقاحة ثنائية التحبب مغلّفة بـ شريط، ومكتوب على الوجه الأولى "لر كوكسيا 120" وعلى الثانية "204".

أحجام العبوات: ٦٠، ٩٠، ١٢٠ مجم

تشمل العطب المختلفة ١٢، ٥٧، ١٤، ١٠، ٢٠، ٤٠، ٥٠، ٨٤، ١٠٠ أو ١٠٠ قرص، أو مجموعة علب تحتوي على ٩٨ قرص (عطينان تحتوي كل منهما ٤٩ قرص) فى أشرطة. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

مالك حق التسويق وجهة التصنيع الشركة الصالطة ويتم إصدار التشغيلية من قبل:

- ميرك شارب ودوم المحدودة،
- طريق هيرتفورد، هويدسون، هيرتفوردشاير
- أي أن ٩١١ بي بى، بوم الملكة المتّحدة
- الشركة الصالطة:**
- فروس تبيبرا كاس آى
- فيا كومبوتانتسيه ١٤
- ٢٨٨٠٥ أكالا دي هيناريس
- مدريد، إسبانيا

يتم تصنيعها من قبل:

ميرك شارب و دوم بي، في،

وإردريج ١٢٩، ٢٠٢١ بي إن هارلم، هولندا

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة فى إبريل ٢٠١٦.

إن هذا الدواء

- متحضّر يؤتّر على صحتك واستهلاكه خلافًا للتعليمات يمرضك للخطر.
- تتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذى باعك الدواء.
- الطبيب والصيدلي هما الشفابن فى الدواء ومنافع ومخاطره.
- لا توقف العلاج من تلقاء نفسك.
- لا تتكر وصف الدواء بلا استشارة الطبيب.

لا تتراك الأدوية فى متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدلة العرب.