

معلومات لمستخدم الدواء: النشرة الداخلية للمستهضر الصيدلاني

- اروكسيا أقراص مغلفة 30 ملغم
- اروكسيا أقراص مغلفة 60 ملغم
- اروكسيا أقراص مغلفة 90 ملغم
- اروكسيا أقراص مغلفة 120 ملغم
- إيتوريكوكسيب

قُم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل البدء بتناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك:

- احتفظ بهذه النشرة، لأنك قد تحتاج إلى قراءتها لاحقاً.
- في حال كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي.
- إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان هذا الشخص يعني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.
- قم بالارتصال بطبيبك أو الصيدلي أو الممرض في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بمرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة. اقرأ البند 4.

في هذه النشرة ما يلي:

- ما هو اركوكسيا وما هي دواعي استعماله
- ما يجب معرفته قبل تناول اركوكسيا
- كيف تتناول اركوكسيا
- الأعراض الجانبية المحتملة
- كيف يُخزّن اركوكسيا
- محتوى العبوة ومعلومات إضافية

1. ما هو اركوكسيا وما هي دواعي استعماله

ماهو اركوكسيا؟

- اروكسيا يحتوي على مادة فعالة تسمى إيتوريكوكسيب. ينتمي الدواء اركوكسيا إلى فئة من الأدوية تسمى مثبطات كوكس-2 الانتقائية. وتنتمي هذه الفئة من الأدوية إلى فئة أخرى يُطلق عليها مضادات التهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

ماهي دواعي استخدامه؟

- يساعد اركوكسيا على تقليل الشعور بالألم والتورم (التهاب) في المفاصل والمعضلات في المرضى الذين تتراوح أعمارهم من 16 سنة فما فوق ويعانون الفصال العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الفقار المقسط والتقرس.
- يُستخدم اركوكسيا أيضاً لعلاج قصير الأمد للألم المتوسط بعد جراحة الإنسان في المرضى الذين تتراوح أعمارهم من 16 سنة فما فوق.

ما المقصود بمرض الفصال العظمي؟

الفصال العظمي مرض يصيب المفاصل. ينتج هذا المرض عن التحلل التدريجي لل غضروف الذي يغطي أطراف العظام. ويسبب هذا تورماً (التهاباً) وألماً وتوجعاً وتيبساً وعدم القدرة على الحركة.

ما المقصود بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي؟

التهاب المفاصل الروماتويدي عبارة عن مرض التهاب طويل الأمد يصيب المفاصل. يسبب هذا المرض الشعور بالألم والتورم وزيادة فقدان الحركة في المفاصل التي يصيبها. ويمكن أن يسبب أيضاً التهاباً في مناطق أخرى في الجسم.

ما المقصود بالتقرس؟

التقرس عبارة عن نوبات مفاجئة متكررة من التهاب المولم والأحمرار في المفاصل. تحدث هذه الحالة بسبب ترسب بلورات المعادن على المفاصل.

ما المقصود بمرض التهاب الفقار المقسط؟

التهاب الفقار المقسط عبارة عن مرض التهابي يصيب العمود الفقري والمفاصل الكبيرة.

2. ما يجب معرفته قبل تناول اركوكسيا

لا تتناول اركوكسيا

- في حالة فرط الحساسية تجاه مادة إيتوريكوكسيب أو من أي مكونات أخرى في هذا الدواء. (مذكور في البند 6)
- في حالة فرط الحساسية لمضادات التهاب غير الستيرويدية بما فيها الأسبرين ومثبطات كوكس-2 (مذكور في البند 4)
- في حالة الإصابة بفرحة متعوية أو نزيف في المعدة أو الأمعاء
- في حالة الإصابة بمرض خطير في الكبد
- في حالة الإصابة بمرض خطير في الكلى
- في حالة الحمل أو احتمال حدوث حمل أو الرضاعة الطبيعية بالنسبة إلى النساء (مذكور في البند "الحمل والرضاعة الطبيعية والإخصاب")
- إذا كان عمر المريض أقل من 16 سنة
- في حالة الإصابة بمرض التهاب الأمعاء مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي أو التهاب القولون
- إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الذي لم يتم السيطرة عليه بالعلاج (راجع الطبيب أو الممرضة إذا كنت لا تعلم هل يمكن السيطرة على ضغط الدم لديك بشكل كافٍ لم لا)
- إذا كان الطبيب قد شخّص لديك مشكلات في القلب بما فيها فشل القلب (متوسط أو خطير)، أو ذبحة صدرية (ألم تشيبي في الصدر)
- أو إذا أصبت بآزمة قلبية أو أجريت لك جراحة تحويلية، أو إذا كنت مصابًا بمرض في الشرايين المحيطة (ضعف الدورة الدموية في الساقين أو الأرجل أو الأقدام بسبب ضيق أو انسداد الشرايين)
- أو إذا أصبت بأي نوع من السكتات الدماغية (بما في ذلك سكتة دماغية مصغرة أو نوبة إقفارية عابرة). قد تؤدي مادة إيتوريكوكسيب إلى زيادة طفيفة في التعرض لنوبات قلبية وسكتات دماغية ، ولذا ينبغي عدم تناوله من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب أو السكتات الدماغية.

لا تأخذ هذه الأقراص حتى تستشير الطبيب إذا كنت تظن أن أيًا من هذه الحالات ينطبق عليك. تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول اركوكسيا :

- إذا كان لديك تاريخ طبي بنزيف أو قرحات في المعدة.
- في حالة الجفاف، على سبيل المثال بسبب القيء أو الإسهال لمدة طويلة.
- في حالة الإصابة بتورم بسبب احتباس السوائل في الجسم.
- وجود تاريخ الإصابة بفشل القلب أو أي مرض آخر من أمراض القلب.
- وجود تاريخ بالإصابة بضعط الدم المرتفع. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم في بعض الأشخاص، خصوصاً عند تناول جرعات عالية منه، وينبغي أن يقوم الطبيب بفحص ضغط الدم لديك من وقت إلى آخر.
- وجود تاريخ بمرض في الكبد أو الكلى.
- في حالة العلاج من عدوى. يمكن أن يخفي اركوكسيا الحمى التي تُعد علامة على وجو عدوى.
- الإصابة بمرض السكري أو ارتفاع الكوليسترول أو التدخين. يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة احتمال التعرض لمرض القلب.
- في حالة الرغبة في الحمل بالنسبة إلى الإناث.
- إذا كان عمرك يتعدى 65 عامًا.

في حالة عدم التأكد من وجود أي من الحالات المذكورة أعلاه لديك، **ينبغي استشارة الطبيب قبل استخدام اركوكسيا** للتأكد من ملاءمة هذا الدواء لحالتك. يعمل دواء اركوكسيا بشكل جيد في كبار السن وفي الشباب على حد سواء. إذا كان عمرك يتعدى 65 عامًا، فينبغي للطبيب مراقبة حالتك باستمرار قدر المستطاع. لا حاجة إلى تعديل الجرعة للمرضى الذين يبلغون من العمر أكثر من 65 عامًا.

الأطفال والمراهقين

لا تعطى هذا الدواء للأطفال والمراهقين أقل من 16 عامًا.

استخدام أدوية أخرى مع اركوكسيا

يُرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول حاليًا - أو تناولت مؤخرًا - أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تحصل عليها دون وصفة طبية.

في حالة استخدام أي من الأدوية التالية تحديثًا: ينبغي للطبيب مراقبة حالتك للتأكد من فعالية الأدوية التي تستخدمها عند البدء في استخدام اركوكسيا:

- الأدوية التي ترقق الدم (مضادات التخثر) مثل وارفارين
- ريفامبين (مضاد حيوي)
- ميثوتريكسات (دواء يستخدم لتثبيط الجهاز المناعي، ويُستخدم غالبًا في حالة التهاب المفاصل الروماتويدي)
- سيكلوسبورين أو تاكلوروليموس (أدوية تُستخدم لتثبيط جهاز المناعة)
- الليثيوم (دواء يُستخدم لعلاج بعض أنواع الاكتئاب)
- الأدوية المستخدمة للسيطرة على ضغط الدم المرتفع وفشل القلب وتسمى مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسن و حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسن، مثل إنابابريل وراميرييل ولوزارتان وفالسارتان
- مدرات البول (أقراص الماء)
- ديجوكسين (دواء لعلاج فشل القلب واضطراب انتظام ضربات القلب)
- ميثونيدول (دواء لعلاج ضغط الدم المرتفع)
- سيبوتامول أقراص أو محلول فموي (دواء لعلاج الربو)
- جواب منع الحمل (يمكن أن تزيد من خطر الأعراض الجانبية)
- العلاج التعويضي بالهرمونات (يمكن أن تزيد من خطر الأعراض الجانبية)
- الأسبرين، احتمال التعرض لقرحات المعدة يزداد مع استخدام اركوكسيا مع الأسبرين.
 - الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية:
- يمكن استخدام اركوكسيا مع جرعات منخفضة من الأسبرين. إذا كنت تستخدم جرعة منخفضة من الأسبرين حاليًا للوقاية من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية ، فينبغي عدم التوقف عن تناول الأسبرين إلا بعد استشارة الطبيب في ذلك.
- الأسبرين ومضادات التهاب غير الستيرويدية الأخرى(NSAIDs):

لا تأخذ جرعة عالية من الأسبرين أو مضادات التهابات الأخرى أثناء استخدام اركوكسيا.

تناول اركوكسيا مع الطعام والشراب

قد يتسارع مفعول اركوكسيا عند تناوله بدون الطعام.

الحمل والرضاعة الطبيعية والإخصاب

الحمل

يجب عدم استخدام أقراص اركوكسيا أثناء الحمل. إذا كانت المريضة حامل أو تظن أنها حامل، أو إذا كانت تخطط للحمل، فينبغي ألا تأخذ هذه الأقراص. في حالة حدوث حمل، يجب التوقف عن استخدام هذا الدواء والأقراص واستشارة الطبيب. يجب استشارة الطبيب في حالة عدم التأكد من هذا الأمر أو الحاجة إلى مزيد من النصائح والمعلومات.

الرضاعة الطبيعية

من غير المعروف إذا كان اركوكسيا يمر في حلال حليب الأم. ينبغي استشارة الطبيب في حالة الرضاعة الطبيعية أو التخطيط للرضاعة الطبيعية قبل استخدام اركوكسيا. في حالة استخدام اركوكسيا؛ يجب التوقف عن الرضاعة الطبيعية.

الخصوبة

لا يوصى باستعمال اركوكسيا لدى النساء اللواتي يحاولن الإنجاب.

القيادة واستخدام الآلات

تم الإبلاغ عن حدوث دوار ونعاس في بعض المرضى الذين يستخدمون اركوكسيا.

يجب عدم القيادة إذا كان المريض يُصاب بدوار أو نعاس.

يجب عدم استخدام أي أدوت أو آلات إذا كان المريض يُصاب بدوار أو نعاس.

يحتوي اركوكسيا على اللاتكوز

إذا كان الطبيب قد أخبرك أنك لا تتحمل بعض أنواع السكر، فافصل بالطبيب قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي عقار اركوكسيا على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ملليوم صوديوم (23 ملغم) لكل قرص مغلف ، وهذا يعني بشكل أساسي "حالة من الصوديوم".

3. كيف تتناول اركوكسيا

يؤخذ اركوكسيا حسب إرشادات الطبيب دائمًا. ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة عدم التأكد من كيفية الاستخدام.

لا تأخذ أكثر من الجرعة الموصى بها لحالتك. ينبغي للطبيب أن يناقش معك نظام العلاج من وقت لآخر. من المهم استخدام أقل جرعة تحقق السيطرة على الألم وعدم استخدام أقراص اركوكسيا لمدة أطول من اللازم. وذلك لأن احتمال الإصابة بنوبات قلبية أو سكتات دماغية قد يزيد بعد استخدام العلاج لفترة طويلة، خصوصاً على جرعات العالية.

هناك عدة تركيز متوفرة من هذا الدواء، واعتمادًا على حالتك سيوصف لك الطبيب الجرعة المناسبة لك.

الجرعة الموصى بها هي:

الفصال العظمي

الجرعة الموصى بها هي 30 ملغم ، ويمكن زيادتها إلى 60 ملغم مرة واحدة يوميًا عن الحاجة.

التهاب المفاصل الروماتويدي

الجرعة الموصى بها هي 60 ملغم مرة واحدة يوميًا، ويمكن زيادتها إلى 90 ملغم مرة واحدة يوميًا عن الحاجة.

التهاب الفقار المقسط

الجرعة الموصى بها هي 60 ملغم مرة واحدة يوميًا، ويمكن زيادتها إلى 90 ملغم مرة واحدة يوميًا عن الحاجة.

حالات الألم الحاد

ينبغي استخدام مادة إيتوريكوكسيب خلال فترة الألم الحاد فقط.

التقرس

الجرعة الموصى بها هي 120 ملغم مرة واحدة في اليوم في حالة الألم الحاد فقط وتقتصر على 8 أيام فقط كحد أقصى للعلاج.

الألم بعد جراحة الأسنان

الجرعة الموصى بها هي 90 ملغم مرة واحدة في اليوم وتقتصر على 3 أيام كحد أقصى للعلاج.

المرضى المصابين باضطراب في الكبد

- في حالة الإصابة باضطراب بسيط في الكبد ، ينبغي ألا تزيد الجرعة عن 60 ملغم في اليوم.
- في حالة الإصابة باضطراب متوسط في الكبد، ينبغي ألا تزيد الجرعة عن **30 ملغم في اليوم.**

الإستخدام لدى الأطفال والمراهقين

يجب عدم استخدام اركوكسيا لدى الأطفال أو المراهقين تحت 16 عامًا.

كبار السن

لا حاجة لتعديل الجرعة للمرضى الكبار في السن. مثل باقي الأدوية، يجب إتخاذ الحيطه لدى المرضى الكبار في السن.

كيفية تناول الجرعة

تؤخذ أقراص اركوكسيا عن طريق الفم مرة واحدة في اليوم. يمكن تناول أقراص اركوكسيا مع الطعام أو بدون الطعام.

في حالة تناول جرعة زائدة من اركوكسيا

ينبغي عدم تناول أقراص زائدة عن الجرعة التي أوصى بها الطبيب. في حالة تناول عدد كبير من أقراص اركوكسيا أكثر من اللازم؛ ينبغي طلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة نسيان جرعة اركوكسيا

من المهم تناول أقراص اركوكسيا حسب تعليمات الطبيب. ولكن إذا نسيبت جرعة، فكل ما عليك أن تواصل تناول الجرعة حسب الجدول المعتاد في اليوم التالي. لا تتناول جرعة مزدوجة لتعويض الجرعة الفائتة.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى بشأن استخدام هذا الدواء، فينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية المحتملة

مثل سائر الأدوية، يمكن أن يسبب اركوكسيا أعراضًا جانبية وإن كانت لا تحدث مع جميع الأشخاص الذين يستخدمونه.

- في حالة الإصابة بأي من هذه الأعراض؛ يجب التوقف عن تناول اركوكسيا واستشارة الطبيب على الفور (انظر ما يجب معرفته قبل تناول اركوكسيا، البند 2):**
- حدوث قصور في التنفس أو ألم في الصدر أو تورم الكاحل، أو تفاقم هذه الحالات
- اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان) - علامات على مشكلات في الكبد
- ألم شديد أو مستمر في المعدة أو إخراج براز أسود اللون
- أعراض رد الفعل التحسسي التي قد تشمل مشكلات جلدية مثل التقرحات أو التطفف، أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق مما قد يسبب صعوبة في التنفس
- يعتمد مدى تورم الكاحل الجانبية الممكنة المذكورة أعناه على استخدام القاعدة التالية: أعراض شائعة جدًا (تؤثر في أكثر من شخص 1 من كل 10 أشخاص) أعراض شائعة (تؤثر في شخص 1 من كل 10 أشخاص من كل 100 شخص) أعراض غير شائعة (تؤثر في شخص 1 حتى 10 أشخاص من كل 1000 شخص) أعراض نادرة (تؤثر في شخص 1 حتى 10 أشخاص من كل 10000 شخص) أعراض نادرة جدًا (تؤثر في أقل من شخص 1 من كل 10000 شخص) يمكن أن تحدث الأعراض الجانبية التالية أثناء العلاج بأقراص اركوكسيا:

أعراض شائعة جدًا:

ألم في المعدة

أعراض شائعة:

- جفاف تجويف الأنسان (التهاب وآلم بعد قلع الأسنان)
- تورم في الساقين *و/ أو* التقيؤ بسبب احتباس السوائل (وذمة)
- الدوخة، الصداع
- خفقان (سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب)، عدم انتظام إيقاع ضربات القلب.
- ارتفاع ضغط الدم
- الصدير أو قصر في التنفس (صعوبة في التنفس)
- الإسهال، الريح (الغازات)، إلتهاب المعدة (التهاب بطانة المعدة) ، حرقة، إسهال، عسر الهضم، عدم راحة المعدة، غثبات، تقيؤ، إلتهاب المريء، وتقرحات الفم.
- تغيرات في نتائج اختبارات الدم المرتبطة بالكبد
- كدمات
- الضعف والتعب، تعب يشبه الإنفلونزا

أعراض غير شائعة:

- التهاب المعدة والأمعاء، (التهاب الجهاز الهضمي الذي يشمل المعدة والأمعاء الدقيقة/إنفلونزا المعدة)، التهاب الجهاز التنفسي العلوي، التهاب المسالك البولية
- تغير في القراءات المخبرية (نقص عدد خلايا الدم الحمراء، نقص عدد خلايا الدم البيضاء، نقص عدد الصفائح الدموية)
- الحساسية المفرطة (رد الفعل التحسسي بما في ذلك الشرى التي قد تكون خطيرة بما يكفي لتخلل عناية طبية فورية)
- زيادة أو قلة الشهية، زيادة الوزن
- قلق، اكتئاب، انخفاض في الحدة الذهنية: رؤية أو شعور أو سماع أشياء غير موجودة (هالوسية)
- تغير في الطعم، عدم القدرة على النوم، تدمير، الشعور بالوخز، النعاس
- عدم وضوح الرؤية، تهيج واحمرار العين
- طنين في الأذن، دوار (الشعور بالدوار رغم الامتناع عن الحركة)
- اضطراب انتظام القلب (رجحان أدنيي)، سرعة ضربات القلب، فشل القلب، شعور بالضيق، ضغط أو ثقل في الصدر (ذبحة صدرية)، سكتة قلبية
- احمرار، سكتة دماغية، سكتة دماغية بسيطة (نوبة نقص تروية عابرة)، ارتفاع حاد في ضغط الدم
- التهاب الأوعية الدموية
- إسهال، ضيق نفس، نزف الأنف
- استخدام المعدة أو الأمعاء، اضطرابات الأمعاء، جفاف الفم، قرحة المعدة، إلتهاب في المعدة ممكن أن يكون حادًا ويؤدي إلى نزيف، متلازمة القولون العصبي، إلتهاب البنكرياس
- انتفاخ الوجه، حكة جلدية، احمرار الجلد.
- تشنج العضلات، التهابات في العضلات
- ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم، تغيرات في اختبارات الدم أو البول المتعلقة بالكل، مشاكل خطيرة في الكلى
- ألم في الصدر

أعراض نادرة:

- وذمة وعائية (حالة من الحساسية يصاحبها انتفاخ الوجه، الشفتان، اللسان، الحلق، التي تؤدي إلى صعوبة في التنفس أو البلع التي تتطلب العناية الطبية الفورية)، ردود الفعل التحسسية بما في ذلك الصدمات (التي تتطلب العناية الطبية الفورية)، الارتباك، والأرق
- مشاكل في الكبد (التهاب الكبد)
- انخفاض مستوى الصوديوم في الدم
- فشل الكبد، إسهال أو العين (اليرقان)
- ردود فعل جلدية خطيرة

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية المحتملة:

اتصل بالطبيب أو الصيدلي في حال تعرّضك لأي أعراض جانبية محتملة بالإضافة إلى تلك غير المذكورة في هذه النشرة. يُمكنك تأمين المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء من خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية.

5. كيف يُخزّن اركوكسيا

يحفظ في درجة حرارة دون 30 درجة مئوية.

يُحفظ بعيدًا عن متناول أيدي ومرأى الأطفال

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المكتوب على العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر المكتوب.

اشروطة أقراص الدواء: تحفظ في العبوة الأصلية لحمايتها من الرطوبة.

ينبغي عدم التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لا تحتاج إليها. سوف تساعد هذه التدابير على حماية البيئة.

6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية

محتويات الدواء اركوكسيا

المادة الفعالة هي إيتوريكوكسيب. يحتوي كل قرص مغلف بطبقة رقيقة على مادة إيتوريكوكسيب بتركيز 30، 60، 90، أو 120 ملغم.

المكونات الأخرى هي:

محتوى الأقراص: فوسفات هيدروجين الكالسيوم (لا مائي)، كروسكراميلوز، صوديوم، سيترات المغنيسيوم، سيلولوز دقيق التبلور. غلاف القرص: شمع الكزنوبا، لكتوز أحادي الهيدرات ، هيبرميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، تريديمين. كما تحتوي الأقراص بتركيزي 60 ملغم و 120 ملغم (E132)، عامل تلوين.
محتوى الحديد الأصفر (E172)، عامل تلوين) ومادة أدينجو كلريمين ليك (E132)، عامل تلوين).

أشكال أقراص اركوكسيا ومحتويات العبوة

تتوفر أقراص اركوكسيا في أربعة تراكيز:

30 ملغم: القرص مغلف بطبقة رقيقة خضراء/أزرقاء اللون وعلى شكل نقاحة ومحدب من الجانبين، ومنقوش على أحد جانبي القرص عبارة 'ACX 30' وعلى الجانب الآخر الرقم '101'.

60 ملغم: القرص مغلف بطبقة رقيقة خضراء اللون وعلى شكل نقاحة ومحدب من الجانبين، ومنقوش على أحد جانبي القرص عبارة 'ARCOXIA 60' وعلى الجانب الآخر الرقم '200'.

90 ملغم: القرص مغلف بطبقة رقيقة بيضاء اللون وعلى شكل نقاحة ومحدب من الجانبين، ومنقوش على أحد جانبي القرص عبارة 'ARCOXIA 90' وعلى الجانب الآخر الرقم '202'.

120 ملغم: القرص مغلف بطبقة رقيقة بلون أخضر فاتح وعلى شكل نقاحة ومحدب من الجانبين، ومنقوش على أحد جانبي القرص عبارة 'ARCOXIA 120' وعلى الجانب الآخر الرقم '204'.

30 ملغم: أحجام عوات من 2، 7، 14، 20، 28، 49 و98 قرص أو أحجام عوات تحتوي 98 ملغم (عوبتين من 49) قرص في الشربة.

60 ملغم: أحجام عوات من 2، 5، 7، 10، 14، 20، 28، 30، 49، 84، 100 قرص أو أحجام عوات تحتوي على 98 ملغم (عوبتين من 49) قرص في الشربة.

90 و 120 ملغم: أحجام عوات من 2، 5، 7، 10، 14، 20، 28، 30، 49، 84 و 100 قرص أو أحجام عوات تحتوي على 98 ملغم (عوبتين من 49) قرص في الشربة.

60 و 90 و 120 ملغم: شراتح المنيوم/المنيوم (جرعات متفرقة) داخل عب تحتوي على 5 أو 50 و 100 قرص. قد لا يتم تسويق جميع التراكيز أو أحجام العوات.

الشركة المالكة لحقوق التسويق والصناعة والمصدرة للتشغيلية:

الشركة المالكة لحقوق التسويق:

أن. في. أورجانون، 5349 إي بي أو إس، كلوسترشترات 6، هولندا

الشركة الصانعة:

روفي فارما أنتسبريل سيرفيس، إس.إي.

140 - كوميلوتاتسيه،

28805 - ألكالا دي هيناريس

مندري، إسبانيا

الشركة المصدرة للتشغيلية:

ميرك شارب دودم بي.بي، ميرك كونسورشرات 39، 2031 بي أن هارلم، هولندا

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في يونيو/حزيران 2021

(هذا مستحضر دوائي)
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغيه وضروه
- لا تقبض مع العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك
- لا تتوقف صرف الدواء بدون وصفة طبية
- لا تتركز الأدوية في متناول أيدي الأطفال
- مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصادلة العرب