

يجب ألا يتم تناول عقار مايفورتيك إلّا إذا تم وصفه من قِبل الطبيب.

لا تتناول/تستخدم عقار مايفورتيك

قد يؤدي عقار مايفورتيك إلى حدوث عيوب خلقية شديدة في الأجنة التي لم تُولّد بعد كما يمكن أن يؤدي إلى حدوث الإجهاض. لذلك، لا تتناولي عقار مايفورتيك إذا كنتِ حاملًا، أو تعتقدين أنكِ حامل، أو تخططين للحمل أثناء خضوعكِ للعلاج أو خلال الـ 6 أسابيع التي تلي الخضوع للعلاج. لا تتناولي عقار مايفورتيك إذا كنتِ تمارسين الرضاعة الطبيعيّة. إذا كان من الممكن أن تصبحي حاملًا، فتحدّثي إلى طبيبك فورًا. ينبغي عليكِ إبلاغ طبيبك فورًا. ينبغي ألا يتم تناول أزاثيوبرين، وهو دواء آخر يُستخدم نظراً لضعف آليات الجسم الدفاعية، قد تحدث عدوى مسببات الأمراض بشكل أكثر تكرارًا. قد يؤثّر عقار مايفورتيك أيضًا على تكوّن الدّم بالنخاع العظمي. لذلك، إذا تعرّضتِ لآية علامات للعدوى (على سبيل المثال: حمّى، التهاب الحلق)، كدمة و/أو نزيف غير مُتوقّعين، ينبغي عليكِ إخبار طبيبك فورًا.

قد يجعل هذا الدّواء مرض كوفيد-19 أكثر شدةً. في هذه الحالات، سينظر طبيبك في اتخاذ التدابير السريرية المناسبة. أثناء الخضوع للعلاج بعقار مايفورتيك، قد تقل فعّاليّة الطّعيمات. ينبغي تجنب تلقي الطّعيم بلقاح حي. سيقدم لك طبيبك المشورة فيما إذا كان بإمكانك تلقي أحد مكونات عقار مايفورتيك الأخرى.

تحذيرات واحتياطات

قد يؤدي عقار مايفورتيك إلى حدوث عيوب خلقية شديدة في الأجنة التي لم تُولّد بعد كما يمكن أن يؤدي إلى حدوث الإجهاض. لذلك، تحدّثي إلى طبيبك بشأن أفضل وسيلة لمنع الحمل.

إذا كنت تعاني من أحد الاضطرابين الاستقلابيين النادرين وهما متلازمة ليش-نيهان أو متلازمة كيلي-سيجميلر، ينبغي ألا تتناول عقار مايفورتيك. لذلك، أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أيّ من هذين الاضطرابين.

يُضَعَف عقار مايفورتيك آليات جسمك الدفاعية. لهذا السبب، يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك، ينبغي عليك الحد قدر الإمكان من التعرّض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية من خلال ارتداء ملابس خاصة تحميك من أشعة الشمس واستخدام واقي شمسي ذي عامل حماية مرتفع بصفة منتظمة.

يمكن تناول كوليستيرامين (المُستخدم لخفض الدهون بالدّم)، بعض المضادات الحيوية، المادتين أسيكلوفير وجانسيكلوفير بهذه الأمراض. قد يُجري طبيبك اختبارات بالدّم كما قد يقوم بفحصك تحسبًا لظهور علامات هذه الأمراض لديك. إذا عانيت من أية أعراض (اصفرار الجلد والعينين، غثيان، فقدان الشهية، بول داكن)، ينبغي عليكِ إبلاغ طبيبك فورًا.

ينبغي ألا يتم تناول أزاثيوبرين، وهو دواء آخر يُستخدم لتثبيط الجهاز المناعي، مصاحبة عقار مايفورتيك. لا يمكن استبعاد احتمالية خفض عقار مايفورتيك لفعّاليّة وسائل منع الحمل المُستخدمة عن طريق الفم.

القدرة على استخدام الآلات أو ممارسة القيادة لا يبدو أن هذا الدّواء يُؤثّر على ردود الفعل، القدرة على ممارسة القيادة أو القدرة على استخدام الآلات.

يُرجى إخبار طبيبك أو الصيدلي الخاص بك في الحالات الآتية:

- إذا كنت تعاني من أية أمراض أخرى.
- إذا كنت تعاني من حالات حساسية أو
- إذا كنت تتناول أيّة أدوية أخرى أو تستخدمها استخدامًا خارجيًا (مما في ذلك الأدوية التي تحصل عليها دون وصفة طبية).

يُرجى عدم تناول عقار مايفورتيك إلا بعد التحدّث إلى طبيبك إذا كان لديك حالة معروفة من عدم تحمّل السكر.

مايفورتيك 180 مجم أقراص مغلّفة: يحتوي هذا الدّواء على أقل من 1 ملي مول (23 مجم) من الصوديوم في كل قرص مغلّف، وهو ما يجعله «خاليًا من الصوديوم» من النّاحية العملية.

مايفورتيك 360 مجم أقراص مغلّفة: يحتوي هذا الدّواء على 26 مجم من الصوديوم (المكوّن الأساسي للملح في كل قرص مغلّف. يُعادل ذلك 1.3% من كمية الصوديوم القصى الموصى البالغ بتناولها يوميًا في غذائه.

الحمل والرّضاعة الطبيعية

ينبغي ألا يتم تناول عقار مايفورتيك مصاحبة الأدوية التي تُستخدم لعلاج فرط حمض المعدة (مضادات الحموضة التي يضر بجنينكِ الذي لم يُولّد بعد كما أنه يزيد من خطر التعرض للإجهاض.

ينبغي أن تستمر في استخدام العقار ما دمت تحتاج إلى علاج مايفورتيك. لذلك، يجب إجراء اختبارين للحمل في غضون 8-10 أيام ويجب أن تكون نتيجهما سلبية، وقد يتعين إجراء الاختبار الثاني مباشرةً قبل بدء العلاج. ينبغي إجراء اختبارات حمل إضافية أثناء المواعيد الخاصة بالمتابعة.

إذا كان من الممكن أن تصبحي حاملًا إلا أنك لا تستطيعين استخدام وسائل منع الحمل اللازمة أو لا ترغبين في ذلك، فلا تتناولي عقار مايفورتيك. مع ذلك، اتصلي بطبيبكِ فورًا إذا أصبحتِ حاملًا.

يجب أن تستخدم السيدات اللاتي قد يصبحن حوامل وسيلتين موثوقيتن لمنع الحمل قبل استخدام عقار مايفورتيك وأثناء استخدامه ولمدة 6 أسابيع بعد استخدامه.

إذا كنتِ حاملًا أو تعتقدين أنكِ حامل أو تخططين لذلك، فتحدّثي إلى طبيبك بشأن ذلك.

إذا كنتِ تمارسين الرضاعة الطبيعيّة، فتحدّثي إلى طبيبك بشأن ذلك. لا تمارسي الرضاعة الطبيعيّة أثناء تناول عقار مايفورتيك. رفض العضو المزروع الخاص بك. لا تتوقف عن تناول دوائك تحت أي ظرف ما لم ينصحك طبيبك بذلك.

لا تُغيّر الجرعة الموصوفة من تلقاء نفسك. إذا شعرت أن تأثير دوائك أقوى من اللازم أو أضعف من اللازم، فتحدّث إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

الآثار الجانبية المُحتملة

قد تحدث الآثار الجانبية الآتية عند تناول عقار مايفورتيك:

شائعة جدًا (تؤثّر على أكثر من 1 من بين كل 10 مرضى):

إسهال: انخفاض في عدد خلايا الدّم البيضاء، الإصابة بالعدوى (انظر أدناه)؛ انخفاض تركيز الكالسيوم بالدّم مما يسبب تقلصات (انخفاض مستوى الكالسيوم الدّم) أحيانًا؛ ضعف بالعضلات، تقلصات عضلية، عدم انتظام النّظم القلبي (علامات مُحتملة لانخفاض مستوى البوتاسيوم بالدّم)؛ نتائج غير طبيعية لاختبارات الدّم (ارتفاع مستوى حمض اليوريك بالدّم (فرط حمض اليوريك بالدّم))؛ صداع، دوخة (علامات مُحتملة لارتفاع ضغط الدّم)؛ صداع، شعور بخفة الرأس (علامات مُحتملة لانخفاض ضغط الدّم).

لُوحظ حدوث تشوهات خلّقية في أطفال السيدات اللاتي تناولن أحد مشتقات حمض المايكوفينوليك مثل عقار مايفورتيك مصاحبة الأدوية الأخرى المخطّبة للمناعة أثناء فترة الحمل. حدث أيضًا إجهاض تلقائي (خلال الثلث الأول بشكل رئيسي) أثناء الحمل.

شائعة (تؤثّر على مريض واحد إلى 10 من بين كل 100 مريض):

سرعة حدوث النزيف والكدمات (علامات على انخفاض عدد الصفائح الدّموية)، فقر الدّم؛ تقلصات عضلية، عدم انتظام النّظم القلبي (علامات مُحتملة على ارتفاع مستوى البوتاسيوم بالدّم)؛ نتائج غير طبيعية لاختبارات الدّم (انخفاض مستوى

إذا أغفلت تناول عقار مايفورتيك، فتناولها عندما تدرّك ذلك ثم واصل تناول عقار مايفورتيك في الأوقات المعتادة. يُرجى استشارة طبيبك.

الآثار المُحتمّلة لإيقاف العلاج بعقار مايفورتيك

قد يُؤدي إيقاف العلاج بعقار مايفورتيك إلى زيادة خطر رفض العضو المزروع الخاص بك. لا تتوقف عن تناول دوائك تحت أي ظرف ما لم ينصحك طبيبك بذلك.

لا تُغيّر الجرعة الموصوفة من تلقاء نفسك. إذا شعرت أن تأثير دوائك أقوى من اللازم أو أضعف من اللازم، فتحدّث إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

الآثار الجانبية المُحتملة

قد تحدث الآثار الجانبية الآتية عند تناول عقار مايفورتيك؛ شائعة جدًا (تؤثّر على أكثر من 1 من بين كل 10 مرضى): إسهال: انخفاض في عدد خلايا الدّم البيضاء، الإصابة بالعدوى (انظر أدناه)؛ انخفاض تركيز الكالسيوم بالدّم مما يسبب تقلصات (انخفاض مستوى الكالسيوم الدّم) أحيانًا؛ ضعف بالعضلات، تقلصات عضلية، عدم انتظام النّظم القلبي (علامات مُحتملة لانخفاض مستوى البوتاسيوم بالدّم)؛ نتائج غير طبيعية لاختبارات الدّم (ارتفاع مستوى حمض اليوريك بالدّم (فرط حمض اليوريك بالدّم))؛ صداع، دوخة (علامات مُحتملة لارتفاع ضغط الدّم)؛ صداع، شعور بخفة الرأس (علامات مُحتملة لانخفاض ضغط الدّم).

أوهام؛ مشاكل بالكلى، تضيق الأنبوب الذي يعبر من خلاله البول، دم بالبول؛ سُعال، مشاكل في التنفس، ألم عند التنفس (علامات مُحتملة لمرض الرئة الخلالي، مما في ذلك التليف الرئوي المؤدي للوفاة)، طفح جلدي؛ حمّى، التهاب الحلق، عدوى متكررة (علامات مُحتملة لانخفاض خلايا الدّم البيضاء؛ ندرة خلايا المحببات)؛ تغيير في مستوى السكر في الدّم، ارتفاع الكوليسترول والدهون بالدّم؛ سرطان (انظر أدناه).

معدل التكرار غير معروف: (لا يمكن تقديره من واقع البيانات المتاحة):

حمّى، ألم بالمفاصل، تورّم المفاصل (المتلازمة الالتهابية الحادة المصاحبة لمثبطات التخليق الجديد للبيورينات).

إذا تناولت عقار مايفورتيك، فستكون أكثر عُرضة للإصابة بالعدوى بشكل أكثر من المعتاد. قد تكون العدوى ناجمة عن البكتيريا، الفيروسات أو الفطريات وقد تحدث في العديد من الأعضاء أو أجهزة الجسم. عدوى المسالك الهوائية العلوية شائعة إلا أن عدوى الجهاز البولي (حُرقة عند التبول والحاجة إلى التبول مرارًا أو بشكل أكثر إلحاحًا) والجلد أكثر شيوعًا.

الأعراض التالية قد تكون علامات على الإصابة بعدوى في المخ (اغْتِلَال بِيضَاء الدُّمَاع غَدِيد البُور المُتَرَقِّي): اضطرابات بصرية (على سبيل المثال: اضطرابات بمجال الرؤية)، اضطرابات حركية، فقدان الذاكرة، صعوبة التحدّث أو فهم الآخرين، ضعف العضلات. اتصل بطبيبكِ فورًا في مثل هذه الحالات.

بالنسبة لكافة المرضى الذين يتناولون مثبطات للمناعة، حدثت أيضًا إصابة بسرطان الجلد أو سرطان خلايا الدّم البيضاء أثناء الخضوع للعلاج بعقار مايفورتيك. التهاب العقد اللمفاوية قد يكون مؤشرًا على الإصابة بالآخر. حدوث تغير بالجلد يزداد حجمًا وله شكل غير معتاد أو لامع أو يشبه القرحة/التقرح ولا يخفّفي قد يكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان الجلد.

إذا لاحظت أيًا من الآثار الجانبية المدرجة أعلاه أو غيرها من الآثار الجانبية غير المذكورة بهذه النشرة، فأخبر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك. مع ذلك، ينبغي ألا تتوقف مطلقًا عن تناول هذا الدّواء دون مناقشة ذلك مع طبيبك.

معلومات إضافية

يُحفظ داخل العبوة الأصلية. لا يُخزّن في درجة حرارة تتعدى 30 درجة مئوية.

لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (= EXP) المطبوع على العبوة.

يُحفظ بعيدًا عن مُتناوّل الأطفال.

سيكون بإمكان طبيبك أو الصيدلي الخاص بك تزويدك بمزيد من المعلومات. فلدیهما القدرة على الوصول إلى المعلومات الوصفية الكاملة.

ما هي محتويات عقار مايفورتيك؟

نشا الذرة، بوفيدون (K-30)، كروسوفيدون، لاكلتوز، ثاني أكسيد السيليكون الغروي، ستيرات الماغنسيوم.

الغلاف الخارجي لقرص عقار مايفورتيك 180 مجم المقام لإفرازات المعدة يتكون من هيبروميلوز فثالات/هيدروكسي بروبيل ميثيل السيليلوز فثالات، ثاني أكسيد التيتانيوم، أكسيد الحديد الأصفر، إنديجوتين.

الغلاف الخارجي لقرص عقار مايفورتيك 360 مجم المقاوم لإفرازات المعدة يتكون من هيبروميلوز فثالات/هيدروكسي بروبيل ميثيل السيليلوز فثالات، ثاني أكسيد التيتانيوم، أكسيد الحديد الأصفر، أكسيد الحديد الأحمر.

قد تختلف المعلومات في بعض الدول.

التوافر/أحجام العبوة

لا يمكن الحصول على عقار مايفورتيك إلّا من الصيدليات بموجب وصفة الطبيب.

عقار مايفورتيك 180 مجم: 120 قرصًا مغلّفًا مقاومًا لإفرازات المعدة.

عقار مايفورتيك 360 مجم: 120 قرصًا مغلّفًا مقاومًا لإفرازات المعدة.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات في بلدك.

جهة التّصنيع

شركة نوفارتس فارما برودكشنز المحدودة، فير، ألمانيا لصالح شركة نوفارتس فارما إيه جي، بازل، سويسرا.

جهة إصدار التّشغيلة

شركة ليك المساهمة، بي إي برويزفودنجا ليندا، ترميليني 2 دي، ليندا، 9220 سلوفينيا.

تمّت آخر مراجعة لنشرة العبوة هذه من قِبل الوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية (سويسميديك) في يناير 2023.

نوفارتس فارما إيه جي، بازل، سويسرا

هذا منتج دوائي

- الدّواء منتج يُؤثّر على صحتك وتناوله على نحو مخالف للتعليمات يُعرضك للخطر.
- اتبع وصفة الطبيب بدقة وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي باعك الدّواء.
- الطبيب والصيدلي هما خبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.
- لا توقف من تلقاء نفسك فترة العلاج التي تم وصفها لك.
- لا تكرر نفس الوصفة الطبية دون استشارة طبيبك.

تُحفظ جميع الأدوية بعيدًا عن مُتناوّل الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيدالة العرب