

أثناء تناول كيبيرا

- إذا لاحظت أي تباطؤ في نمو طفلك أو نموه غير المتوقع إلى سن البلوغ، اتصل بطبيبك.
- عدد قليل من الأشخاص الذين عولجوا بمضادات الصرع مثل كيبيرا تواتبهم بعض الأفكار حول إيذاء أنفسهم أو الانتحار. إذا وانتك هذه الأفكار في أي وقت، فاقصص بطبيبك على الفور.
- إذا لاحظت أي سلوكيات غير طبيعية ويؤخذ دواء "كيبيرا"، إذا لاحظت أنت أو عائلتك وأصدقائك تغيرات مهمة في الحالة المزاجية أو السلوك، فاقصص بطبيبك على الفور.

- نادرا ما تتفاقم نوباتك أو تصبح أكثر حدوثًا، خاصة خلال الشهر الأول من بدء العلاج من أي أسئلة أخرى، فيُرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء لك فقط. لا توصى الآخرين باستخدامه ولاتمرره لهم، فقد يسبب لهم الضرر، حتى لو كانت أعراض المرض لديهم هي نفسها التي تظهر لديك.

- إذا أصبح أي عرض من الأعراض الجانبية خطيرًا، أو إذا عانيت من أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى إعادة قرائتها لاحقًا
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، فيُرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي. تم وصف هذا الدواء لك فقط. لا توصى الآخرين باستخدامه ولاتمرره لهم، فقد يسبب لهم الضرر، حتى لو كانت أعراض المرض لديهم هي نفسها التي تظهر لديك.
- إذا أصبح أي عرض من الأعراض الجانبية خطيرًا، أو إذا عانيت من أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.

محتويات هذه النشرة:

- ما هو كيبيرا ودواعي الاستخدام**
- كيفية استخدام كيبيرا**
- كيفية استخدام كيبيرا**
- الأعراض الجانبية المحتملة**
- كيفية حفظ كيبيرا**
- معلومات إضافية**

- ما هو كيبيرا ودواعي الاستخدام**

يحتوي كيبيرا على العنصر النشط ليفيتيراستيماب، وينتمي إلى الأدوية

المضادة للصرع، والتي تستخدم لعلاج نوبات الصرع.

يستخدم كيبيرا بمفرده لعلاج التالي:

- نوبات جزئية موضعية، سواء المصحوبة بنوبات عامة ثانوية أو بدونها (الصرع الذي تؤثر فيه النوبات مبدئيًا على جانب واحد فقط من الدماغ، مع قابلية امتدادها لللاحق إلى مناطق أكبر على جانبي الدماغ) عند البالغين والمراهقين من سن ١٦ عامًا فما فوق، والذين تم تشخيصهم حديثًا بالصرع

عند تناوله مع الأدوية الأخرى المضادة للصرع، يستخدم كيبيرا لعلاج التالي:

- نوبات جزئية موضعية، سواء المصحوبة بنوبات عامة ثانوية أو بدونها، عند البالغين والمراهقين والأطفال والرضع من عمر شهر واحد والمصابين بالصرع

- نوبات الرُّمَع العَضَلِيّ (ارتجاجات قصيرة تشبه الصدمة لعضلة أو مجموعة من العضلات) لدى البالغين والمراهقين من عمر ١٢ عامًا الذين يعانون من الصرع الرومي العضلي الشبكي
- نوبات الصرع التوتُّرِيَّة-الزَّمْجِيَّة الأولى العامة (النوبات الرنيسبي، بعد التقييم الدقيق.

يجب ألا تتوقف عن تناول الدواء دون استشارة طبيبك. لا يمكننا ان نستبعد تمامًا خطر حدوث عيوب خلقية لطفلك الذي لم يولد بعد. أظهرت كيبيرا بعض الآثار الإنجابية غير المرغوب فيها في الدراسات التي تمت على الحيوانات.

لا ينصح بالرضاعة الطبيعية أثناء تناول كيبيرا. يمكن أن تنتقل المكونات إلى حليب الثدي. استشيري طبيبك حول هذا الموضوع.

القيادة واستخدام الآلات

يمكن أن يجعلك كيبيرا تشعر ببعض الدوخة أو النعاس ولها آثار جانبية

أخرى تجعلك أقل يقظة، ومن الأرجح حدوث ذلك في بداية العلاج أو بعد زيادة في الجرعة.

← لا تقود السيارة أو تستخدم الآلات إلا إذا كنت متأكدًا من أنك لا تعاني من أي من هذه الآثار.

- كيفية تناول كيبيرا**

الكمية الواجب تناولها

احرص دائمًا على تناول كيبيرا كما أخبر طبيبك تمامًا. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

اتبع تعليمات الطبيب فيما يخص عدد الأقراص/ المحلول الفموي الواجب تناوله

يجب أن تؤخذ كيبيرا مرتين في اليوم، مرة واحدة في الصباح ومرة في

المساء، في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

علاج أحادي

- ❖ تناول هذا الدواء كعلاج أحادي للبالغين والمراهقين (من سن ١٦ سنة)

← كيبيرا أقراص مغلفة

عندما تبدأ بتناول كيبيرا لأول مرة، سيصف لك طبيبك جرعة منخفضة خلال أول أسبوعين من العلاج، قبل أن يصف لك فيما بعد أقل جرعة عامة.

جرعة البداية المعتادة من كيبيرا هي ٢٥٠ مج مرتين يوميًا. سيزيد طبيبك الجرعة إلى ٥٠٠ مج مرتين يوميًا بعد أسبوعين من العلاج.

قد يقرر طبيبك زيادة الجرعة إلى ١٥٠٠ مج كحد أقصى مرتين يوميًا - اعتمادًا على كيفية استجابتك للدواء.

← كيبيرا محلول فموي ١٠٠ مج/مل

قم بقياس الجرعة المناسبة باستخدام السرنجة الموجودة داخل العبوة.

- ← استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة حول كيفية قياس الجرعة بدقة.

عندما تبدأ بتناول كيبيرا لأول مرة، سوف يصف لك طبيبك جرعة منخفضة

خلال الأسبوعين الأولين من العلاج (عادةً ٢,٥ مل (٢٥٠ مج) مرتين يوميًا) ، قبل إعطائك أقل جرعة عامة.

الجرعة المعتادة: يؤخذ كيبيرا مرتين يوميًا في جرعتين متساويتين تقدر كل جرعة فردية منهما بين ٥ مل (٥٠٠ مج) والحد الأقصى ١٥ مل (١٥٠٠ مج).

علاج إضافي

- ❖ علاج إضافي للبالغين والمراهقين (من ١٢ إلى ١٧ عامًا) *يمنّ*

← *يُزنون* ٥٠ كجم أو أكثر

← كيبيرا أقراص مغلفة

جرعة البداية المعتادة من كيبيرا هي ٥٠٠ مج مرتين يوميًا. قد يقرر طبيبك زيادة الجرعة تدريجيًا إلى ١٥٠٠ ملغ كحد أقصى مرتين يوميًا - اعتمادًا على كيفية استجابتك للدواء.

← كيبيرا محلول فموي ١٠٠ مج/مل

قم بقياس الجرعة المناسبة باستخدام السرنجة الموجودة داخل العبوة.

- ← استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة حول كيفية قياس الجرعة بدقة.

جرعة البداية المعتادة من كيبيرا هي ٥ مل (٥٠٠ مج) مرتين يوميًا.

الجرعة العامة: يؤخذ كيبيرا مرتين يوميًا في جرعتين متساويتين تقدر كل جرعة فردية منهما بين ٥ مل (٥٠٠ مج) والحد الأقصى ١٥ مل (١٥٠٠ مج).

- ❖ *علاج إضافي للأطفال في عمر ٦ أشهر أو أكبر*

يُفضّل استخدام محلول كيبيرا الفموي للأطفال دون سن ٦ شهور.

قم بقياس الجرعة المناسبة باستخدام السرنجة الموجودة داخل العبوة.

- ← استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة حول كيفية قياس الجرعة بدقة.

الجرعة العامة: يؤخذ كيبيرا مرتين يوميًا في جرعتين متساويتين تقدر كل جرعة فردية منهما بين ٠,١ مل (١٠ مج) والحد الأقصى ٠,٣ مل (٣٠ مج) بالتناسب مع وزن الطفل (انظر الأمثلة على الجرعات في

الجدول أدناه)

الجرعات للأطفال في عمر ٦ شهور أو أكبر

الوزن	جرعة بداية العلاج:	الجرعة القصوى:
٠,١ مل (١٠ مج)	٠,٣ مل (٣٠ مج) مرتين يوميًا	٠,٣ مل (٣٠ مج) مرتين يوميًا
٠,٦ كجم	٠,٦ مل مرتين يوميًا	١,٨ مل مرتين يوميًا
٨ كجم	٠,٨ مل مرتين يوميًا	٢,٤ مل مرتين يوميًا
١٠ كجم	١ مل مرتين يوميًا	٣ مل مرتين يوميًا
١٥ كجم	١,٥ مل مرتين يوميًا	٤,٥ مل مرتين يوميًا
٢٠ كجم	٢ مل مرتين يوميًا	٦ مل مرتين يوميًا
٢٥ كجم	٢,٥ مل مرتين يوميًا	٧,٥ مل مرتين يوميًا
بدءًا من ٥٠ كجم	٥ مل مرتين يوميًا	١٥ مل مرتين يوميًا

- ❖ *علاج إضافي للرضع (من عمر شهر إلى أقل من ٦ أشهر)*

قم بقياس الجرعة المناسبة باستخدام السرنجة ذات الحجم الذي يوصى به الطبيب.

- ← استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة حول كيفية قياس الجرعة بدقة.

الجرعة العامة: يؤخذ كيبيرا مرتين يوميًا في جرعتين متساويتين تقدر كل جرعة فردية منهما بين ٠,٠٧ مل (٧ مج) والحد الأقصى ٠,٢١ مل (٢١ مج) بالتناسب مع وزن الرضيع (انظر الأمثلة على الجرعات في

الجدول أدناه)

الجرعات للرضع (من عمر شهر إلى أقل من ٦ أشهر)

الوزن	جرعة بداية العلاج:	الجرعة القصوى:
٠,٠٧ مل/كجم مرتين يوميًا	٠,٢١ مل/كجم مرتين يوميًا	٠,٢١ مل/كجم مرتين يوميًا
٤ كجم	٠,٣ مل مرتين يوميًا	٠,٨٥ مل مرتين يوميًا
٥ كجم	٠,٣٥ مل مرتين يوميًا	١,٠٥ مل مرتين يوميًا
٦ كجم	٠,٤ مل مرتين يوميًا	١,٢٥ مل مرتين يوميًا
٧ كجم	٠,٥ مل مرتين يوميًا	١,٥ مل مرتين يوميًا

المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى

سيقرر طبيبك جرعة كيبيرا الصحيحة والمناسبة لك أو لطفلك وفقًا لحالة وظائف الكلى ووزن الجسم.

كيفية تناول

الأقراص المغلفة

ابتلع قرص/ أقراص كيبيرا مع كمية مناسبة من السوائل (كوب من الماء على سبيل المثال). يمكنك تناول كيبيرا مع طعام أو بدونه. قد تترك مادة

ليفيتيراستيماب مرارة في حلقك بعد تناول الدواء عن طريق الفم المحلول الفموي

بعد قياس الجرعة الصحيحة باستخدام السرنجة المناسبة، يجوز تخفيف

محلول كيبيرا الفموي في كوب من الماء أو زجاجة الطفل ويمكن تناوله

مع الطعام أو بدونه. قد تترك مادة ليفيتيراستيماب مرارة في الحلق بعد

تناول الدواء عن طريق الفم.

تناول المحلول الفموي باتباع تعليمات الطبيب.

تحتوي العبوة على زجاجة ٣٠٠ مل داكنة اللون وسرنجة ١٠ ذات

مقياس مترجح للمساعدة على قياس الجرعة بدقة

إذا نسيت تناول كيبيرا

لا تتناول جرعة إضافية لتعويض جرعة فاتتة. اتصل بطبيبك إذا فاتتك جرعة أو أكثر.

إذا تناولت جرعة أكبر من اللازم من كيبيرا

إذا تناولت جرعة أكثر مما يجب من كيبيرا، فمن المرجح أن تشعر

بالنعاس أو الدوخة أو الهياج أو التوتر أو تختبر بعض الآثار الجانبية الأخرى مثل قلة الانتباه، الميل إلى العنف، ضيق التنفس، وفقدان

الوعي (الغيبوبة).

اتصل بطبيبك على قسم الطوارئ في المستشفى الأقرب إليك على

الفور ودون تأجيل، وأظهر لهم عبوة كيبيرا إن أمكن.

لا تتوقف عن تناول كيبيرا دون نصيحة طبية

تناول كيبيرا طالما يوصي طبيبك بتناوله، ولا تتوقف إلا إذا نصحك

طبيبك بالتوقف. إذا كنت تعاني من مرض الصرع، فإن التوقف المفاجئ عن تناول الدواء قد يزيد من نوباتك.

في حالة التوقف عن تناول العلاج، يجب إيقاف كيبيرا تدريجيًا. سوف يرشدك طبيبك عن كيفية التوقف التدريجي عن تناول كيبيرا.

- ← اسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة حول استخدام هذا المنتج.