



أقرص Otezla المرققة على 10 ملغ  
أقرص Otezla المرققة على 20 ملغ  
أقرص Otezla المرققة على 30 ملغ  
Apremilast

يؤذي قراءة كل هذه النشرة بعناية قبل البدء بتناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك:

- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كنت لديك أي أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.
- تم وصف هذا الدواء لك فقط. لا تقم بتربيته للاخريين، فانه قد يضرهم، حتى ولو كانت أعراض مرضهم مشابهة لأعراض مرضك.
- إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية لم يرد ذكرها في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.

#### ماذا يوجد في هذه النشرة

- 1 ما هو دواء Otezla و Otezla وما هي نواحي استخدامه.
- 2 قبل أن تتناول Otezla
- 3 كيفية تناول Otezla
- 4 الآثار الجانبية المحتملة
- 5 كيفية تخزين Otezla
- 6 محتويات العبوة ومعلومات أخرى

#### 1 ما هو دواء Otezla وما هي نواحي استخدامه

يحتوي Otezla على المادة الفعالة "أپريميلاست" Apremilast، التي تنتمي لمجموعة من الأدوية تسمى مثبطات فوسفودي إسترز 4 phosphodiesterase، والتي تساعد على تخفيف التهاب.

#### ما هو دواء Otezla

يستخدم Otezla لعلاج اللبغين الذين يعانون من الحالات المرضية التالية:

- التهاب المفصائل الصدافي: إذا كنت لا تستطيع استخدام نوع آخر من الأدوية تسمى "الأدوية DMARDs"، أو عندما تكون قد جربت واحداً من هذه الأدوية ولم تكن ناجحاً.
- الصفاف اللويحي من الممثل إلى الحاد إذا كنت لا تستطيع استخدام واحد من العلاجات التالية أو عندما تكون قد جربت واحداً من هذه العلاجات ولم تكن ناجحاً.
- العلاج الضوئي: أي العلاج الذي تتعرض به مناطق معينة من الجلد للاشعة فوق البنفسجية.
- العلاج المجموعي: أي العلاج الذي يؤثر على الجسم كله بدلاً من التأثير على منطقة واحدة فقط مثل "سكولوسپورين ciclosporin" أو "ميثوتريكسات methotrexate".

**ما هو التهاب المفصائل الصدافي؟**  
التهاب المفصائل الصدافي هو مرض التهاب المفصائل يتراعى عادة مع الصفاف (الصدافي) الذي هو مرض التهابي يصيب الجلد.

**ما هو الصفاف اللويحي**  
الصفاف (أو الصدافي) هو مرض التهابي يصيب الجلد، ويمكن أن يسبب الحكة، بقعاً حمراء ومقشرية ومسكة، وموالة ومؤثرة للحكة، ويمكن أن يؤثر أيضاً على فروة الرأس والأظافر.

**كيف يعمل Otezla**  
مرض الصفاف ومرض التهاب المفصائل الصدافي هما عادةً حالتان مرضيتان تفرقان طوال الحياة وليس لهما علاج نهائي. يعمل Otezla على طرق الحد من نشاط الإزايغ في الجسم اسمه كوسفوداي إسترز 4 والذي يشارك في عملية التهاب. من خلال تقليص نشاط هذا الإزايغ، يمكن لOtezla أن يساعد على السيطرة على التهابات المفصائل للصدافي والتهاب أعراضها هاتين الحالتين المرضيتين.

في حالة التهاب المفصائل الصدافي، يؤدي العلاج بدواء Otezla إلى تخفيف المفصائل المتورمة والموالة، ويمكن أن يحسن وظنك جسمك بمسورة عامة.

وفي حالة الصفاف، يؤدي العلاج بدواء Otezla إلى تخفيف لويحات الجلد الصدافية وتخفيف المؤثرات والأعراض الأخرى للمرض.

وقد تبين أيضاً أن Otezla يحسن نواحي الحياة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الصفاف و التهاب المفصائل الصدافي. وهذا يعني أن تأثير العلاج المرضية على الأنشطة اليومية والعلاقات وعامل آخرى يجب أن يصبح أقل مما كان عليه من قبل.

#### 2 قبل أن تتناول Otezla

##### لا تتناول Otezla في الحالات التالية:

- إذا كنت لديك حساسية ضد مادة أپريميلاست أو Apremilast أو أي من المواد الأخرى المكونة لهذا الدواء (المرجحة في الفقرة 6)
- إذا كنت امرأة حاملاً أو تعتقد أنك قد تكونين حاملاً.

##### التحذيرات والاحتياطات

قم بالتحدث إلى طبيبك أو إلى الصيدلي الخاص بك قبل أن تتناول Otezla.

إذا كان لديك بوليكيتا، فاقص الوزن، أو إذا لاحظت أنك تعاني من نقص غير متصدد في الوزن، أثناء علاجك بدواء Otezla، يجب عليك التحدث إلى طبيبك عن هذا الأمر.

وإذا كنت لديك مشاكل خادحة في القلب، فإن الجرعة المستخدمة من Otezla هي 30 ملغ مرة واحدة في اليوم (جرعة عند الصباح). ورسدت بتحدث طبيبك عن ذلك مع زيادة الجرعة عندما تبدأ بتناول Otezla لأول مرة.

##### بالنسبة للأطفال والمراهقين

لم تتم دراسة دواء Otezla لدى الأطفال والمراهقين، وبالتالي فمن غير المستحسن استخدامه من قبل الأطفال والمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة أو أقل.

##### الأدوية الأخرى و Otezla

قم بإبلاغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أو ربما تتناول أي أدوية أخرى، وهذا يشمل الأدوية التي تحصل عليها بدون وصفة طبية وكذلك الأدوية العشبية والسبب في ذلك هو أن Otezla يمكن أن يؤثر على الطريقة التي تعمل بها بعض الأدوية الأخرى. وكذلك يمكن أن تؤثر بعض الأدوية الأخرى على الطريقة التي يعمل بها Otezla.

على وجه الخصوص، اسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول Otezla إذا كنت تتناول أي من الأدوية التالية:

- ريفامبين rifampicin وهو مضاد جوي يستخدم لعلاج السل.
- فينيثورين phenytoin و فينوباربیتال phenobarbital و كاربامازيبين carbamazepine وهي أدوية تستخدم في علاج نوبات الصرع و داء الصرع.
- نيتة سانت جون - وهي دواء عشبي لحالات القلق والاكتئاب المعتدلة.

##### الحمل والرضاعة

هناك القليل من المعلومات حول آثار Otezla في حالة الحمل، يجب أن تستخدمين حاملاً أثناء تناوله هذا الدواء، ويجب أن تستخدمي وسيلة فعالة لمنع الحمل أثناء العلاج بـ Otezla، ومن غير المعروف ما إذا كان هذا الدواء يمر إلى داخل حليب الإرضاع الثديي. يجب عليك عدم استعمال Otezla أثناء فترة الرضاعة.

أخبري طبيبك إذا كنت تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو كنتِ تخططين لتجاب طلب، أو إذا كنتِ ترضعين طفلكِ أو تودين القيام بذلك.

**تأثير Otezla على القيادة واستعمال الآلات**  
ليس لاوتيزلا أي تأثير على القدرة على القيادة واستخدام الآلات.

**أوتيزلا يحتوي على الكالكوز**  
يحتوي أوتيزلا على الكالكوز (وهو نوع من السكر). فإذا قام لك طبيبك أنك لا تستطيع أن تتحمل أو تهضم بعض السكريات، قم باستشارة طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

#### 3 كيفية تناول Otezla

دائماً تناول هذا الدواء حسب تعليمات طبيبك بشكل دقيق. إستشر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك شك أو التباس.

##### كمية تناول الدواء

- عندما تبدأ بتناول Otezla لأول مرة، سوف تتلقى "عبوة" بدء العلاج" التي تتضمن جميع الجرعات كما هو موضح في جدول أدناه.
- عبوة بدء العلاج" موسومة بعلامات واضحة لتتأكد من تناول كمية الأقرص الصحيحة في الوقت الصحيح.
- سيبدأ علاجك بجرعة منخفضة، وستتم زيادتها تدريجياً خلال فترة ال 6 أيام الأولى من العلاج.
- تحتوي "عبوة بدء العلاج" أيضاً على كمية من الأقرص لتفقره 8 أيام أخرى حسب الجرعة المستعملة (من اليوم 7 إلى اليوم 14).
- الجرعة المستعملة لاوتيزلا هي 30 ملغ مرتين في اليوم بعد استكمال مرحلة المعاوية - جرعة 30 ملغ مع الصباح وجرعة 30 ملغ أخرى في المساء، بحيث تفصلها فترة 12 ساعة تقريباً، وذلك مع الطعام أو بدون الطعام.
- إذا جرت اجبة فترتها 60 ملغ كل يوم، ويحلل نهاية اليوم 6 ستكون قد وصلت إلى موعد الجرعة المستعملة.

• بمجرد أن تصل إلى موعد الجرعة المستعملة، سوف تحصل على عبواتك الموسومة بالأقرص من عبوة 30 ملغ فقط. ولن تحتاج لتعبئة هذه المرحلة التصيدية التي تزيد فيها جرعة تدريجياً إلا مرة واحدة فقط حتى ولو بدأت فترة علاج جديدة.

اليوم	جرعة الصباح	جرعة المساء	الجرعة الإجمالية
اليوم 1	10 ملغ (وردي)	10 ملغ (وردي)	20 ملغ
اليوم 2	10 ملغ (وردي)	20 ملغ (وردي)	30 ملغ
اليوم 3	10 ملغ (وردي)	20 ملغ (وردي)	30 ملغ
اليوم 4	20 ملغ (بنفسجي)	20 ملغ (بنفسجي)	40 ملغ
اليوم 5	20 ملغ (بنفسجي)	30 ملغ (بنفسجي)	50 ملغ
اليوم 6	30 ملغ (بنفسجي)	30 ملغ (بنفسجي)	60 ملغ

##### بالنسبة لمن يعانون من مشاكل في القلب

إذا كنت تعاني من مشاكل خادحة في القلب فإن الجرعة المستعملة من Otezla هي 30 ملغ مرة واحدة كل يوم (جرعة عند الصباح). وسيحدث طبيبك عن كيفية زيادة جرعة عندما تبدأ تناول Otezla لأول مرة.

##### كيف ومتى يتم تناول Otezla

- قم بإنتاج القرص كل ساعة، وبمعدل ابتلاعه مع الماء.
- يسهل تناول Otezla مع الطعام أو بدون الطعام.
- تناول Otezla في نفس الموعد تقريباً كل يوم، بغض عن واحد في الصباح وقرص واحد في المساء.
- إذا لم تتحسن حالتك بعد فترة ستة أشهر من العلاج، يجب عليك مقابلة طبيبك بذلك.

**إذا تناولت Otezla بجرات أكثر مما يجب**  
إذا تناولت Otezla بجرات أكثر مما يجب، تحدث إلى طبيبك أو أذهب إلى المستشفى على الفور. قد معك عبوة الدواء وهذه النشرة.

**إذا نسيت أن تتناول Otezla**  
إذا فاتتك جرعة من Otezla، قم بتناولها حالما تتذكرها. وإذا كان ذلك قريباً من موعد تناول جرعةك التالية، قم بتجاوز الجرعة المنسية. ثم تناول الجرعة التالية في موعدها المنتظم الموصوف لك.

- لا تتناول جرعتين معاً في نفس الوقت.

##### إذا توقفت عن تناول Otezla

- يجب عليك الاستمرار في تناول Otezla إلى أن يطلب منك الطبيب إيقاف تناول.
- لا توقف عن تناول Otezla بدون استشارة طبيبك أولاً.

إذا كنت لديك أي أسئلة أو استفسارات أخرى حول استعمال هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

#### 4 الآثار الجانبية المحتملة

مثل كافة الأدوية، يمكن لهذا الدواء أن يسبب آثاراً جانبية. مع العلم أنها لا تحدث بالضرورة مع كل الأشخاص الذين يتناولونها.

**الآثار الجانبية الشائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من شخص 1 بين كل 10 أشخاص)**

- الإسهال
- الغثيان

##### الآثار الجانبية الشائعة (قد تؤثر على عدد أقصاه شخص 1 بين كل 10 أشخاص)

- السعال
- ألم في الظهر
- الصداع
- الشعور بالتعب
- ألم في المعدة
- فقدان الشهية
- تعوُّظ متكرر أكثر من المعتاد
- صعوبة في النوم (الأرق)
- عسر الهضم أو الشعور بحرقة
- وجع الرأس أو الصداع النصفي أو الصداع الناتج عن التوتر
- التهابات الجهاز التنفسي العلوي، مثل الزكام والرشح (سيلان الأنف) و التهاب الجيوب الأنفية.
- التهاب ونورم في أنابيب الترتين (التهاب الشعب الهوائية).
- نزلات البرد (التهاب البلعوم الأنفي)

##### الآثار الجانبية غير الشائعة (قد يؤثر على عدد أقصاه شخص 1 بين كل 100 شخص)

- آلام في العضلات
- تغيرات في الوزن
- رد الفعل التحسسي

##### الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية، قم بالتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير متكررة في هذه النشرة. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية بصورة مباشرة عن طريق نظام الإبلاغ المذكور في آخر هذه النشرة. من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك أن تساعد على توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

#### في البلدان الأخرى:

يرجى الاتصال بالهيئة المختصة ذات الصلة.

#### هذا دواء

- إن الدواء هو منتج يؤثر على صحتك، واستعمله خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بيقظة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي باعك الدواء
- والطبيب والصيدلي هما خبيران في مجال الطب وفوائده ومخاطره.
- لا تقم من نقاء تفك بقطع فترة العلاج المحددة لك.
- لا تكرر نفس الوصفة بدون استشارة الطبيب.

يُحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال وأنظراهم بعيداً عن أي شخص آخر لا يشارك مباشرة في العلاج

محيط وزراء الصحة العرب  
اتحاد الصيدلانة العرب



#### 6 محتويات العبوة ومعلومات أخرى

#### ما الذي يحتوي عليه Otezla

- المادة الفعالة هي أپريميلاست Apremilast.
- كل قرص مغلف يحتوي على 10 ملغ من أپريميلاست.
- كل قرص مغلف يحتوي على 20 ملغ من أپريميلاست.
- كل قرص مغلف يحتوي على 30 ملغ من أپريميلاست.
- المكونات الأخرى في باطن القرص هي السيلولوز، البورير المبروت، ومونوهيدرات اللاتكوز، وكرموسكراميلوز، الصوديوم، وستيرات المغنيزيوم.
- يحتوي غلاف القرص على بولي فينيل الكحول وثنائي أكسيد التيتانيوم (E171)، مكاروغلو، وثلاث، وأكسيد الحديد الأحمر (E172).
- القرص المغلف غير 20 ملغ يحتوي أيضاً على أكسيد الحديد الأصفر (E172).
- القرص المغلف غير 30 ملغ يحتوي أيضاً على أكسيد الحديد الأصفر (E172)، وأكسيد الحديد الأسود (E172).

#### ما هو شكل Otezla وما هي محتويات العبوة

قرص Otezla المرغف غير 10 ملغ هو قرص مغلف ذو لون وردي وشكل الماسي، مع كلمة "APR" محفورة على أحد جانبيه والرقم "10" محفور على الجانب الآخر.

قرص Otezla المرغف غير 20 ملغ هو قرص مغلف ذو لون بنفسجي وشكل الماسي، مع كلمة "APR" محفورة على أحد جانبيه والرقم "20" محفور على الجانب الآخر.

قرص Otezla المرغف غير 30 ملغ هو قرص مغلف ذو لون بنفسجي وشكل الماسي، مع كلمة "APR" محفورة على أحد جانبيه والرقم "30" محفور على الجانب الآخر.

##### أحجام العبوات

- عبوة بدء العلاج هي محفظة قابلة للطبخ تحتوي على 27 قرصاً؛ 4 أقرص غير 10 ملغ و 4 أقرص غير 20 ملغ و 19 قرصاً غير 30 ملغ.
- العبوة العادية لمدة شهر واحد تحتوي على 56 قرصاً غير 30 ملغ.

المصنع: سيلجين الدولية Celgene International Srl، بمدينة بوريدي Boudry، سويسرا.

ملك حق التسويق: سيلجين أوروبا المحدودة Celgene Europe Ltd، بمدينة أوكسبريدج Uxbridge، المملكة المتحدة

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في 2015/01 للإبلاغ عن أي آثار جانبية.

##### في المملكة العربية السعودية:

- المركز الوطني لتنظيم السلامة الدوائية • فاكس: 966-11-205-7662+ • هاتف المركز الوطني: 966-11-2038222+ • تحويلة: 2317-2356-2353-2354-2334-2340 • رقم الهاتف المحلي: 8002490000 • بريد الكتروني: npc.drug@sfd.a.gov.sa • موقع الكتروني: www.sfd.a.gov.sa

##### في الإمارات العربية المتحدة:

قسم البقطة الدوائية والأجهزة الطبية إدارة الأدوية وزارة الصحة، الإمارات العربية المتحدة • هاتف: 009742301448 • الخط الساخن: 8001111 • بريد الكتروني: pv@moh.gov.ae • ص.ب: 1853، دبي، الإمارات العربية المتحدة