

فيوسيثالميك (مشاركة مسجلة) ليو® Fucithalmic

قطرة للزجة للعين

Viscous eye-drops

فيوسيثالميك عبارة عن 1% حامض فيوسيثيك في صيغة مائية معقمة ممتدة المفعول وتحتوي على كلوريد البنزلكوتيونوم كمادة حافظة.

الخواص

فيوسيثالميك فعال ضد المكورات العنقودية، المكورات السحبية، النايستيريا، الهيموفيلوس، الموراكسيلا ويكثريا كورين. إن تركيبة الفيوسيثالميك ممتدة المفعول تجعل من طول مدة التلامس مع كيمس الغشاء المخاطي المبطن للحضن أمراً مؤكداً. استخدامه مرتين يومياً يعطي تركيزات كافية في جميع أنسجة العين ذات العلاقة. فيوسيثالميك يمر جيداً إلى سائل العين.

دواعي الإستعمال

حالات العدوى الجرثومية للعين والناجمة عن الجراثيم القابلة للتأثر بالفيوسيثالميك وذلك في التهاب الملتحمة، التهاب الجفن، الشحاذ، التهاب القرنية، التهاب الحويصلة الدمعية وهي حالة إستخراج أجسام غريبة من العين.

الجرعات

نقطة واحدة تقطر في العين مرتين يومياً ويجب أن يستمر العلاج بعد عودة العين لحالتها الطبيعية لمدة يومين على الأقل.

موانع الإستعمال

الحساسية لأي من مكونات الدواء

إحتياطات

يجب عدم إستعمال العدسات اللاصقة أثناء إستعمال فيوسيثالميك قطرة العين المرحة.

تأثيرات جانبية

قد يحدث وخز مؤقت . قدرة الفيوسيثالميك على إحداث تفاعلات حساسية منخفضة للغاية.

تجنب إستخدامه بعد مرور 30 يوماً على فتح القارورة.

يجب مراعاة عدم التفرزين فوق 30 درجة مئوية.

تاريخ المراجعة الأخيرة للنشرة الطبية للدواء، يونيو 2009

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب، وطريقة الإستعمال المنصوص عليها، وتعليمات الصيدلي التي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء ومنفعته وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تعد، ولا تزد عليها بدون إستشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال .