

فيبرادول أقراص

باراسيتامول

إقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل القيام بتناول هذا الدواء حيث أنها تحتوي على معلومات مهمة لك.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إليها لاحقاً.
- في حال وجود أي تساؤلات لديك، يفضل استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي.
- لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً، ولا ينبغي بك أن تعطه لأحد آخر حتى لو ظهرت عليه نفس أعراض مرضك فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.
- إذا أصبت بأي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي. مراجعة القسم ٤.

ما الذي تحتويه هذه النشرة

١. ما هو فيبرادول وما هي دواعي استعماله
 ٢. ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول فيبرادول
 ٣. ما هي طريقة تناول فيبرادول
 ٤. الأعراض الجانبية المحتملة
 ٥. طريقة تخزين فيبرادول
 ٦. محتويات العبوة ومعلومات إضافية أخرى
- ١. ما هو فيبرادول وما هي دواعي استعماله**
تستخدم أقراص فيبرادول لتخفيف آلام الصداع، صداع التوتر، الصداع النصفي، آلام الظهر، آلام الروماتيزم والعضلات، آلام الأسنان وآلام الدورة الشهرية.
كما أنها تخفف من التهاب الحلق والحمى، آلام وأوجاع الزكام والإنفلونزا ويوصى بها لتسكين الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل الخفيف.
المادة الفعالة هي الباراسيتامول وهي مسكن للألم كما أنها تخفض درجة حرارة الجسم عند الإصابة بالحمى.

٢. ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول فيبرادول

لا تتناول فيبرادول

- إذا كنت قد عانيت من حساسية لباراسيتامول أو لأي من مكونات هذا الدواء الأخرى (المذكورة في القسم ٦).
 - إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية تحتوي على باراسيتامول لعلاج الألم، الحمى، أعراض الزكام والإنفلونزا أو للمساعدة على النوم.
- التحذيرات والإحتياطات**
استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول فيبرادول:
- إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل الخفيف وتحتاج إلى تناول المسكنات يومياً
 - إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى
 - إذا كنت تعاني من نقص الوزن أو سوء التغذية
 - إذا كنت تشرب الكحول باستمرار
 - إذا كنت تعاني من عدوى شديدة مما قد يزيد من خطر الإصابة بالحمض الأضي تشمل علامات الحمض الأضي ما يلي:
 - صعوبة وسرعة التنفس
 - التوعك (الغثيان)، الإعياء (القيء)
 - فقدان الشهية

اتصل بالطبيب على الفور إذا واجهت بعض الأعراض المذكورة أعلاه. قد تضطر إلى تجنب استخدام هذا الدواء نهائياً أو الحد من مقدار الباراسيتامول التي تتناولها.

الأدوية الأخرى وفيبرادول

استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول هذه الأقراص إذا كنت تتناول أي أدوية موصوفة بوصفة طبية، خاصة:

- ميتوكلوبراميد أو دومبيريدون (لمعالجة الغثيان [التوعك] أو القيء [الإعياء])
 - كوليستيرامين (يستخدم لتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم)
- إذا كنت تتناول أدوية مميعة للدم (مضادات التخثر مثل وارفارين) وتحتاج إلى تناول مسكن للألم بشكل يومي، استشر الطبيب المعالج خوفاً من خطر حدوث نزيف، ولكن لا يزال بإمكانك تناول جرعات من فيبرادول من وقت لآخر إلى جانب مضادات التخثر.

الحمل والرضاعة الطبيعية

استشيري أخصائي الرعاية الصحية المعالج قبل تناول فيبرادول إذا كنت حاملاً. يمكنك تناول هذا الدواء أثناء الرضاعة الطبيعية.

٣. ما هي طريقة تناول فيبرادول

- البالغون والأطفال الذين يبلغون ١٦ عاماً وأكثر:**
تناول ١-٢ قرص كل ٤ إلى ٦ ساعات حسب الحاجة.
لا تتناول أكثر من ٨ أقراص خلال ٢٤ ساعة.
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٠ و ١٥ سنة:
تناول قرص واحد كل ٤ إلى ٦ ساعات حسب الحاجة. لا يجب تناول أكثر من ٤ أقراص خلال ٢٤ ساعة.
لا يجب تناول هذا الدواء لأكثر من ٣ أيام متتالية ما لم يخبرك الطبيب المعالج بذلك.
- لا تتناول الدواء أكثر من مرة كل ٤ ساعات.
 - لا تتناول جرعة أكبر من الموصى بها.
 - لا تعطيه للأطفال ما دون ١٠ سنوات.

إذا تناولت فيبرادول بكمية أكبر مما ينبغي عليك

استشر الطبيب المعالج على الفور إذا تناولت كمية كبيرة من هذا الدواء حتى لو لم تكن تشعر بتوعك. وذلك لأن الكثير من الباراسيتامول يمكن أن يسبب تلف الكبد المتأخر والخطير. إذا دامت الأعراض أو استمر الصداع، استشر الطبيب المعالج.

٤. الأعراض الجانبية المحتملة

قد ينتج عن فيبرادول، وكذلك باقي الأدوية، آثاراً جانبية إلا أنها قد لا تصيب الجميع. لقد واجه عدد قليل من الأشخاص آثار جانبية، تم الإبلاغ عن حالات نادرة جداً من ردود فعل جلدية خطيرة.

توقف عن تناول الدواء وأبلغ الطبيب المعالج على الفور إذا واجهت:

- ردود فعل تحسسية قد تكون شديدة مثل الطفح الجلدي والحكة مصحوبة أحياناً بتورم الفم أو الوجه أو ضيق التنفس
- طفح أو تقشر جلدي أو تقرحات فموية
- مشاكل في التنفس. يزداد احتمال حدوثها إذا كنت قد عانيت منها قبل تناول مسكنات الألم الأخرى مثل الأيبوبروفين والأسبرين
- كدمات أو نزيف لا تفسر لهما
- الغثيان، فقدان الوزن المفاجيء، فقدان الشهية واصفرار العيون والجلد.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

إذا واجهت أي آثار جانبية، استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي بما في ذلك الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة، من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

٥. طريقة تخزين فيبرادول

- قم بتخزين هذا الدواء بعيداً عن مرآى ومتناول الأطفال.
- لا تستعمل هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المذكور على العبوة والغلاف الخارجي. يشير انتهاء تاريخ الصلاحية إلى آخر يوم من الشهر.
- لا تقم بتخزين هذا الدواء في درجة حرارة تزيد عن ٣٠ درجة مئوية، إحتفظه بعيداً عن الرطوبة.
- لا تقم باستعمال هذا الدواء إذا لاحظت علامات تدهور واضحة عليه.
- لا تتخلص من أي أدوية عبر مياه الصرف الصحي. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها، ستساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

٦. محتويات العبوة ومعلومات إضافية أخرى

على ماذا يحتوي فيبرادول

- المادة الفعالة: كل قرص يحتوي على ٥٠٠ ملغ من الباراسيتامول
- المكونات الأخرى: نشا الذرة الهلامي، بوفيدون، حامض الإستريك.

كيف يبدو شكل فيبرادول وما هي محتويات العبوة

أقراص فيبرادول هي أقراص مستطيلة، بيضاء اللون.
أقراص فيبرادول متوفرة في عبوات تحتوي على ٢٠، ٢٤، ١٠٠ أو ١٠٠٠ قرصاً.
قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

الشركة المصنعة ومالكة حق التسويق

فارمالين ش.م.ل - لبنان

الصندوق البريدي ٩٠٢٠١ جديدة المتن، لبنان

للتواصل معنا: pharmaline@maliagroup.com

الموقع الإلكتروني: www.pharmaline.com.lb

رقم تسجيل فيبرادول ٥٠٠ ملغ ١٠٠ قرص في لبنان: ٧٠٨٢١/١

رقم تسجيل فيبرادول ٥٠٠ ملغ ٢٠ قرص في لبنان: ٢٠٨٣٢٢/٩٧

رقم تسجيل فيبرادول ٥٠٠ ملغ ٢٤ قرص في لبنان: ٢٦٧٠٣/٨٩

رقم تسجيل فيبرادول ٥٠٠ ملغ ١٠٠٠ قرص في لبنان: ٢٠٨٣٢١/٩٧

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وفي نفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصيادلة العرب

تمت مراجعة هذه النشرة في كانون الثاني / يناير ٢٠٢١.