



دileyin® كورت شراب

الرجاء قراءة هذه التعليمات بدقة، فهي تتضمن معلومات هامة قد تحتاج إليها عند استعمال هذا الدواء. إذا كانت لديك أية أسئلة فلا تتردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

علاج دileyin كورت

يحتوي كل ٥ مل من دileyin كورت شراب للاستعمال الفموي على ٥ ملغ ديسلوراتادين و ٢٥ ملغ بيتاميتازون.
المواد الغير فعالة: محلول السوربيتول، بنزوات الصوديوم، سترات الصوديوم، حمض الستريك، إدينات ثاني الصوديوم، نكهة الموز، سكر، بروبيلين غليكول، وماء نقى.
ديسلوراتادين هو مضاد للهيستامين طويل المفعول، لا يسبب النعاس يستعمل لتخفيض الحساسية وأعراضها.
بيتاميتازون هو كورتيكosteroid له مفعول مضاد للالتهاب يستعمل في حالات متعددة.

يستعمل دileyin كورت في علاج حالات الحساسية الحادة مثل: التهاب الأنف التحسسي الموسمي والماكث، التهاب الجلد التأتبي، التهاب الجلد التماسي التحسسي، الخشب الوعائى، الشرى، الحساسية بسبب الطعام والأدوية والحساسية في العيون مثل التهاب الملتحمة التحسسي.

الجرعة التي يجب تناولها
الرجاء اتباع التعليمات المحددة بهذا الشأن.
الجرعات المعتمدة هي:

الجرعة	العمر
٥ ملل مرة في اليوم	الكبار والأولاد من عمر ١٢ سنة وما فوق
٢٥ ملل مرة في اليوم	الأولاد من عمر ٦ سنوات إلى ١١ سنة
١،٢٥ ملل مرة في اليوم	الأولاد من عمر سنتين إلى ٥ سنوات

- يمكن تناول الجرعة مع أو بدون الطعام.
- يمكن تعديل الجرعة بحسب استجابة المريض.
- يجب تعديل الجرعة في حالات قصور الكلى أو الكبد.

في حال الإفراط في الجرعة
إذا تناولت جرعات إضافية من هذا الدواء أعلم طبيبك ليتم العلاج وفقاً للأعراض.
في حال نسيان تناول الدواء

إذا نسيت أن تتناول الدواء في الوقت المحدد تناوله في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. لا تتناول أكثر من جرعة واحدة خلال ٢٤ ساعة.

موانع الاستعمال

- لا يجب استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:
 - الحس المفرط لأى من المكونات
 - الحس المفرط للكورتيكosteroidات الأخرى
 - التهابات فطرية في الجسم
 - مرض السل النشط

الاحتياطات الواجب اتخاذها عند تناول هذا الدواء

- لا يجب إيقاف العلاج قبل استشارة الطبيب، يجب أن تخفف الجرعة تدريجياً قبل إيقاف العلاج.
- يجب توخي الحذر عند تناول هذا الدواء في حال وجود قصور حاد في الكلى أو في الكبد.
- أعلم طبيبك في حال وجود مرض في الكبد أو الكلى، ارتفاع ضغط الدم، عدوى، وهن عضلى، غلوكوما، هشاشة العظام، قرحة المعدة أو القرحة الفرجية، يجب تجنب التعرض لجدرى الماء، الحزام النارى أو للحصبة.
- قد ينصحك الطبيب باتباع حمية غذائية غنية بالكلاسيوم والبوتاسيوم وذات كميات قليلة من الصوديوم.
- لا يجب تناول أي لقاحات أثناء العلاج دون التحدث أولاً إلى الطبيب.
- أعلم طبيبك إذا ظهرت أي من عوارض العدوى مثل الحرارة.
- من المستحسن مراقبة مستويات البوتاسيوم في الدم ومستوى الجلوکوز وضغط الدم وإجراء فحص العين الموري خلال العلاج على المدى الطويل مع الكورتيكosteroidات.
- يجب مرافقته نمو الأطفال خلال العلاج على المدى الطويل.
- يجب إعلام الطبيب قبل استعمال هذا الدواء أثناء الحمل والرضاعة.



استعمال ديلين كورت مع غيره من الأدوية

يستحسن إعلام الطبيب أو الصيدلي عن الأدوية التي تستعملها.

يجب الحذر عند تناول هذا الدواء مع الفينوباربيتال، فينيتوين، ريفميسين، الإيفيدرين، أمفورتريسين ب، مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، الساليسيلات، هرمون الاستروجين، مضادات السكري، سوماتروبين، مدرات البول المستندة للبوتاسيوم، جليكوسيدات الديجيتال أو مضادات التخثر الفموية.

التأثيرات الجانبية

من العوارض الجانبية الأكثر حدوثاً: صداع، التهاب البلعوم، تعب، نعاس، جفاف الفم، أعراض شبيهة بعوارض الانفلونزا، ألم في العضل، غثيان، دوار، عسر الهضم وتغير في المزاج.

اعلم طبيبك في حال حدوث أي عوارض جانبية أو انزعاجك منها.

طريقة الحفظ

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال، بعيداً عن الضوء وعن الرطوبة في حرارة لا تتعدي ٣٠ درجة مئوية. تاريخ انتهاء الصلاحية مطبوع على العلبة، لا تستخدم هذا الدواء بعد هذا التاريخ.

المعبوّة

ديلين كورت شراب، ديسلوراتادين ٥ مل/٥ مل و بيتامينازون ٢٥،٠ مل/٥ مل، عبوة تحتوي على ٦٠ مل مع مقياس للجرعة
٢٠٢١ /٠٧ تاريخ صدور المعلومات:

تصنيع مختبرات مدي فار - لبنان

لمزيد من المعلومات اتصل بشبكة الانترنت على الموقع: www.medipharlabs.com أو بـ "Consumer Healthcare Service" على الرقم التالي: ٩٦١-٤ - ٥٤٠٠٥٦

® Registered Trade Mark

THIS IS A MEDICAMENT

- Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

Keep medicament out of the reach of children.

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقائ نفسها.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- لا ترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد صيادلة العرب
Council of Arab Health Ministers & Union of Arab Pharmacists