نشرة معلومات العبوة : جلوتيكازون بروبيونات

سيريتايد ديسكس

٥٠ ميكروجرام/١٠٠ ميكروجرام/جرعة، مسحوق استنشاقي، مُعد مسبقًا.
٥٠ ميكروجرام/٢٥٠ ميكروجرام/جرعة، مسحوق استنشاقي، مُعد مسبقًا.
٥٠ ميكروجرام/٥٠٠ ميكروجرام/جرعة، مسحوق استنشاقي، مُعد مسبقًا.

سالميتيرول/فلوتيكازون بروبيونات



يجب قراءة هذه النشرة بالكامل بعناية قبل بدء استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك.
- يجب الاحتفاظ بهذه النشرة. فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان هناك المزيد من الاستفسارات، فيجب سؤال الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد تم وصف هذا الدواء لك أنت فقط. فلا يجوز إعطاؤه للآخرين. فقد يؤذيهم حتى لو كانت لديهم نفس الأعراض والعلامات المرضية الموجودة لديك.
- يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني إذا تعرّضت لأيّ من الآثار الجانبية. ويشمل ذلك أية آثار جانبية محتملة غير واردة في هذه النشرة. انظر القسم ٤.

محتويات هذه النشرة:

١. معلومات عن سيريتايد ودواعي استعماله
٢. معلومات يجب معرفتها قبل استخدام سيريتايد
٣. كيفية استخدام سيريتايد
٤. الآثار الجانبية المحتملة
٥. كيفية تخزين سيريتايد
٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

١. معلومات عن سيريتايد ودواعي استعماله

يحتوي سيريتايد على دوائين، وهما سالميتيرول وفلوتيكازون بروبيونات:

- سالميتيرول عبارةً عن موسع للشعب الهوائية طويل المفعول. تساعد موسعات الشعب الهوائية في بقاء المسالك الهوائية في الرئة مفتوحة. وهذا يجعل استنشاق الهواء والزفير أسهل. وتدوم التأثيرات لمدة ١٢ ساعةً على الأقل.
- فلوتيكازون بروبيونات عبارة عن ستيرويد قشري يقلل التورم والتهيّج في الرئتين.

وصف الطبيب هذا الدواء للمساعدة في منع حدوث مشاكل في التنفس مثل:
- الربو
- مرض انسداد الشعب الهوائية المزمن (COPD). سيريتايد ديسكس، بجرعة ٥٠٠/٥٠ ميكروجرام، يقلل عدد نوبات الاحتدام لأعراض مرض انسداد الشعب الهوائية المزمن.

يجب استخدام سيريتايد كل يوم وفق إرشادات الطبيب. فهذا سيضمن أن يعمل الدواء بصورة صحيحة للتحكم في الربو أو مرض انسداد الشعب الهوائية المزمن لديك.
سيريتايد ديسكس يساعد على منع حدوث مشاكل في التنفس مثل: يجب عدم استخدام سيريتايد لعلاج نوبات الربو المفاجئة، فقد يكون ذلك خطيرًا. و في حالة حدوث ذلك، يجب استخدام علاج آخر (يُطلق عليه "علاج الربو سريع المفعول، مثل سالبوتامول). ويجب دائمًا أن تحمل معك دواء الربو سريع المفعول الذي يجب استخدامه (على سبيل المثال "بخاخ الربو سريع المفعول"). قد يكون هذا الدواء سريع المفعول معك.

٢. معلومات يجب معرفتها قبل استخدام سيريتايد

موانع استعمال سيريتايد:
إذا كنت تعاني من حساسية من سالميتيرول أو فلوتيكازون بروبيونات أو من المكوّن الآخر لاكتوز أحادي الإماهة.

تحذيرات واحتياطات
يجب استشارة الطبيب قبل تناول سيريتايد في الحالات التالية:
- وجود مرض في القلب، مثل اضطراب ضربات القلب أو سرعة ضربات القلب
- فرط نشاط الغدة الدرقية
- ارتفاع ضغط الدم
- داء السكري (قد يزيد سيريتايد من وجود السكر في الدم)
- انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم
- السلّ (TB) الآن أو في السابق أو وجود حالات عدوى أخرى في الرئة

اتصل بطبيبك إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية أو اضطرابات بصرية أخرى.

سيريتايد والرياضيون
أبلغ الطبيب أو الصيدلاني إذا كنت تتناول أيّ أدوية أخرى، أو تتناولها مؤخرًا، أو قد تتناولها. ويشمل ذلك الأدوية الخاصة بعلاج الربو أو حتى أيّ أدوية يتم الحصول عليها بدون وصفة. وهذا نظرًا لأنه قد لا يكون من الملائم تناول سيريتايد مع بعض الأدوية الأخرى.

أبلغ الطبيب إذا كنت تتناول الأدوية التالية، قبل بدء استخدام سيريتايد:
- محصرات بيتا (مثل أتينولول وبروبرانولول وسوتالول). تستخدم محصرات بيتا في معظم الأحيان لحالات ارتفاع ضغط الدم أو حالات القلب الأخرى.
- الأدوية المستخدمة لعلاج حالات العدوى (مثل كيتوكونازول وإيتراكونازول وإريثروميسين) بما في ذلك بعض الأدوية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية (مثل ريتونافير، المنتجات المحتوية على كوبيسيستات). يمكن أن يزيد بعض هذه الأدوية مقدار فلوتيكازون بروبيونات أو سالميتيرول في جسمك. وقد يزيد هذا من خطورة المعاناة من آثار جانبية مع سيريتايد، بما في ذلك اضطراب ضربات القلب، أو قد يجعل الآثار الجانبية أسوأ. قد يرغب طبيبك بمراقبتك بعناية إذا كنت تتناول هذه الأدوية.
- الستيرويدات القشرية (عن طريق الفم أو الحقن). إذا كنت قد تناولت أيّ دواء من هذه الأدوية مؤخرًا، فقد يزيد هذا من خطورة تأثير هذا الدواء على الغدة الكظرية.
- تستخدم مدرات البول، المعروفة أيضًا باسم "أقراص البول" لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
- موسعات الشعب الهوائية الأخرى (مثل سالبوتامول).
- أدوية الزانثين. تستخدم في الغالب لعلاج الربو.

الحمل والرضاعة الطبيعية
إذا كنتِ حاملاً أو تُرضعين رضاعة طبيعية أو تعتقدين أنكِ حامل أو تخططين للإنجاب، فيجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول هذا الدواء.

القيادة
ليس من المرجح أن يؤثر سيريتايد على قدرتك على القيادة أو استخدام أيّ آلات.

يحتوي سيريتايد على:
يحتوي سيريتايد ديسكس على ما يصل إلى ١٢,٥ مليجرامًا من اللاكتوز أحادي الإماهة في كل جرعة. لا تُسبب كمية اللاكتوز في هذا الدواء أي مشاكل عادةً للأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز. يحتوي اللاكتوز أحادي الإماهة سواغ علي كميات صغيره من بروتينات الحليب ، والتي قد تسبب تفاعلات الحساسية.

٣. استخدام سيريتايد

يجب استخدام هذا الدواء دائمًا بالطريقة التي يوصي بها الطبيب أو الصيدلاني بالضبط. يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني في حالة الشك بشأن كيفية استعماله على الوجه الصحيح.
- يجب استخدام سيريتايد كل يوم، حتى يوصي الطبيب بالتوقف عن تناوله. يجب عدم تناول أكثر من الجرعة الموصى بها.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني في حالة الشك بشأن كيفية استعماله على الوجه الصحيح.
- يجب عدم التوقف عن تناول سيريتايد أو تقليل الجرعة بدون التشاور مع الطبيب أولاً
- ينبغي استنشاق سيريتايد عبر الفم إلى الرئتين.

للربو
البالغون والمراهقون في سن 12 عامًا فأكثر
- سيريتايد ديسكس ١٠٠/٥٠ - جرعة استنشاق واحدة مرتين يوميًا
- سيريتايد ديسكس ٢٥٠/٥٠ - جرعة استنشاق واحدة مرتين يوميًا
- سيريتايد ديسكس ٥٠٠/٥٠ - جرعة استنشاق واحدة مرتين يوميًا

أقل من سن 4 أعوام إلى 12 عامًا
- سيريتايد ديسكس ١٠٠/٥٠ - جرعة استنشاق واحدة مرتين يوميًا
- يوصى بعدم استخدام سيريتايد للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٤ أعوام.

البالغين الذين يعانون من انسداد الشعب الهوائية المزمن (COPD)
- سيريتايد ديسكس ٥٠٠/٥٠ - جرعة استنشاق واحدة مرتين يوميًا

يمكن التحكم في الأعراض بصورة جيدة عن طريق استخدام سيريتايد مرتين يوميًا. وإذا كان الأمر كذلك، فيمكن أن يقرر الطبيب تقليل الجرعة إلى مرة واحدة يوميًا. يمكن تغيير الجرعة إلى:
- مرة في الليل - في حالة ظهور أعراض في الليل
- مرة في الصباح - في حالة ظهور أعراض في النهار

ومن المهم جدًا اتباع تعليمات الطبيب حول عدد البخات التي يجب تناولها وعدد مرات تناول الدواء.

وفي حالة استخدام سيريتايد لعلاج الربو، فسيكون الطبيب بحاجة إلى التحقق من الأعراض لديك بشكل منتظم.

. وقد تتم المعاناة من شعور بأزيز أكثر، مع الشعور بضيق في الصدر في كثير من الأحيان، أو قد تكون هناك حاجة لاستخدام المزيد من الدواء "المسكّن" سريع المفعول. وفي حالة حدوث أيّ من هذه الأعراض، يجب متابعة تناول سيريتايد مع عدم زيادة عدد البخات التي يتم تناولها. فقد تصبح حالة الصدر أسوأ وقد يتطور الأمر إلى إعياء خطير. يجب استشارة الطبيب عند الحاجة إلى علاج إضافي.

تحذيرات
- يجب أن يوضح لك الطبيب أو الممرضة أو الصيدلاني كيفية استخدام البخاخ. كما يجب عليهم التحقق من طريقة استخدامك له من وقت لآخر. فعدم استخدام سيريتايد ديسكس بشكل صحيح أو على النحو الموصوف قد يعني أنه لن يساعد في علاج الربو أو مرض انسداد الشعب الهوائية المزمن كما ينبغي.
- يحتوي جهاز ديسكس على قفاعات تحتوي على سيريتايد في شكل مسحوق.
- يوجد عداد بالجزء العلوي لجهاز ديسكس ليخبرك بعدد الجرعات المتبقية. يتم العد التنازلي إلى ٠. وتظهر الأرقام من ٥ وحتى ٠ باللون الأحمر لتحذرك من أنه لم يتبقَّ سوى عدد قليل فقط من الجرعات. وبمجرد ظهور الرقم ٠، يكون الجهاز فارغًا.

استخدام البخاخ

1 لفتح جهاز ديسكس، أمسك العلبة الخارجية بيد واحدة وضع إبهام يدك الأخرى على مقبض الإبهام. ثم ادفع الإبهام بعيدًا عنك بقدر المستطاع. وهنا ستسمع صوت نقرة. وستظهر فتحة صغيرة في جزء الفم.

2 أمسك جهاز ديسكس بحيث يكون جزء الفم متجهًا نحوك. ويمكنك فعل ذلك بيدك اليمنى أو اليسرى. ثم حرّك الذراع بعيدًا عنك بقدر المستطاع. وهنا ستسمع صوت نقرة. وبهذا يتم وضع جرعة من الدواء في جزء الفم.

في كل مرة يتم فيها سحب الذراع للخلف يتم فتح قفاعة بالداخل ويكون المسحوق جاهزًا للاستنشاق. فلا تعبث بالذراع لأن هذا يفتح القفاعات ويهدر الدواء.

3 أبعد جهاز ديسكس عن فمك، وأخرج زفيرًا بالقدر الذي يُشعرك بالراحة. وتجنّب التنفس في الجهاز.

4 ضع جزء الفم بين شفتيك، وخذ شهيقًا بثبات وعمق من جهاز ديسكس من فمك، وليس من أنفك. أخرج الجهاز من فمك. احبس نَفَسك لحوالي ١٠ ثوانٍ أو لأطول فترة ممكنة بالقدر الذي لا يضايقك. أخرج زفيرًا ببطء. ربما لن تكون قادرًا على تذوق المسحوق على لسانك حتى إذا كنت قد استخدمت ديسكس بطريقة صحيحة.

5 وبعد ذلك، اغسل فمك بالماء، ثم ابصق الماء، و/أو نظّف أسنانك بفرشاة. فقد يساعد ذلك في منع حدوث السُلاق والبحة في الصوت.

6 لإغلاق جهاز ديسكس، حرّك مقبض الإبهام للخلف نحوك بقدر المستطاع. وهنا ستسمع صوت نقرة. وسيعود الذراع إلى مكانه الأصلي وسيعاد ضبطه.

سيكون جهاز الديسكس جاهزًا الآن للاستخدام مرة أخرى.

وكما هو الحال بالنسبة لجميع البخاخات، ينبغي على مقدمي الرعاية ضمان استخدام الأطفال الذين تم وصف سيريتايد ديسكس لهم لطريقة البخ السليمة، كما هو موضح أعلاه.

تنظيف البخاخ
امسح جزء الفم بجهاز ديسكس بقطعة قماش جافة لتنظيفه.

لا تقم
من المهم استخدام البخاخ حسب التعليمات. وفي حالة تناول جرعة أكبر من الموصى بها بشكل عرضي، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني. قد تلاحظ أن ضربات القلب أسرع من المعتاد وأنك تشعر بالارتجاف. ويمكن أن تعاني أيضًا من دوار وصداع وضعف في العضلات وألم في المفاصل.

في حالة استخدام جرعات أكبر لفترة زمنية طويلة، ينبغي عليك استشارة طبيبك أو الصيدلاني بحثًا عن نصيحة. وهذا لأن الجرعات الأكبر من سيريتايد قد تقلل مقادير هرمونات الستيرويد المنتجة بواسطة الغدة الكظرية.

في حالة التوقف عن استخدام سيريتايد
لا تستخدم جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة الفائتة. فقط تناول جرعتك التالية في وقتها المعتاد.

القائمة الكاملة عن استخدام سيريتايد
من المهم أن تتناول سيريتايد كل يوم حسب التعليمات. يجب الاستمرار في تناول الدواء حتى يطلب منك الطبيب أو الصيدلاني التوقف عن تناوله. فقد يجعل هذا عملية التنفس لديك أسوأ.

بالإضافة إلى ذلك، في حالة التوقف بشكل مفاجئ عن تناول سيريتايد أو خفض جرعتك من سيريتايد، فقد يسبب ذلك (بشكل نادر جدًا) أن تعاني من مشكلات في الغدة الكظرية (القصور في الغدة الكظرية) والذي يسبب في بعض الأحيان آثارًا جانبية.

قد تشمل هذه الآثار الجانبية أيًا مما يلي:
- ألم المعدة
- إرهاق وفقد الشهية والشعور بالإعياء
- الإعياء والإسهال
- فقدان الوزن
- صداع أو نعاس
- انخفاض مستويات السكر في الدم
- انخفاض ضغط الدم والنوبات

عندما يكون الجسم تحت ضغط مثل الضغط بسبب الحمى أو الإصابات (مثل التعرض لحادث سيارة)، أو العدوى، أو الجراحة، قد يكون القصور في الغدة الكظرية أسوأ وقد تعاني من أيّ من الآثار الجانبية المدرجة أعلاه.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني إذا تعرّضت لأيّ من الآثار الجانبية. ولمنع حدوث هذه الأعراض، قد يصف الطبيب تناول المزيد من الستيرويد القشري في صورة أقراص (مثل بريدنيزولون).

إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، يجب سؤال الطبيب أو المرمضة أو الصيدلاني.

٤

مثله مثل جميع الأدوية، يمكن أن يتسبب هذا الدواء في حدوث أعراض جانبية، لكن ليس بالضرورة أن يصاب بها جميع الأشخاص. لتقليل فرصة حدوث الآثار الجانبية، سوف يصف الطبيب أقل جرعة من السيريتايد للتحكم في الربو أو مرض انسداد الشعب الهوائية المزمن (COPD) لديك.

تحدث أمور واقي السيريتايد على الفور. وقد تعاني من أزيز وكحة شديدين أو تعاني من صعوبة في التنفس. كما تلاحظ أيضًا وجود حكة (شرى) وتورم (عادة في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق)، أو قد تشعر بشكل مفاجئ أن قلبك ينبض بشكل سريع جدًا أو قد تشعر بالإغماء ودوار في الرأس (والذي يؤدي أيضًا إلى السقوط أو فقد الوعي). وإذا حدث أي من هذه الآثار الجانبية، فتوقف عن استخدام السيريتايد وأخبر طبيبك مباشرة. تفاعلات الحساسية تجاه السيريتايد غير شائعة (فهي تؤثر على أقل من شخص واحد في كل ١٠٠ شخص).

الالتهاب الرئوي والالتهاب الشعبي الهوائي (في مرضى انسداد الشعب الهوائية المزمن). (أشخاص بشائع)

أخبر طبيبك إذا حدثت لك أي من الآثار الجانبية التالية أثناء تناول سيريتايد، فقد تكون أعراض التهاب الرئة:
- الحمى أو الرعشة
- زيادة إفراز المخاط أو تغيّر لونه
- زيادة السعال أو زيادة مشاكل التنفس

تم سرد الآثار الجانبية الأخرى أدناه:

شائع جدًا (يحدث أكثر من شخص بين كل 10 أشخاص)
- صداع - يصير هذا أفضل مع استمرار العلاج.
- تم تقرير وجود عدد متزايد من مرات الإصابة بنزلات البرد بين المرضى الذين يعانون من مرض انسداد الشعب الهوائية المزمن (COPD).

شائع (يحدث أقل من شخص واحد بين كل 10 أشخاص)
- السلاق (التهاب، بقع مرتفعة صفراء كريمية) في الفم والحلق. أيضًا التهاب في اللسان وبحة في الصوت وتهيج في الحلق. قد يساعد شطف الفم بالماء وبصق الماء على الفور و/أو غسل أسنانك بالفرشاة بعد تناول كل جرعة من الدواء. قد يصف الطبيب دواءً مضادًا للفطريات لعلاج السلاق.
- ألم وتورم في المفاصل، وألم في العضلات.
- التشنجات العضلية.

كما لوحظت الآثار الجانبية التالية في المرضى المصابين بمرض انسداد الشعب الهوائية المزمن (COPD):
- الكدمات والكسور.
- تورم الجيوب الأنفية (شعور بالتوتر أو إتخام في الأنف والخدود وخلف العينين، وفي بعض الأحيان مع صداع نابض).
- انخفاض في مقدار البوتاسيوم في الدم (ربما تعاني أيضًا من اضطراب في ضربات القلب وضعف في العضلات وتشنج).

غير شائع (يحدث أقل من شخص بين كل 100 شخص)
- زيادة في مقدار السكر (الجلوكوز) في الدم (فرط جلوكوز الدم). إذا كنت تعاني من السكري، قد تكون هناك حاجة لمتابعة السكر في الدم بشكل أكبر وربما تعديل العلاج العادي من السكري.
- إعتام عدسة العين (عدسة غائمة في العين).
- ضربات قلب سريعة للغاية (تسرّع القلب).
- الشعور بالارتجاف (الارتعاش) وضربات القلب السريعة و غير المنتظمة (خفقان) - عادة ما تكون هذه الأعراض غير ضارة وتزول مع تواصل العلاج.
- ألم في الصدر.
- الشعور بالقلق (يحدث هذا بين الأطفال بشكل رئيسي).
- النوم المضطرب.
- الطفح الجلدي التحسسي.

نادر الحدوث (يحدث أقل من شخص بين كل 1000 شخص)
اضطراب نفسي أو أزيز الصدر يتزايد سريعًا بعد استخدام سيريتايد. في حالة حدوث ذلك توقف عن استخدام سيريتايد. ويجب استخدام بخاخ "مسكن" سريع المفعول للمساعدة في التنفس يجب على الفور.
- قد يؤثر سيريتايد على الإنتاج الطبيعي لهرمونات الستيرويد في الجسم، خصوصًا في حالة تناول جرعات عالية لفترات زمنية ممتدة. تشمل هذه الآثار:
  - بطء النمو بين الأطفال والمراهقين
  - ترقق العظام
  - الزرق
  - زيادة في الوزن
  - استدارة الوجه (على شكل القمر) (متلازمة كوشينغ)

سوف يفحصك الطبيب بشكل منتظم بحثًا عن أيّ من هذه الآثار الجانبية وللتأكد من تناول أقل جرعة من السيريتايد للتحكم في الربو لديك.
- التغيرات السلوكية مثل النشاط بشكل غير عادي و سرعة التهيج (تحدث هذه التغيرات بصفة رئيسية بين الأطفال).
- ضربات القلب غير المنتظمة أو الضربات الزائدة (اضطراب النظم). أخبر الطبيب، لكن لا تتوقف عن تناول سيريتايد إلا بتعليمات من الطبيب.
- عدوى فطرية في المريء (الحنجرة)، والتي قد تسبب صعوبات في البلع.

من المحتمل أن يحدث (تكرار غير معروف، لكن يمكن أن يحدث):
- الاكتئاب أو الهياج. هذه الآثار أكثر احتمالاً أن تحدث في الأطفال.
- عدم وضوح الرؤية

٥. كيفية تخزين سيريتايد

يجب حفظ هذا الدواء بعيدًا عن مرأى ومتناول الأطفال.
- لا يجوز استخدام الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدوّن على الملصق وعبوتها الكرتونية بعد كلمة (EXP). تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.
- لا تخزّن في درجة حرارة أعلى من ٣٠ درجة مئوية.

لا تتخلص من الأدوية في الفضلات المائلة ولا المخلفات المنزلية. ويجب سؤال الصيدلاني عن الطريقة المناسبة للتخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. فهذه الإجراءات من شأنها المساعدة في حماية البيئة.

٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

محتويات بخاخ سيريتايد ديسكس
- كل جرعة مُعدة مسبقًا تحتوي على ٥٠ ميكروجرامًا من سالميتيرول (في شكل سالميتيرول زانافوت) و١٠٠ أو ٢٥٠ أو ٥٠٠ ميكروجرام من فلوتيكازون بروبيونات.
- المكوّن الآخر هو لاكتوز أحادي الإماهة (والذي يحتوي على بروتينات الحليب).

شكل بخاخ سيريتايد ديسكس ومحتويات العبوة
- يحتوي سيريتايد ديسكس على شريط من ورق الألومنيوم. ويعمل هذا الشريط من ورق الألومنيوم على حماية مسحوق الاستنشاق من آثار الغلاف الجوي.
- كل جرعة مُعدة مسبقًا.
- الأجهزة معبأة في علب كرتونية تحتوي على:
  عبوة واحدة × ٢٨ جرعة استنشاق ديسكس
  أو ١ أو ٢ أو ٣ أو ١٠ عبوات ديسكس يحتوي كل منها على ٦٠ جرعة استنشاق.
  قد لا تتوفر جميع أحجام العبوات في بعض الأسواق.

الشركة المصنعة:
Glaxo Wellcome Production*, Evreux, France.
*عضو مجموعة شركات GSK.

العلامات التجارية مملوكة أو مُرخّصة لمجموعة شركات GSK
© ٢٠١٩ حقوق الطبع محفوظة لمجموعة شركات GSK أو الجهات المُرخِّص لها

للإبلاغ عن شكوى خاصة بالمنتج/أو الآثار العكسية المرتبطة باستخدام منتجات GSK، يرجى التواصل معنا عبر: gulf.safety@gsk.com
تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في نوفمبر ٢٠١٩.

إن هذا دواء
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذى صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدلي هما الخبيران فى الدواء و بنفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية فى متناول أيدى الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
واتحاد الصيادلة العرب

62000000013092