نشرة دوائيّة: معلومات للمستعمل

لازيكس® 40 ملغ، أقراص فوروسيميد

Lasix®

الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء لأنّها تحتوي على معلومات مهمّة لك.
- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- في حال كان لديك أي أسئلة أخرى، استشر الطبيب أو الصيدلي.
- لقد وُصف هذا الدواء لك أنت شخصيّاً. لا تعطه لأيّ آخر حتّى ولو كانت عوارض مرضه مماثلة لعوارض مرضك لأنّه قد يؤذيه.
- إذا أصبت بأيّ تأثيرات جانبيّة، تحدّث إلى الطبيب أو الصيدلي. ويتضمّن هذا أيّ تأثيرات جانبيّة محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. راجع القسم 4.

ماذا تحتوي هذه النشرة:

1. ما هو لازيكس وما هي دواعي استعماله
2. ما الذي يجب عليك معرفته قبل أخذ لازيكس
3. كيف يؤخذ لازيكس
4. التأثيرات الجانبيّة المحتملة
5. كيف يحفظ لازيكس
6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

1. ما هو لازيكس وما هي دواعي استعماله

لازيكس هو مدرّ للبول (دواء يقوّي إنتاج البول). يُستعمل لازيكس في الحالات التالية:
- تراكم السوائل في الأنسجة (وذمة) بسبب مرض في القلب، أو الكبد،
- تراكم السوائل في الأنسجة (وذمة) بسبب مرض كليوي (إذا كنت مصاباً بالمتلازمة الكلويّة التي تسبّب خسارة البروتين واضطرابات أيض الدهون وتراكم الماء، علاج المرض المستبطن هو الأهمّ)،
- تراكم السوائل في الأنسجة (وذمة) بسبب الحروق،
- ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم).

2. ما الذي يجب عليك معرفته قبل أخذ لازيكس

موانع الاستعمال:

لا تأخذ لازيكس:
- إذا كنت تعاني من حساسيّة ضدّ الفوروسيميد أو السولفوناميد (حساسيّة تبادليّة محتملة مع الفوروسيميد) أو أيّ مركّب آخر من مركّبات لازيكس المذكورة في القسم 6.
- إذا كنت تعاني من فشل كليوي بدون إنتاج للبول (انقطاع البول)، لا يتجاوب مع العلاج بلازيكس.
- إذا كنت تعاني من فشل كبدي مع اضطرابات في الوعي (الشبات وطليعة الشبات الكبدي)،
- إذا كنت تعاني من نقص حاد في البوتاسيوم،
- إذا كنت تعاني من نقص حاد في الصوديوم،
- إذا كنت تعاني من نقص في حجم الدم (نقص حجم الدم) أو في كميّة الماء في الجسم (تجفاف)،
- إذا كنت تُرضعين (راجعي فقرة «الحمل والإرضاع»).

تحذيرات واحتياطات:

تحدّث إلى الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ لازيكس في الحالات الآتية:
- إذا كان ضغط دمك منخفضاً جداً،
- إذا كنت معقّدتاً في السنّ وكنت تأخذ أدوية أخرى يمكن أن تسبّب هبوطاً في ضغط الدم، وإذا كنت تعاني من حالات صحيّة أخرى تشكّل عوامل خطر لهبوط ضغط الدم،
- إذا كنت تعاني من داء السكّري الظاهر أو المستبطن، يجب مراقبة مستويات سكّر الدم مراقبة منتظمة،
- إذا كنت تعاني من الصعف، يجب مراقبة معدّلات حمض اليوليك في الدم مراقبة منتظمة،
- إذا كنت تعاني من إخراج البول (مثلاً بسبب تضخّم البروستات أو انسداد كليوي أو تقلّص الأنبوب الذي يمتدّ من الكليتين حتّى المثانة)،
- إذا كان معدّل البروتين في دمك منخفضاً مثلاً في المتلازمة الكلاتينيّة (التي تتميّز بخسارة البروتين، وباضطرابات في أيض الشحوم وبتراكم الماء)، يجب ضبط مقدار الجرعة بدقّة،
- إذا كنت تعاني من عسر الوظيفة الكلويّة المتقدّم بسرعة المتعلّق بمرض كبديّ خطير مثل تشمّع الكبد (التندّر الكبدي الكلوي)،
- إذا كنت تعاني من اضطرابات في دفق الدم في الأوعية الدماغيّة أو في أوعية القلب لأنك تكون معرّضاً لخطر كبير إذا واجهت هبوطاً حادّاً في ضغط الدم.

لدى المرضى الذين يعانون من اضطرابات في التبول (مثلاً بسبب تضخّم البروستات)، يمكن فحسب لازيكس إذا كان من الممكن إعادة النتاج البولي الطبيعي، بما أنّ بداية مفاجئة لدفق البول قد تسبّب انقطاع بول ساذا (احتباس البول) يمكن أن تُجهد المثانة.

بسبب لازيكس زيادة في إفراز الصوديوم والكلوريد وكتيتيمية لذلك، إزالة أعلى للماء. كما يزيد إفراز منحلّات كهيربائيّة أخرى (بخاصة البوتاسيوم والكلسيوم والمغنيزيوم)، بما أنّه غالباً ما تُلاحظ اضطرابات في توازن السوائل والمنحلّات الكهربائيّة في خلال العلاج بلازيكس كنتيجة لزيادة إفراز الماء والمنحلّات الكهربائيّة، يجب مراقبة مستويات بعض المواد في الدم مراقبة منتظمة.

في خلال العلاج الطويل الأمد بلازيكس، يجب إجراء بعض فحوصات الدم لا سيّما معدّلات البوتاسيوم والصوديوم والكلسيوم وثاني الكربونات والكرياتينين واليوريا وحمض اليوليك وكذلك غلوكوز الدم بصورة منتظمة.

يجب إجراء مراقبة دقيقة جدّاً إذا كنت معرّضاً بشكل كبير لاضطرابات في المنحلّات الكهربائيّة أو إذا كنت تعاني من خسارة حادّة في السوائل (مثلاً بسبب التقيّؤ أو الإسهال أو التعرّق المفرط). يجب تصحيح أيّ نقص في حجم الدم الدوراني أو في ماء الجسم أو أيّ اضطرابات كبيرة في المنحلّات الكهربائيّة أو في التوازن الحمضي القاعدي، قد يتطلّب هذا تعديلاً موقّتاً لعلاج بلازيكس.

يمكن أن تلهب الأمراض المستبطنة (مثلاً تشمّع الكبد وقصور القلب) وأدوية تُؤخذ بالتزامن والطعام دورًا في الإصابة المحتملة باضطرابات في المنحلّات الكهربائيّة.

يجب ألاّ تتعطّش خسارة الوزن بسبب التبول المفرط كيلوغراماً واحداً في اليوم بغضّ النظر عن كميّة النتاج البولي.

إذا كنت مصاباً بالمتلازمة الكلويّة (أنظر أعلاه)، من الضروري التقيّد بدقّة بالجرعة الموصوفة بسبب زيادة خطر التأثيرات الجانبيّة.

الاستعمال المتزامن مع الريسبيريدون:

في دراسات العلاج الإرضائي المراقبة مع الريسبيريدون لدى المرضى المسنّين المصابين بالعته، لوحظ معدّل وفيّات أعلى لدى المرضى الذين عولجوا بالفوروسيميد والريسبيريدون بالتزامن مقارنة بالمرضى الذين تلقّوا الريسبيريدون أو الفوروسيميد بشكل فردي. لذلك يوصى باعتماد الحذر ويجب أن يقيّم طبيبك بدقّة المنافع والمخاطر المرتبطة بالعلاج بهذين الدوائين أو علاج متزامن بعقّارات بول قويّة أخرى. يجب تفادي خسارة الماء.

هناك إمكانية تفاقم أو تفعيل الذئبة الحمامية الجهازيّة، مرض يهاجم فيه جهاز المناعة الجسم.

الأطفال

يجب إجراء مراقبة دقيقة لدى الأطفال الخدّج بما أنّهم معرّضون لخطر التكلّس الكليوي أو الحصاة الكلويّة. تتضمّن طرق المراقبة فحوصات للوظيفة الكلويّة وفحوصات بالصوت فوق السمعي.

قد يتعرّض الأطفال الخدّج الذين يعانون من صعوبة في التنفّس (متلازمة ضيق النفس) ويخضعون لعلاج مدرّ للبول بلازيكس، في الأسابيع الأولى من حياتهم، لخطر أعلى يتمثّل ببقاء الوعاء الذي يحول الدوران الرئوي قبل الولادة مفتوحاً (القناة الشريانيّة المفتوحة بشكل دائم).

تأثيرات الاستعمال الخاطئ على نتائج فحوصات تعاطي المنشّطات

قد يعطي لازيكس نتائج إيجابيّة في فحوصات كشف تعاطي المنشّطات. فضلاً عن ذلك، يمكن أن يشكّل استعمال لازيكس كمادة منشّطة خطرًا على صحّتك.

أدوية أخرى ولازيكس

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ أو أخذت مؤخرًا أو قد تأخذ أيّ أدوية أخرى.

قد تتأثّر فعاليّة لازيكس بالعلاج المتزامن بالأدوية أو بمجموعات الأدوية التالية:
- الهورمونات القشرانيّة السكريّة (كورتيزون)، الكاربينوكسولون أو المثلينات لأنّها قد تزيد من خسارة البوتاسيوم مما قد يؤدّي إلى نقص في البوتاسيوم.
- الأدوية التي لها مفعول مضاد للكليّات (مضادات الالتهاب غير الستيرويديّة مثل الإندوميثاسين والأسبيرين) لأنّها قد تضعف مفعول لازيكس. إذا سبّب العلاج بلازيكس انخفاضاً في حجم الدم الدوراني أو خسارة ماء الجسم، قد يسبّب الإعطاء المتزامن لمضادات الالتهاب غير الستيرويديّة وعمومًا كلويًا حادّاً.
- الريوبيزيمب (دواء مضاد للفترض)، الميلوتريكسات (دواء مضاد للورماتيزم وكابتات للمناعة) وأدوية أخرى تُفرز في البول مثل الفوروسيميد لأنّها قد تخفّف مفعول لازيكس.
- الفيلتيون (دواء يُستعمل لعلاج نوبات الصرع وبعض أنواع الألم)، لأنّه أقيد بأنّه يخفّف مفعول لازيكس.
- السوكرالفات (دواء للمعدة)، لأنّه يخفّض كميّة لازيكس التي يتم امتصاصها من الأمعاء وبالتالي يخفّض مفعوله. يجب التقيّد بفاصل زمني من ساعتين على الأقلّ بين استعمال الدوائين.
- أعلم الطبيب إذا كنت تأخذ الأنيسكيرين لعلاج ضغط الدم المرتفع.

قد تتأثّر فعاليّة لازيكس أو مجموعات الأدوية التالية بالعلاج المتزامن بلازيكس.
- بعض الأدوية الفقيتة (الغليكوسايد)، لأنّ حساسيّة عضلة القلب تجاه هذه الأدوية قد تزداد بفعل نقص في البوتاسيوم أو المغنيزيوم يحصل في خلال العلاج بلازيكس. يزيد خطر تعرّض المرضى الذين يعانون من اعتلالات في المنحلّات الكهربائيّة لاضطرابات في سرعة القلب (لا نظميّة قلبيّة، بما في ذلك التواء أطراف البطينين بسبب كثرة خفقانها) وعندما يُستعمل لازيكس بالتزامن مع أدوية يمكن أن تسبّب بعض التغييرات في مخطّط كهربائيّة القلب (إطالة فارق كيو تي QT) (مثلاً ترفيدانيدين وهو مضاد للحساسيّة وبعض الأدوية التي يُستعمل في حالة اضطرابات سرعة القلب إيمضادات اللاانظمية من الفئتين I و III).
- أدوية السالييسلات (مسكّنات) ذات الجرعة العالية لأنّ تأثيراتها الجانبيّة قد تزداد فوّة في حالة الاستعمال المتزامن بلازيكس.
- الأدوية التي تسبّب ضرراً بالكلى (الأدوية المتلفة للكلى) (مثلاً المضادات الحيويّة مثل الأمينوغليكوسيد والسيفالوسبورين والبولميكسين