

# نشرة العبوة: معلومات للمريض مرهم فيوسيدين® 2%

حصن الفوسيديك

- أقرأً هذه النشرة بالكامل معنافية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة إليك.
- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، فاسأل طبيبك أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء لك أنت فقط. لا تقدمه إلى آخرين. فقد يضرهم، حتى لو بدت لك علامات مرضهم مماثلة لمرضك.
- إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مرددة في هذه النشرة. راجع القسم 4.

آثار جانبية نادرة (قد تظهر لدى عدد يصل إلى 1 من كل 1,000 شخص):

- فرط الحساسية
- التهاب العين مع احمرار العينين والدموع.
- التلفح الجلدي (الشرى) والتورم؛ قد يكتون شديدين. تحدث إلى طبيبك. إذا كان هناك تورم في الوجه والشفتين واللسان، فقد يكون ذلك مهدداً للحياة. اتصل بالرقم .
- الشرى
- البثور

## التالي عن الآثار الجانبية

إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مرددة في هذه النشرة. من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

## 5. كيفية تخزين فيوسيدين®

احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

فترة التخزين: 3 سنوات.

ـ EXP

أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة. حفاظاً على البيئة، لا تلق بقايا الدواء في البالوعة أو المرحاض أو سلة القمامات.

## 6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

يحتوي فيوسيدين على:

المادة الفعالة: فوسيدات الصوديوم.

المكونات الأخرى هي: كحول سبيطيل، لانولين لا مائي، زيت بارافين، بارافين أبيض ناعم، بوتيل هيدروكسي تولوين E.

المظاهر وأحجام العبوات

فيوسيدين هو مرهم شفاف لونه أبيض إلى أبيض مصفر.

أحجام العبوات: 15 جم و 30 جم

للإبلاغ عن أي آثار (آثار) جانبية:

ـ المملكة العربية السعودية:

ـ المركز الوطني للتبيظ الوائي (NPC):

ـ مركز اتصال الهيئة السعودية للغذاء والدواء: 19999

ـ البريد الإلكتروني: npc.drug@sdfa.gov.sa

ـ الموقع الإلكتروني: https://ade.sdfa.gov.sa

ـ دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى:

ـ يرجى التواصل مع الهيئة المختصة ذات المصلحة.

الجهة الحاصلة على ترخيص التسويق:

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup

## جهة التصنيع

ـ LEO Laboratories Ltd., 285 Cashel Road,  
Dublin 12, أيرلندا

تم إجراء آخر تعديل على هذه النشرة في يونيو 2018.

## هذا دواء

- الدواء منتج، لكن ليس مثل غيره من المنتجات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وتناوله بما يخالف التعليمات بشكل خطير عليه.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي يتابع لك الدواء. الطبيب والصيدلي خبران في الأدوية وفواكهها ومحارتها.
- لا تقطع فترة العلاج الموصوفة لك من تقاء نفسك.
- لا تكرر الدواء نفسه ولا ترفع الجرعات من دون استشارة طبيبك.

لا تترك الدواء في متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيادة العربي

## محتويات هذه النشرة

ـ 1. ما فيوسيدين® وفيه يستخدم

ـ 2. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام فيوسيدين®

ـ 3. كيفية استخدام فيوسيدين®

ـ 4. الآثار الجانبية المحتملة

ـ 5. كيفية تخزين فيوسيدين®

ـ 6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

ـ 7. ما فيوسيدين® وفيه يستخدم

ـ يحتوي فيوسيدين على مضاد حيوي يعمل على البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهاباً في الجلد.

ـ يمكنك استخدام فيوسيدين للالتهابات التي تسببها البكتيريا التي تعمل عليها فيوسيدين.

ـ من الممكن أن يكون طبيبك قد وصف استخدامات أخرى. اتبع تعليمات طبيبك دائماً.

ـ اتصل بطبيبك إذا ساءت حالتك أو إذا لم تتحسن.

ـ 2. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام فيوسيدين®

ـ قد يكون طبيبك قد وصف استخدامات أو جرعات أخرى يختلف تلك الموصوفة في هذه المعلومات. اتبع دائمًا تعليمات طبيبك والمعلومات الموجودة على ملصق الجرعة.

ـ لا تستخدم فيوسيدين:

ـ إذا كنت تعاني من حساسية تجاه فوسيدات الصوديوم أو أي من مكونات فيوسيدين

ـ الأخرى (المدرجة في القسم ).

ـ المخاذن والاحتياطات

ـ لا تستخدم المرهم حول العينين لأنه قد يؤدي إلى تهييج العين.

## الحمل والرضاة

ـ إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين لإنجاب طفل، فاسألي طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل استخدام هذا الدواء.

## الحمل

ـ ينبغي لك استخدام فيوسيدين وفقاً لتعليمات طبيبك فقط.

## الرضاة الطبيعية

ـ يمكنك الإرضاع طبيعياً حتى لو كنت تستخدمين فيوسيدين، لكن لا ينبغي لك وضعه على ثديك.

## السلامة في الطريق والسلامة المهنية

ـ لا يؤثر فيوسيدين على السلامة المهنية والقدرة على القيادة بأمان في حركة المرور.

## الأدوية الأخرى مع فيوسيدين

ـ آخر طبيبك أو الصيدلي دائمًا إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى أو قد تتناولها مؤخرًا.

ـ يمكنك استخدام فيوسيدين مع أدوية أخرى.

ـ يحتوي فيوسيدين على بوتيل هيدروكسي تولوين وكحول سبيطيل ولانولين

ـ يمكن أن يسبب محتوى كحول سبيطيل وبوتيل هيدروكسي تولوين E321 طفحًا جلديًا موضعياً (مثل التهاب الجلد التحسسي). يمكن أن يسبب اللانولين طفحًا جلديًا موضعياً لدى من يعانون من الحساسية تجاه اللانولين.

ـ قد يسبب بوتيل هيدروكسي تولوين E أيضًا تهييجاً للعين والأغشية المخاطية.

## 3. كيفية استخدام فيوسيدين

ـ استخدم هذا الدواء دائمًا كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي بالضبط. إذا راودك شك، فاسألي طبيبك أو الصيدلي.

## الجرعة المعتادة هي:

### الأطفال والكبار:

ـ ضع المرهم 3-3 مرات في اليوم.

ـ إذا استخدمت فيوسيدين أكثر مما ينبغي

ـ اتصل بطبيبك أو قسم الطوارئ أو الصيدلي إذا كنت قد استخدمت فيوسيدين أكثر مما

ـ هو من ذكر في هذه المعلومات، أو أكثر مما قد وصفه طبيبك (وتشعر بتوعك).

ـ لا تتوفر معلومات بشأن التسمم بعد استخدام فيوسيدين.

ـ إذا نسيت استخدام فيوسيدين

ـ لا تستخدم جرعة مضاعفة لتدعيم جرعة منسية. استمر بالجرعة المعتادة فحسب.

## 4. الآثار الجانبية المحتملة

ـ مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، على الرغم من عدم حدوثها للجميع.

ـ آثار جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى عدد يصل إلى 1 من كل 100 شخص):

ـ الإكزيما


ـ التلفح الجلدي

ـ الحكة

ـ أحمراء الجلد

ـ الألم في مكان وضع المستحضر (بما في ذلك الإحساس بالحرقان أو الوخز في الجلد)

ـ التهيج في مكان وضع المستحضر



LEO