

Pemetrexed NEAPOLIS® 100 mg

Pemetrexed 100 mg

Lyophilisat pour solution à diluer pour perfusion

Veuillez lire attentivement cette notice avant de recevoir ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Pemetrexed NEAPOLIS et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Pemetrexed NEAPOLIS ?
3. Comment utiliser Pemetrexed NEAPOLIS ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Pemetrexed NEAPOLIS ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Pemetrexed NEAPOLIS et dans quels cas est-il utilisé

Pemetrexed NEAPOLIS est un médicament utilisé dans le traitement du cancer. Pemetrexed NEAPOLIS est donné en association avec le cisplatine, un autre médicament anticancéreux, comme traitement contre le mésthiéliome pleural malin, une forme de cancer qui touche l'enveloppe du poulmon, chez les patients qui n'ont pas reçu de chimiothérapie antérieure. Pemetrexed NEAPOLIS est également donné en association avec le cisplatine comme traitement initial des patients atteints d'un cancer du poulmon au stade avancé. Pemetrexed NEAPOLIS est également un traitement pour les patients atteints d'un cancer du poulmon au stade avancé dont la maladie a progressé, après avoir reçu une autre chimiothérapie initiale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Pemetrexed NEAPOLIS ?

N'utilisez jamais Pemetrexed NEAPOLIS :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au pémétréxed ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6),
- si vous allaitez, vous devez interrompre l'allaitement durant le traitement par Pemetrexed NEAPOLIS.

- si vous avez reçu récemment ou allez recevoir le vaccin contre la fièvre jaune.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien hospitalier avant de recevoir Pemetrexed NEAPOLIS. Si vous avez ou avez eu des problèmes aux reins, informez-en votre médecin ou votre pharmacien hospitalier car vous ne pouvez peut-être pas recevoir Pemetrexed NEAPOLIS.

Avant chaque perfusion, des prélèvements de sang seront réalisés afin d'évaluer si vos fonctions rénale et hépatique sont correctes et de vérifier que vous avez suffisamment de cellules sanguines pour recevoir Pemetrexed NEAPOLIS. Votre médecin peut décider de modifier la dose ou de repousser le traitement en fonction de votre état général et si votre taux de cellules sanguines est trop bas. Si vous recevez également du cisplatine, votre médecin s'assurera que vous êtes correctement hydraté et que vous recevez un traitement avant et après l'administration de cisplatine pour prévenir les vomissements.

Si vous avez eu ou allez avoir une radiothérapie, informez-en votre médecin, car il peut se produire une réaction précoce ou tardive à la radiothérapie avec Pemetrexed NEAPOLIS. Si vous avez été récemment vacciné, informez-en votre médecin, car ceci peut possiblement provoquer des effets néfastes avec Pemetrexed NEAPOLIS. Si vous avez une maladie cardiaque ou des antécédents de maladie cardiaque, informez-en votre médecin.

Si vous avez une accumulation de liquide autour du poulmon, votre médecin peut décider d'enlever ce liquide avant l'administration de Pemetrexed NEAPOLIS.

Enfants et adolescents

L'utilisation de Pemetrexed NEAPOLIS dans la population pédiatrique n'est pas approuvée.

Autres médicaments et Pemetrexed NEAPOLIS

Informez votre médecin si vous prenez des médicaments contre la douleur ou l'inflammation (gonflement), tels que les médicaments appelés « Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens » (AINS), y compris des médicaments obtenus sans ordonnance (tels que l'ibuprofène). Il existe divers types d'AINS avec différentes durées d'action. Selon la date prévue de votre perfusion du Pemetrexed NEAPOLIS et/ou l'état de votre fonction rénale, votre médecin vous indiquera quels médicaments vous pouvez prendre et quand vous pouvez les prendre. En cas de doute, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si certains de vos médicaments sont des AINS. Si vous prenez ou avez récemment pris tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien hospitalier.

Grossesse

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, informez votre médecin. L'utilisation de Pemetrexed NEAPOLIS doit être évitée pendant la grossesse. Votre médecin discutera avec vous les risques potentiels lorsque Pemetrexed NEAPOLIS est donné pendant la grossesse. Les femmes doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement par Pemetrexed NEAPOLIS.

Allaitement

Si vous allaitez, informez votre médecin.

L'allaitement doit être interrompu pendant le traitement par Pemetrexed NEAPOLIS.

Fertilité

Il est conseillé aux hommes de ne pas concevoir d'enfant durant leur traitement avec Pemetrexed NEAPOLIS et dans les 6 mois qui suivent son arrêt, et par conséquent d'utiliser un moyen de contraception efficace durant le traitement avec Pemetrexed NEAPOLIS et dans les 6 mois qui suivent son arrêt. Si vous souhaitez concevoir un enfant durant le traitement ou dans les 6 mois qui suivent le traitement, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Vous pouvez demander conseil concernant la conservation

de sperme avant de débuter votre traitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Pemetrexed NEAPOLIS peut entraîner une sensation de fatigue. Soyez prudent pendant la conduite des véhicules et l'utilisation de machines.

3. Comment utiliser Pemetrexed NEAPOLIS

La dose de Pemetrexed NEAPOLIS est de 500 milligrammes par mètre carré de votre surface corporelle. Votre taille et votre poids corporel sont mesurés pour déterminer la surface de votre corps. Votre médecin utilisera cette surface corporelle afin de déterminer la dose exacte qui vous sera administrée. Cette dose peut être ajustée ou le traitement repoussé en fonction du résultat de vos analyses sanguines et de votre état général. Un pharmacien hospitalier, un infirmier ou un médecin mélangera la poudre de Pemetrexed NEAPOLIS avec une solution de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) pour préparation injectable avant de vous l'administrer par perfusion dans l'une de vos veines.

Vous recevrez toujours Pemetrexed NEAPOLIS par perfusion dans l'une de vos veines. La perfusion durera approximativement 10 minutes.

Lorsque Pemetrexed NEAPOLIS est utilisé en association au cisplatine :

Votre médecin ou votre pharmacien hospitalier définira la dose en fonction de votre taille et de votre poids. Le cisplatine est également donné par perfusion dans l'une de vos veines et est administré environ 30 minutes après la fin de la perfusion de Pemetrexed NEAPOLIS. La perfusion de cisplatine durera approximativement 2 heures.

Vous devriez recevoir votre perfusion de Pemetrexed NEAPOLIS une fois toutes les trois semaines.

Médicaments associés :

Corticoides : votre médecin vous prescrira des comprimés de corticostéroïdes (équivalents à 4 milligrammes de dexaméthasone 2 fois par jour) que vous devez prendre le jour précédent, le jour même et le jour suivant le traitement par Pemetrexed NEAPOLIS. Ce médicament vous est donné afin de réduire la fréquence et la sévérité des réactions cutanées que vous pouvez présenter pendant votre traitement anticancéreux.

Supplémentation en vitamines : votre médecin vous prescrira de l'acide folique (vitamine B) par voie orale ou un médicament contenant plusieurs vitamines dont de l'acide folique (350 à 1000 microgrammes) que vous devez prendre une fois par jour pendant le traitement par Pemetrexed NEAPOLIS. Vous devez prendre au moins cinq doses dans les sept jours qui précèdent la première injection de Pemetrexed NEAPOLIS. Vous devez continuer de prendre l'acide folique pendant les 21 jours après la dernière injection de Pemetrexed NEAPOLIS.

Vous recevrez également une injection intramusculaire de vitamine B12 (1000 microgrammes) dans la semaine précédant la première dose de Pemetrexed NEAPOLIS puis environ toutes les 9 semaines (ce qui correspond à 3 cycles de traitement par Pemetrexed NEAPOLIS). La vitamine B12 et l'acide folique vous sont donnés afin de réduire les effets toxiques éventuels dus au traitement anticancéreux.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous devez contacter votre médecin immédiatement si vous ressentez un des effets suivants :

- Fièvre ou infection (fréquent) : si vous avez une température de 38°C ou plus, si vous transpirez ou si vous avez d'autres signes d'infection (parce que vous pouvez avoir des globules blancs en nombre inférieur à la normale, ce qui est très fréquent). L'infection (sepsis) peut être sévère et conduire au décès.
- Si vous commencez à ressentir une douleur à la poitrine (fréquent) ou des palpitations (peu fréquent).

- Si vous avez une douleur, une rougeur, un gonflement ou des plaies au niveau de la bouche (très fréquent).
- Réaction allergique : si vous présentez une éruption cutanée (très fréquent) / une sensation de brûlure ou de fourmillement (fréquent), ou une fièvre (fréquent). Rarement, des réactions de la peau peuvent être sévères et conduire au décès. Contactez votre médecin si vous avez des éruptions sévères, ou des démangeaisons, ou des cloques qui se forment (syndrome de Stevens-Johnson ou syndrome de Lyell).

- Si vous êtes fatigué, si vous vous sentez faible, si vous vous essouffez facilement ou si vous êtes pâle (parce que vous pouvez avoir un taux d'hémoglobine inférieur à la normale, ce qui est très fréquent).

- Si vous saignez des gencives, du nez ou de la bouche ou si un saignement ne s'arrête pas, si vos urines sont rosées ou rougeâtres, si vous présentez des bleus inattendus (parce que vous pouvez avoir des plaquettes en nombre inférieur à la normale, ce qui est très fréquent).

- Si vous avez un essoufflement brutal, une douleur intense à la poitrine ou une toux avec des crachats de sang (peu fréquent) (cela peut évoquer un caillot de sang dans les vaisseaux sanguins des poulmons).

- Les effets indésirables possibles de Pemetrexed NEAPOLIS sont :

- Très fréquents (pouvant affecter plus d'1 personne sur 10) : Nombre de globules blancs peu élevé (anémie) ; Nombre de globules blancs peu élevé ; Taux d'hémoglobine peu élevé (anémie) ; Douleur, rougeur, gonflement ou plaies dans votre bouche, Nausées, Perte d'appétit, Fatigue, Eruption cutanée Perte de cheveux

- Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : Constipation ; Perte de sensibilité ; Rein : analyses sanguines anormales

- Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : Insuffisance rénale aiguë ; Palpitations ; Une inflammation de la paroi de l'œsophage (grosier) a été rapportée avec le pemetrexed/radiothérapie ; Colite (inflammation de la paroi du gros intestin qui peut être accompagnée par un saignement intestinal ou rectal) ; Pneumopathie interstitielle (lésions sur les alvéoles du poulmon). Œdèmes (excès de liquide dans les tissus,

Pemetrexed NEAPOLIS® 500 mg

Pemetrexed 500 mg

Lyophilisat pour solution à diluer pour perfusion

LES INFORMATIONS SUIVANTES SONT DESTINÉES
EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ :

Instructions pour l'utilisation, la manipulation et l'élimination :

1. Utiliser des techniques aseptiques pour la reconstitution et la dilution ultérieure de la solution de pémétréxed pour administration par perfusion intraveineuse.

2. Calculer la dose et le nombre de flacons de Pemetrexed NEAPOLIS nécessaires.

Chaque flacon contient un excès de pémétréxed pour faciliter l'administration de la quantité prescrite.

3. Reconstitution :

Pemetrexed NEAPOLIS 100 mg :

Reconstituer les flacons de 100 mg avec 4,2 ml de solution de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) pour préparations injectables, sans conservateur, ce qui donne une solution contenant environ 25 mg/ml de pémétréxed.

Pemetrexed NEAPOLIS 500mg :

Reconstituer les flacons de 500 mg avec 20 ml de solution de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) pour préparations injectables, sans conservateur, ce qui donne une solution contenant environ 25 mg/ml de pémétréxed.

Agiter délicatement chaque flacon jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. La solution ainsi obtenue est claire et sa couleur varie de l'incolore au jaune ou jaune verdâtre sans conséquence sur la qualité du produit. Le pH de la solution reconstituée varie de 6,6 à 7,8. **Une dilution ultérieure est nécessaire.**

4. Le volume approprié de la solution reconstituée de pémétréxed doit être à nouveau dilué pour atteindre 100 ml, avec une solution de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) pour préparations injectables, sans conservateur, et administré en perfusion intraveineuse de 10 minutes.

5. Les solutions pour perfusion de pémétréxed préparées comme indiqué ci-dessus sont compatibles avec les poches et les tubulures de perfusion intraveineuse en chlorure de polyvinyle (PVC) et polyoléfine.

6. Les médicaments pour usage parentéral doivent faire l'objet d'une inspection visuelle avant administration, pour détecter la présence éventuelle de particules ou d'une modification de la couleur. Si des particules sont présentes, ne pas administrer. Le pémétréxed est incompatible avec les diluants contenant du calcium, incluant les solutions injectables Ringer et Ringer lactate.

7. Les solutions de pémétréxed sont à usage unique seulement. Tout produit non utilisé ainsi que les déchets doivent être éliminés selon les procédures locales.

Préparation et précautions d'administration :

Comme pour tout agent anticancéreux potentiellement toxique, des précautions doivent être prises lors de la manipulation et de la préparation des solutions pour perfusion de pémétréxed. L'utilisation de gants est recommandée. En cas de contact de la solution de pémétréxed avec la peau, laver la peau immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact de la solution de pémétréxed avec les muqueuses, rincer abondamment avec de l'eau. Le pémétréxed n'est pas un agent vésicant. Il n'existe pas d'antidote spécifique en cas d'extravasation de pémétréxed. Quelques cas d'extravasation de pémétréxed ont été rapportés et ont été considérés comme non graves par les investigateurs. Les extravasations devraient être prises en charge selon les pratiques standards locales appliquées aux autres agents non-vésicants.

entraînant un gonflement). : Des patients ont rapporté une crise cardiaque, une attaque cérébrale ou une « mini attaque cérébrale » pendant le traitement par le pemetrexed, habituellement lorsqu'il est associé avec un autre traitement anticancéreux ; Pancytopenie-diminution combinée des globules blancs, globules rouges et plaquettes ; Pneumopathie radique (atteinte au niveau des alvéoles du poulmon associée à une radiothérapie) pouvant survenir chez des patients également traités par radiothérapie soit avant, pendant ou après leur traitement par Pemetrexed NEAPOLIS ; Douleur, froidure et décoloration au niveau des extrémités ont été rapportées ; Caillots de sang dans les vaisseaux sanguins du poulmon (embolie pulmonaire)

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000)

Des réactions de rappel (une éruption cutanée comme un coup de soleil important) qui peut survenir sur la peau ayant été auparavant exposée à la radiothérapie, des jours ou des années après l'irradiation ; Atteintes bulleuses (maladies bulleuses de la peau) - incluant syndrome de Stevens-Johnson et syndrome de Lyell ; Anémie hémolytique immunologique (destruction des globules rouges induite par les anticorps) Hépatite (inflammation du foie) ; Choc anaphylactique (réaction allergique sévère)

Indéterminée : fréquence qui ne peut être estimée sur la base des données disponibles.

Gonflement de la jambe avec douleur et rougeur ; Vous pouvez avoir un de ces symptômes ; Vous devez informer votre médecin dès que vous commencez à présenter un de ces effets indésirables. Si vous souffrez d'un ou de plusieurs symptômes, informez votre médecin.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration (CNPV) : centre national de pharmacovigilance, site internet : www.pharmacovigilance.ms.tn. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Pemetrexed NEAPOLIS

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette et l'emballage. A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

La solution reconstituée et solution pour perfusion : Le produit doit être utilisé immédiatement. S'il est préparé comme indiqué, la stabilité physique et chimique de la solution reconstituée et de la solution diluée de pémétréxed ont été démontrées pendant 24 heures au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ce médicament est à usage unique ; toute solution non utilisée doit être éliminée selon les procédures locales.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Pemetrexed NEAPOLIS

Le substance active est le pémétréxed.

Pemetrexed NEAPOLIS 100 mg : Chaque flacon contient 100 milligrammes de pémétréxed (sous forme de pémétréxed disodique).

Pemetrexed NEAPOLIS 500 mg : Chaque flacon contient 500 milligrammes de pémétréxed (sous forme de pémétréxed disodique). Après reconstitution, la solution contient 25 mg/ml de pémétréxed.

Après reconstitution, la solution doit être diluée par un professionnel de santé avant la perfusion intraveineuse. Les autres composants sont : le mannitol.

Comment se présente Pemetrexed NEAPOLIS et contenu de l'emballage extérieur.

Pemetrexed NEAPOLIS est un lyophilisat pour solution à diluer pour perfusion dans un flacon en verre type 1. Chaque boîte de Pemetrexed NEAPOLIS consiste en un flacon de Pemetrexed NEAPOLIS.

Conditions de délivrance : Tableau A/Liste 1

N°AMM : Pemetrexed NEAPOLIS 100 mg : 939 307 1H

Pemetrexed NEAPOLIS 500 mg : 939 307 2H

Tiulaire de l'autorisation de mise sur le marché et Fabricant :

Neapolis Pharma : Route de Tunis Km 7 - BP 206 Nabeul 8000 - Tunisie.

Tel : +216 31 338 400 / Fax : +216 72 235 016 - +216 31 338 421

E-mail : neapolispharma@neapolispharma.com

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est mars 2019.

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.

- الدواء مستحضر يؤثر على سميتك واستماتتك خلافا لتعليمات ميركات للنشر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليك.

- تقيد بتعليمات الصيدلاني التي صرفها لك الطبيب والصيدلاني هما الخيران بالدواء ويبنفه وضرره.

- لاتقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

- لاتعد ولاترد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول ايدي الأطفال

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit, suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- N'en reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

GARDEZ LES MÉDICAMENTS HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



NEAPOLIS
PHARMA