

كيرلون® ملخ  
(بيتاكسولول)  
قرص محرز بخطاء قلمي  
(KERLONE® 20mg Tab)

- الرجال أن تقرأ بدقة هذه النشرة كاملة قبل تناول هذا الدواء. - احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مجدداً.  
- في حال كان لديك أسلحة أخرى أو شوكولات، استهلك طبعها أو الصبليدي المزدوج من المعلومات.  
- لقد فحص هذا الدواء لك شخصياً، لا تحمله لأحد آخر حتى ولو كانت موارضه مثل عوارضك لأنه قد يسبب له الآذى.

تعريف الدواء  
التركيز:

بيتاكسولول ميدروكلورايد ..... ٢٠ ملخ

الأسوجة لاكتون، كاربوكسيميثيلاميدون، سليلوز دقيق البلاورية، سيليكا مميهة لامانية، ستيبارات الماغنيزيوم، هايبروميثيلون، ماكروغول ٤٠، ثاني أكسيد التاتيانيوم، كميةكافية لقرص واحد.

الشكل الصيدلاني والتقديم:

قرص محرز بخطاء قلمي. - علبة تحتوي على ٢٨ قرصاً  
فتلة الاستدوار:

حاصر للبيتا / مضاد للذبحة وعامل مضاد لارتفاع ضغط الدم.  
اسم وعنوان حامل رخصة التسويق:

sanofi-aventis france - 1-13, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - France  
اسم وعنوان المصنع:

Sanofi Winthrop Industrie - 30-36, avenue Gustave Eiffel - 37100 Tours - France  
دوعي الاستعمال:

هذا الدواء خاص للبيتا يخفض من بعض عوارض ("البيتا") الجملة الودية للنظام القلبي الوعائي.  
يمكن استعمال هذا الدواء في حالات:

- ارتفاع ضغط الدم الشرياني. - العلاج الوقائي لعواض الذبحة الناتجة عن الإجهاد.

تحذير:

موانع الاستعمال:

يجب عدم استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

- قصور قلبي غير متցاوب للعلاج. - بطء القلب (دقائق القلب أقل من ٤٥ - ٥٠ دقة بالدقائق). - اضطرابات شريانية محظوظة حادة. - انخفاض ضغط الدم. - حساسية مفرطة ضد البيتاكسولول. - في بعض الحالات الحادة من الربو والاعتنال القصبي الرئوي السار. - بالتزامن مع الفلوكلوتاكفينين (دواء للألم) والسولتوريبريد (دواء حاصل بالجهاز العصبي).

بشكل عام، ينصح بعدم تناول هذا الدواء خلال فترة الرضاعة ومع الأميدورون، البيريديل، الديتاكريم، الفيراباميل (أدوية خاصة بالقلب).  
في حال الشك، منضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات خاصة: - لا توقف العلاج بشكل مفاجئ دون استشارة الطبيب. احتفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

بسبب وجود اللاكتون، يمكن تناول هذا الدواء في حالة الفلكوتوكزيمية الميلائية، سوء امتصاص الغلوكون/الغالاكتون أو متلازمة قصور اللاكتون (اضطرابات أيضية نادرة).

احتياطات الاستعمال: - يجب إعلام الطبيب في حال الحمل أو الرضاعة أو في حال المعاناة من داء السكري، القصور الكلوي أو المصادف أو في حال وجود تاريخ مع المحسسيات. - في حال الخضوع إلى عملية جراحية يجب إعلام أخصائي التخدير باستعمالكم هذا الدواء.  
في حال الشك، ينصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

تفاعلات الدواء والتفاعلات الأخرى: تتجنب أي تفاعلات ممكنة بين بعض الأدوية، بالأخص الفلوكلوتاكفينين، السولتوريبريد، الأميدورون، البيريديل، الديتاكريم، والفيراباميل، يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي فوراً عن أي دواء آخر تأخذوه.  
الحمل - الرضاعة: - إعلام الطبيب في حال الحمل. - ينصح بعدم الرضاعة خلال العلاج.

الرياضيين والرياضيات:

يجب أن يلحظ الرياضيون والرياضيات أن هذا المنتج يحتوي على مادة فعالة قد تعيق نتيجة إيجابية في فحوصات كشف المخدرات.  
لانحة الأسوجة التي يجب أن تحدد لاستعمال خال من الخط عن بعض المرضى: - لاكتون.

طريقة استخدام هذا الدواء - الجرعة: الجرعة المادية هي قرص ٢٠ ملخ مرة واحدة في اليوم، في جميع الحالات يجب اتباع وصفة الطبيب بدقة.  
طريقة الاستعمال: غير الملم. يجب بلع الأقراص كاملة مع الشرب وبدون مضغ.

توازن الاستعمال ووقفة: في جميع الحالات يجب اتباع وصفة الطبيب بدقة.  
مدة العلاج: في جميع الحالات يجب اتباع وصفة الطبيب بدقة.

كيفية التعامل مع الجرعة الزائدة: في حال أخذ جرعة زائدة رائدة عرضية يجب استشارة الطبيب.

العوارض الجانبية غير المستحبة: كما في الحال مع جميع الأدوية، قد يسبب هذا الدواء درجات مقاومة من العوارض غير المستحبة عند بعض الأشخاص:

العوارض الأكثر شيوعاً: التعب، بروزه في الأطراف، بطء في النبض، اضطرابات اعدية معوية (ألم في البطن، غثيان، تقيؤ)، أرق، العوارض النادرة: اضطرابات نقلية، قصور قلبي، هبوط في ضغط الدم، صعوبة في التنفس، نقص السكر في الدم، ظاهرة رايوند (نباتات ألم مع ازراق الأطراف). تفاقم حالة العرج المتقطع (ألم عند المشي متعلق بمرض يصيب شرايين الرجل)، ظواهر جلدية مختلفة بما في ذلك تفاقم الصدفية.

الوخز في البدن والرجلين، جفاف في العين، كوابيس. الرجال إعلام طبيبك أو الصيدلي عن أي عوارض غير مذكورة في هذه النشرة.

الحظر يجب عدم استعمال الدواء بعد تاريخ الصلاحية المذكور على العلبة.

طرق خاصة للحفظ يحفظ الدواء في حرارة ما دون ٢٥°م.

تاريخ مراجعة النشرة: جزيران 2005