

عضلي قلبي، سكتة دماغية).

- التجلُّط المنتشر داخل الأوعية (اضطرابات حادة في تجلُّط الدم).
- القصور الحاد في وظيفة الكلى
- إن كنت تعاني أو عانيت سابقاً من اختلاجات،
- الحقن في البطين ودخال الغمد وداخل المخ إذا كان ثمة حاجة للحقن داخل الدماغ).
- في حال الشك، لا بدّ من طلب رأي الطبيب أو الصيدليّ.

التحذيرات الخاصة

- لا يجوز حقن الدواء عبر العضل.
- لا يجوز حقن الدواء في البطين أو داخل الغمد أو داخل المخ (إن كان ثمة حاجة للحقن داخل الدماغ)
- أعلم طبيبك:

- إذا كنت تعاني أو عانيت سابقاً من اختلاجات أو إذا كنت تأخذ دواء مضاداً للصرع،
- إن كان لديك آثار دم في البول،
- إن كنت تتناولين موانع حمل فمؤبّة أو تخضعين لعلاج بديل بالهورمونات لا تتقاطع النمط.
- أعلم طبيبك فوراً في حال ظهور العوارض التالية:
- ألم غير اعتيادي في الساقين، ضعف في الأطراف، ألم في الصدر، نبض مضطرب، ضيق نفس مفاجئ، فقدان وعي، اختلاط زهني، صداع حاد غير اعتيادي، دوام، اضطرابات بصرية، بؤء في البlick أو فقدان القدرة على النطق.
- أبق دائماً الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

احتياطات الاستخدام

- تُعدّل الجرعة لدى المرضى الذين يعانون من اختلال مزمن في وظيفة الكلى.
- في حال الشك، لا تتردد في استشارة طبيبك أو الصيدليّ قبل تناول أيّ دواء.
- التفاعلات بين الأدوية وتفاعلات أخرى
- لتفادي التفاعلات المحتملة بين عدّة أدوية، يجدر بك تلقائياً إبلاغ الطبيب أو الصيدليّ في حال كنت تتناول أيّ أدوية أخرى.

الحمل والرضاعة

- **الحمل**
- من المستحسن عدم استعمال هذا الدواء خلال الفصل الأول من فترة الحمل.

الرضاعة

- إذا اكتشفت أنك حامل خلال العلاج، استشير طبيبك في أسرع وقت ممكن، لأنّه وحده القادر على تقييم العلاج مع حالتك الصحية.
- لا يُمنح بالرضاع أثناء العلاج.
- بصورة عامة، يجب عليك دائماً استشارة طبيبك أو الصيدليّ قبل تناول أيّ دواء خلال فترةَي الحمل والرضاع.

حامض ترانينيكراميك
محلول للحقن (الوريدي)

- الرجاء أن تقرّأ بدقة هذه النشرة كاملة قبل تناول هذا الدواء.
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مجدداً.
- في حال كان لديك أسئلة أخرى أو شكوك ما، استشر طبيبك أو الصيدليّ للمزيد من المعلومات.
- لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً، لا تعطه لأيّ أحد آخر حتى ولو كانت عوارضه مثل عوارضك لأنه قد يسبّب له الأذى.

التعريف بالدواء

التريكيريب
حامض ترانينيكراميك..... 0.5 غ
الأسوفة، حامض كلوريديك مركز بكمية كافية للحصول على
محمّوضة 7.0 - 7.5، ماء لإعداد محاليل للحقن بكمية كافية
للحصول على 5 مل.

الشكل الصيدلي والتقديم

محلول للحقن الوريدي.
عبلة من 5 أمبولات من 5 مل

التصنيف الصيدلي العلاجي

مضاد لانحلال الليغين

حامل الرخصة/المورّع

sanofi-aventis france
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris - France

المصنّع

Sanofi Winthrop Industrie
6, boulevard de l'Europe - 21800 Quetigny - France

الحالات التي تستدعي استخدام هذا الدواء

هذا الدواء هو عامل مضاد للتزيف يوصى به لمعالجة بعض أنواع النزف.

تنبيه!

الحالات التي تمنع استخدام هذا الدواء
لا يجوز استخدام هذا الدواء في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني أو عانيت سابقاً من تجدد الدم الشرياني أو الوريدي (التهاب الوريد، انصمام رئوي، نبضة صدرية، احتشاء

سائقو السيارات ومشغّو الآلات

يجب لفت انتباه سائقي السيارات ومشغّلي الآلات إلى مخاطر الإصابة بالدوار بعد تناول هذا الدواء.

كيفية استخدام هذا الدواء

الجرعات

لدى البالغين، لا يجوز تحطّي 4 غ كل 24 ساعة.

في الحالات كافة، يجب التقيد تقيداً صارماً بوصفة الطبيب.

طريقة و وسيلة تناول الدواء

عن طريق الحقن في الوريد، حسب طبيّك وبصمّارم.

وتيرة وأوقات استخدام الدواء

يُقسّم إلى حقنتين أو 3 حقنات كل 24 ساعة.

مدة العلاج

في الحالات كافة، يجب التقيد تقيداً صارماً بوصفة الطبيب.

الأثار الجانبية غير المرغوبة والمزعجة

مثل كل مستحضر فاعل، قد يؤدي تناول هذا الدواء لدى بعض الأشخاص، إلى حدوث ردات فعل مزعجة بعض الشيء؛ ردت الفعل هذه نادرة وقد تتضمن العوارض التالية:

- غثيان وتقيؤ.
- إسهال
- تورّع مع هبوط في ضغط الدم، يمكن أن يرافقه فقدان وعي، اختلاجات،
- تفاعلات من النوع التحسسي (صدمة استهوائية، شرى أو خرب وعائي، طفح جلدي)،
- عوارض انصمام خثاري (تكوّن خثرات في الدم) يمكن أن تصيب أيّ قسم من الجسم.
- الرجاء أن تعلم طبيبك أو الصيدليّ بأيّ ردة فعل غير مرغوبة ومزعجة غير مذكورة في هذه النشرة.

الحفظ

لا تتخطّ تاريخ انتهاء الصلاحية المدوّن على العبلة الخارجية.

احتياطات خاصة للحفظ

يُحفظ الدواء في مكان تقلّ حرارته عن 25 درجة مئوية.

تاريخ مراجعة النشرة

حزيران 2005.