

Epardex

Formes et présentation

Epardex : Comprimés enteric coated: Boite de 30

Composition

Epardex : Un comprimé contient : Diclofénac sodium 50 mg.

Inactive Ingredients: Corn Starch – Talc – Lactose \ Mcc102 – Pvp k30 – Stéarate de Magnesium – Alcool.

Propriétés

Epardex un AINS ayant des propriétés antirhumatismales, analgésiques et antipyrétiques marquées.

Pharmacocinétique

Epardex est facilement absorbé au niveau du tractus gastro-intestinal, les pics plasmatiques sont atteints en 1-4 heures après une dose unique de 50 mg par voie orale. Il est métabolisé et excrété dans les urines. Une petite partie est excrétée par la bile.

Indications

Epardex est indiqué dans le traitement des arthrites rhumatoïdes, ostéoarthrites, spondylites ankylosantes, crises aiguës de goutte, rhumatismes non-articulaires, troubles musculo – squelettiques aigus et dorsalgie, manifestations et douleurs post –opératoires et post –traumatiques, douleurs suite à des chirurgies dentaires, manifestations inflammatoires douleurs en gynécologie et en cas de dysménorrhée, en cas de fièvre, et en traitement adjuvant en cas d'infection.

Contre-indications

Epardex est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité au produit. Comme avec les autres produits anti-inflammatoires, **Epardex** ne doit pas être administré aux malades souffrant d'ulcère peptique et aux malades souffrant d'asthme ou de rhinite aiguë et d'urticaire lors de prise d'AINS

Précautions

Epardex doit être administré avec prudence aux malades souffrant de maladies cardio-vasculaires et aux malades ayant des antécédents d'allergie à l'AAS, les concentrations plasmatiques des 2 se trouvent diminuées .

Grossesse et allaitement : **Epardex** ne doit pas être administré sauf en cas de nécessité absolue.

Effets indésirables

Epardex est bien toléré. Les effets indésirables les plus fréquents comprennent des céphalées, somnolence, et quelques cas de prurit.

Mode d'emploi et posologie

La dose de **Epardex** doit être ajustée en fonction de la réponse du malade et de sa tolérance.

La dose usuelle recommandée est de 100 – 150 mg / jour en plusieurs prises.

Chez les enfants, la dose de 1-3 mg/kg/jour en plusieurs prises.

Durée de conservation: 3 ans

Numéro d'enregistrement : 19266

Révisée : 07/2019



PHARMADEX S.A.L.
KAHALE - LEBANON