

One-Alpha®

- اسم المنتج الدوائي** One-Alpha® Alfalcidol

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل إعطاء هذا المنتج فهي تحتوي على معلومات عن علاجت. وإذا كنت في شك أو غير متأكد من شيء ما فمرجى الاستفسار من الطبيب أو الصيدلي. احتفظ بهذه النشرة- فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى. تأكد من توافق هذا الدواء بالكامل مع الدواء الموصوف لك من قبل الطبيب.

- التركيب النويوي والكيمي**

كبسولات
ألفالكسيدول 0.25 ميكروجرام و 0.5 ميكروجرام و 1 ميكروجرام
أحجام العيوات كبسولات 10. 30. 50. 100.

السواغات التي ينبغي أن يكون الطبيب على دراية عنها زيت السمسم

قطرات

ألفالكسيدول 2 ميكروجرام/مل (كل قطرة تحتوي على 0.1 ميكروجرام)
السواغات التي ينبغي أن يكون الطبيب على دراية عنها إيثانول، سوربيتول، ميثيل باراهيدروكسي بنزوات، ماركوجولجيسيرول، هيدروكسي سنيارات
أحجام العيوات 10 مل و 20 مل

محلول للحقن

ألفالكسيدول 2 ميكروجرام/مل (للاستخدام في الحقن الوريدي)
أحجام العيوات 0.5 مل « 10 أمبولات و 1 مل « 10 أمبولات
غائمة بالسواغات، انظر القسم 6.1

من الجائر عدم تسويق كل أحجام العلب والتركيزات والتركيبات

3. التشكل الصيدلاني

كبسولات
لينة، بلون أصفر شاحب (0.25 ميكروجرام)، أو وري (0.5 ميكروجرام) أو يميل إلى البني (1 ميكروجرام)

قطرات

قطرات تؤخذ بالفم، معتمة قليلاً إلى رافقة، عديمة اللون

محلول للحقن

محلول للحقن (للاستخدام في الحقن الوريدي)، رائق وعديم اللون

4. التفاصيل الطبية

4.1 الدوائى العلاجية

الأمراض الناتجة عن الاضطرابات في تمثيل الكالسيوم نتيجة لانخفاض الإنتاج الداخلي المبتدأ 125–ثنائي هيدروكسي فيتامين د، وفقر العظام الناتج عن الفشل الكلوي، قصور الدرقية التالي للعلاجية الجراحية أو مجهول السبب قصور الدرقية، الكآب، كعلاج مساعد للعامل مع فرط الدرقية التائي، الكساح أو لين العظام المقاوم لفيتامين (د)، الكساح المعتمد على فيتامين (د)، نقص كلس الدم أو الكساح لدى الأطفال حديثي الولادة سواء امتصاص الكالسيوم هشاشة العظام، الكساح الغثائي أو الناتج عن سوء الامتصاص ولين العظام.

4.2 الجرعات وطريقة تناول

الجرعة الفردية تحت المراقبة الدقيقة لمصنوي الكالسيوم المصلي.
البالغون والأطفال فوق 20 كجم، ابتداء 1 ميكروجرام يومياً
جرعة الاستمرار 0.25 – 2 ميكروجرام يومياً في العادة
الأطفال (< شهر واحد) أقل من 20 كجم، ابتداء 0.05 ميكروجرام يومياً
قطرات One-Alpha تحديني الولادة (> شهر واحد)، 0.1 ميكروجرام/كجم/يومياً
يجب أخذ قطرات One-Alpha عن طريق الفم
يجب بلع كبسولات One-Alpha بالكامل.
محلول One-Alpha للحقن معد للحقن الوريدي ويجب حقنه ببطء، يجب رخ العيوة قبل الاستخدام
تعليمات لكبار السن، لا توجد تجربة طبية نوعية في علاج المرضى المسنين، لذا يجب توجي الحذر الخاص. انخفاض وظائف الكلى، انظر القسم 4.
انخفاض وظائف الكبد، في حالة حدوث قصور كبدي شديد ربما يحدث نقص في إدخال عنصر الهيدروكسيل إلى 1 ألفا- هيدروكسي فيتامين د، ولتحويله إلى 1.25 نائي. هيدروكسي فيتامين د، وربما ينخفض الامتصاص من الأمعاء نظراً لانخفاض الدوران المعوي الكبدي، وربما تملك لدى جرعة أعلى.
يمكن إعطاء One-Alpha على هيئة حشفة ويديه في أعقاب كل عملية غسيل كللي، وينبغي إعطاء الحشفة في خط الرجوع إلى الغسيل الكلوي في نهاية كل عملية، وتبلغ الجرعة الأولية للبالغين 1 ميكروجرام لكل عملية غسيل كلوي، وتبلغ أقصى جرعة يوصى بها 6 ميكروجرام لكل عملية غسيل كلوي، وبما لا يزيد على 12 ميكوجرام في الأسبوع
تأاول الطعام، من غير المعلوم ما إذا كان مفصول One-Alpha يتأثر إذا ما أخذ مع الطعام

4.3 موانع الاستعمال

فرط التحسس من المادة الفعالة أو أي من السواغات.

4.4 تحذيرات واحتياطات خاصة للاستخدام

يجب متابعة مستويات الكالسيوم والفوسفات في المصل بانتظام أثناء العلاج ببقار One-Alpha، وينبغي متابعة هرمون الدرقية، والفوسفاتيز القلوي وناتج فوسفات الكالسيوم حسب الدوائى العلاجية.
ويمكن أن يظهر فرط في كالسيوم الدم لدى المرضى المعالجين بواسطة One-Alpha. لهذا السبب يجب إعلام المرضى بالأعراض الطبية المرتبطة بفرط كالسيوم الدم، وتمثل علامات فرط كالسيوم الدم في فقدان الشهية، والتعب، والغثيان والتقيؤ والإسهال و آلام العظام، وكثرة التبول، والتعرق، والصداع، والغثاش، وارتفاع ضغط الدم، والغثاس والدوخة.

ويمكن تصحيح فرط كالسيوم الدم سريعاً عن طريق إيقاف العلاج إلى أن يعود مستويات الكالسيوم في البلازما إلى طبيعتها (في غضون أسبوع واحد تقريباً)، ويمكن البدء مجدداً في تناول One-Alpha بجرعة مخفضة (نصف الجرعة السابقة)، مع متابعة مستويات الكالسيوم.
وقد يؤدي فرط دواء فرط كالسيوم الدم مدة طويلة إلى تفاقم التهاب المفاصل، تكلس الصمامات القلبية، أو حصوات الكلى، ومن ثم يجب تجنب استمرار فرط كالسيوم الدم لمدة طويلة عند استخدام One-Alpha. لدى هؤلاء المرضى، وقد لوحظ حدوث تورم، وفقرات أو ربما طول الأمد في وظائف الكلى.
يجب استعمال One-Alpha أيضاً بحدز مع مرضى تكلس الأنسجة الرئوية حتى لا يؤدي ذلك إلى أمراض قلبية.
في حالة المرضى المصابين بمرض عظمي كلوي، امتنشا أو قصور شديد في وظائف الكلى، يمكن استخدام عامل رابط للفوسفات جنباً إلى جنب مع ألفالكسيدول لمنع زيادة الفوسفات المصلي وحدوث تكلس منتشر.
يجب استخدام One-Alpha بحدز مع المرضى المصابين بالأمراض الحبيبية مثل السلوكرويد حيث تزداد الحساسية لفيتامين (د) بسبب زيادة نشاط إنزيم إضافة الهيدروكسيل.

يؤدي الاستخدام المتزامن لحليوكسيميدات الدجيتاليس في وجود فرط في كالسيوم الدم نتيجة إعطاء الفيتامين (د) إلى زيادة احتمالات عدم انتظام ضربات القلب.
تحتوي كبسولات One-Alpha على زيت السمسم كسواغ. وقد بسبب زيت السمسم في حالات نادرة تفاعلات تحسسية شديدة.
تحتوي قطرات One-Alpha على 14% من الحجم إيثانول (كحول) كسواغ، أي ما يصل إلى 340 مللي جرام إيثانول لكل جرعة (انظر 6 ميكروجرام مع ألفالكسيدول)، وربما كان المحتوى من الكحول ضاراً بأولئك الذين يعانون من إدمان الكحول، ويجب أخذ الحيوى من الكحول في الحسبان مع النساء الحوامل والمرضعات والأطفال، والفتات المعرضة لمخاطر الغالية مثل مرض الكبد أو الصرع.
تحتوي المحلول في إيثانول، يجب استخدام قطرات One-Alpha جنباً إلى جنب مع ديسوليفرام أو المنتجات ذات المفعول المماثل ليسوليفرام.
تحتوي قطرات One-Alpha المفعولة على ميثيل باراهيدروكسي بنزوات كسواغ. ويمكن أن ينسبب ميثيل باراهيدروكسي بنزوات في تفاعلات تحسسية (متأخرة الظهور على الأرجح).
تحتوي قطرات One-Alpha المفعولة على ماركوجولجيسيرول هيدروكسي سنيارات كسواغ. ويمكن أن ينسبب ماركوجولجيسيرول هيدروكسي سنيارات في اضطراب المعدة وإسهال.
يحتوي محلول One-Alpha للحقن على 10% من الحجم إيثانول (كحول) كسواغ، أي ما يصل إلى 160 مللي جرام إيثانول لكل جرعة (انظر 4 ميكروجرام مع ألفالكسيدول)، وربما يكون المحتوى من الكحول ضاراً بأولئك الذين يعانون من إدمان الكحول، ويجب أخذ الحيوى من الحسبان مع النساء الحوامل والمرضعات والأطفال، والفتات المعرضة لمخاطر الغالية مثل مرض الكبد أو الصرع.
يحتوي محلول One-Alpha للحقن على 14.0 مللي مول من الصوديوم لكل جرعة (ما يقابل 4 ميكروجرام من ألفالكسيدول).
المنتجات التي تحتوي على أقل من 1 مللي مول من الصوديوم (23 مللي جرام) للجرعة الواحدة تعتبر أساستاً خالية من الصوديوم.

4.5 تفاعلات مع منتجات دوائية أخرى وأشكال أخرى للتفاعل

مدرات البول الثيازيدية والمستحضرات المحتوية على الكالسيوم

الاستعمال المتزامن لمدرات البول الثيازيدية أو البوليأينية أو المستحضرات المحتوية على الكالسيوم ربما يعزز من مخاطر فرط الكالسيوم في الدم، ويجب متابعة مستويات الكالسيوم.
المستحضرات الأخرى المحتوية على فيتامين (د)

الاستعمال المتزامن مع المستحضرات المحتوية على فيتامين (د) ربما يعزز من مخاطر فرط الكالسيوم في الدم، لا ينبغي اجتناب استعمالاً نظاراً متعددة من الفيتامين (د).

مضادات التشنج

مضادات التشنج (مثل الباريتينورات، فينتينين، كارامازيبين أو بريمدون) لها مفعول مخفر للأزيم مما يؤدي إلى زيادة تمثيل ألفالكسيدول، وربما أحتاج المرضى المتعاطين لمضادات التشنج إلى جرعات أكبر من One-Alpha.

مضادات الحموضة المحتوية على المغنسيوم

رما يؤدي One-Alpha إلى زيادة تركزبات الأمنيوم في المصل، وينبغي متابعة المرضى الذي يتناولون المستحضرات المحتوية على الأمنيوم (مثل هيدروكسيد الأمنيوم، سوكرالفت) بحثاً عن ظهور علامات السمية بالأمنيوم.

تركيبات One-Alpha المفعولة فقط

منحجات حامض الصفراء

الاستعمال المتزامن لمنحجات حامض الصفراء المفعولة مثل كوليسينترامين ربما تسبب في ضعف امتصاص تركيزات One-Alpha المفعولة، لذا يجب تناول One-Alpha قبل ساعة واحدة على الأقل، أو بعد 4 إلى 6 ساعات من تناول منحجات حامض الصفراء للحد من مخاطر التفاعلات المحتملة.

4.6 الخصوبة والحمل والرضاعة

الحمل

هناك قدر محدود من البيانات عن استعمال ألفالكسيدول مع الحوامل. وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات حدوث تنسج ناسلي.

لا ينبغي استعمال One-Alpha أثناء الحمل إلا إذا كانت هناك ضرورة واضحة حيث أن فرط كالسيوم الدم أثناء الحمل ربما تسبب في اضطرابات خلقية في الدرية، لذا ينبغي توجي الحذر من النساء اللاتي يحملن محليهن.

الرضاعة

يفرز ألفالكسيدول في الحليب البشري. ويجب الأخيار ما بين إيقاف الرضاعة وإيقاف/الامتناع عن تعاطي One-Alpha مع الأخذ في الاعتبار منافع الرضاعة الطبيعية للطفل وفائدة العلاج للأم.

ويجب متابعة الأطفال الذي يحصلون على رضاعة طبيعية من أمهات يستعملن ألفالكسيدول متابعة وثيقة لتحري مدى إصابتهم بفرط كالسيوم الدم.

الخصوبة

لا توجد دراسات طبية عن تأثير One-Alpha على الخصوبة، ولم تظهر إحدى الدراسات الوقائية أي تأثير على

الخصوبة على الفئران



4.7 الآثار على القدرة على القيادة واستخدام الآلات

ليس لألفالكسيدول أي أثر أو أي أثر مباشر ملحوظ على القدرة على قيادة السيارات أو استخدام الآلات، ومع ذلك، يجب إعلام المرضى باحتمال حدوث دوار أثناء العلاج وأن يأخذ ذلك في حسبانته عند القيادة أو استخدام الآلات.

4.8 الآثار غير المرغوبة

يتميز بتقييم تكرار الآثار غير المرغوب فيها على تحليل مُتخَيِّع للبيانات المستخلصة من الدراسات الطبية، والتفارير اللفظانية.

وتمثلت أكثر الآثار غير المرغوبة تواتراً في التفاعلات الحليمية المخلفة مثل الحكة والطفح الجلدي. فرط كالسيوم الدم، والصداع، وآلام، وعدم راحة في الجهاز الهضمي، وفرط فوسفات الدم.

وقد حصلت حالات فشل كلوي بعد التسويق.

تو الآثار غير المرغوب فيها في قائمة فئة أعضاء الأجهزة بالمجمع الطبي للأشعطة التنظيمية، وترد الآثار غير المرغوب فيها الفرعية كترتبة بالكثرة تواتراً بحسب التفارير الواردة. وفي كل فئة من فئات التواتر، لغرض التفاعلات العكسية مرتبة تنازلياً بحسب جسامتها.

شائعة جداً >10/10	
شائعة 10/100 إلى > 10/1	
غير شائعة 1/1,000 إلى > 100/1	
نادرة >1/10,000 إلى > 1,000/1	
نادرة جداً >1/10,000	

اضطرابات الأيض والتغذية	
شائعة،	فرط كالسيوم الدم
	فرط فوسفات الدم
اضطرابات نفسية	
غير شائعة،	حالة نشوش
اضطرابات الجهاز العصبي	
غير شائعة،	الصداع
نادرة،	الدوار
اضطرابات الجهاز الهضمي	
شائعة،	شعور بالثم وعدم راحة في البطن
غير شائعة،	إسهال
	قيء
	إمساك
	غثيان
الاضطرابات الجلدية واضطرابات الأنسجة تحت الجلدية	
شائعة،	طفح جلدي*
	حكة
	*ورث تغاير عن أنواع مختلفة من الطفح الجلدي مثل الحماض السخاوي والبقيعي الحطاطي والشرى
الاضطرابات العضلية الهيكلية واضرابات النسيج الضام	
غير شائعة،	آلم عضلي
اضطرابات كلوية وبولية	
شائعة،	فرط كالسيوم البول
غير شائعة،	القصور الكلوي (بما في ذلك الفشل الكلوي الحاد) تحصي الكلوية/التكلس الكلوي
اضطرابات عامة وشروط موقع الحقن	
غير شائعة،	إحمرار/الوهن/الضيق الكلاس

مجموعة الأطفال

تعد ملامح السلامة الملحوظة لدى من الأطفال والبالغين متماثلة.

4.9 الجرعة الزائدة

ربما يؤدي تناول كميات زائدة من One-Alpha إلى حدوث فرط في كالسيوم الدم، إلا أن هذا التأثير سرعان ما يتعكس مع انخفاض عن الدواء.

وقد خال فرط كالسيوم الدم الشديدة يجب اتخاذ تدابير دعم عامة، الحفاظ على إزواء المريض جيداً عن طريق التشريب الوريدي بمحلول صلب (ارار بول قصير)، قياس الكهارل الكالسيوم، ومؤشرات وظائف الكلى، وتقييم المطاهر غير الطبيعية في serum القالب الكهربي، ولا سيما لدى المرضى الذين يستعملون ديجيتاليس، وبصورة أكبر تحديداً، يجب المظهر في العلاج اوساطة الكولوكويدوكوسيتريد.مدرات البول الحليف، والبسيفوسفونات، والكالسيتونين، وأخيراً الغسيل الكلوي.

مخاض المحتويات من الكالسيوم

5.0 التصنيف العلاجي

CC 03 A 11 – فيتامين (د) نظائره

5.1 خصائص الدنمائية الدوائية

بعد ألفالكسيدول أحد البطار الفعالة لفيتامين د، وهو يتحول سريعاً وبشكل كامل تقريباً إلى الكبد إلى الكالسيتريول الذي بعد المستقلب الفعال لفيتامين د. وفيقوم ألفالكسيدول بتحفيز امتصاص الكالسيوم والفوسفات في الجهاز الهضمي، وإعادة الامتصاص الأنبوي للكالسيوم. كما يؤدي إلى خفض إفراز الفوسفات في البول عن طريق تثبيط هرمون الدرقية، وبعد الكالسيتريول موهماً في نوع المعدبات وإعادة المعدن في أسجة العظام.

5.2 خصائص المراكات الدوائية

الامتصاص: سريع واما تقريباً

تغير العمر: ما يقرب من 35 ساعة للكالسيتريول يستمر المفعول البيولوجي ما يقرب من 3 إلى 5 أيام بعد التوقف.

إفراز: نصفه أساسية عن طريق الكلى، ويعتصه عن طريق البول كذلك.

5.3 بيانات السلامة الوقائية

تغير السمية الوقائية:
ألفالكسيدول إلى مفعول الكالسيتريول المعروف لفيتامين (د) على توازن الكالسيوم، والذي يتسم بفرط كالسيوم الدم والبول، وأخيراً تكلس الأنسجة البنية، ألفالكسيدول لا يتسبب في سمية وراثية، فلم يلاحظ آثار ألفالكسيدول على الخصوبة أو سلوك ذرية الفئران والأب، أما فيما يتعلق بنمو الأجنة، فقد لوحظت سمية جنينية (فقدان الجنين بعد الإفراس، انخفاض عدد الأجنة في البطن الواحدة، وانخفاض الوزن عند الولادة) عند الجرعات المرتفعة بآفمر، الكائي لإدرات السمية في الحيوانات الأمهات. ومن المعلوم أن الجرعات المرفضة عن فيتامين (د) لها تأثيرات ماسخة على الحيوانات.

6. البيانات الصيدلانية

6.1 السواغات

كبسولات

كبسولات 0.25 ميكروجرام، زيت السمسم، جميع مصاوغات–α-توكوفيرول، جيلانين (حيواني)، جليسيرول، سوربات الوناسيوم (E202)، نائي أكسيد التيتانيوم (E171).

كبسولات 0.5 ميكروجرام، زيت السمسم، جميع مصاوغات–α-توكوفيرول، جيلانين (حيواني)، جليسيرول، سوربات الوناسيوم (E202)، نائي أكسيد التيتانيوم (E171)، أكسيد الحديد الأصفر (E172).

كبسولات 1 ميكروجرام، زيت السمسم، جميع مصاوغات–α-توكوفيرول (E202)، أكسيد الحديد الأصفر (E172)، أكسيد الحديد الأصفر (E172).

قطرات

أحادي هدرات حمض الستريك: إيثانول، لا مائي، سترات الصوديوم، بوليبلن، جليكول، ماء للحقن، سنيارات، ميثيل باراهيدروكسي بنزوات (E218)، سترات الصوديوم، سوربيتول (E420)، α-توكوفيرول، ماء منقي.

محلول للحقن

أحادي هدرات حمض الستريك: إيثانول، لا مائي، سترات الصوديوم، بوليبلن، جليكول، ماء للحقن، غير متخطية.

غير التفاعلات الدوائية

6.3 صلاحية الدواء

كبسولات: عامان

قطرات: 3 أعوام

محلول للحقن: 3 أعوام

6.4 احتياطات خاصة للحقزخين

كبسولات

الحماية من ضوء الشمس المباشر: الحفظ في درجة حرارة أقل من 25 °م

قطرات

تحفظ الزجاجية في عبوتها الكرتونية الخارجية لحمايتها من الضوء، تحفظ في درجة حرارة من 2-8 °م

محلول للحقن

تحفظ الأمبولات في عبوتها الكرتونية الخارجية لحمايتها من الضوء، تحفظ في درجة حرارة من 2-8 °م.

تحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال

7. الشركة المصنعة

محلول للحقن

CENEXI, 52, rue Marcel et Jacques Gaucher, F-94120 Fontenay-sous Bois, France for LEO Pharma A/S, 55, Industriparken, DK-2750 Ballerup, Denmark

كبسولات وقطرات

LEO Pharma A/S, 55, Industriparken, DK-2750 Ballerup, Denmark

8. صاحب رخصة التسويق

LEO Pharma A/S, 55, Industriparken, DK-2750 Ballerup, Denmark

أحدث مراجعة لهذه النشرة بتاريخ سبتمبر 2016

LEO